

PROBLEMES AUX LIMITES ELLIPTIQUES DANS L^p

Exposés de

G. Geymonat et P. Grisvard

(ORSAY, Janvier-Mars 1964)

PROBLEMES AUX LIMITES ELLIPTIQUES DANS L^p

Exposés de

G. Geymonat* et P. Grisvard**

(ORSAY, Janvier-Mars 1964)

* Boursier du Consiglio Nazionale delle Ricerche
pour l'année 1963-64.

** Attaché de Recherches au C.N.R.S.

I - INTRODUCTION

La théorie des problèmes aux limites a été particulièrement développée dans les espaces de Sobolev ; nous allons en étudier quelques aspects dans cette série d'exposés.

Avant de poser les problèmes avec rigueur, nous faisons quelques rappels très brefs sur les espaces de Sobolev.

1. Les espaces de Sobolev :

Commençons par quelques notations.

U est un ouvert quelconque de $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}_+^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n ; x_n > 0\}$$

Ω désigne un ouvert borné $\subset \mathbb{R}^n$, de frontière $\Gamma = \partial\Omega$ variété (indéfiniment) différentiable de dimension $n-1$, Ω étant d'un seul côté de Γ (1).

p est un exposant tel que $1 < p < +\infty$.

$L_p(U)$ désigne l'espace des (classes de) fonctions mesurables et de puissance $p^{\text{ième}}$ sommable pour la mesure de Lebesgue dans U ;

(1) Pour fixer les idées, nous dirons dans la suite qu'un tel ouvert est borné et "très régulier"

pour $u \in L_p(U)$ on note

$$\|u\|_p = \left(\int_U |u(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

Pour k entier ≥ 0 , $W_p^k(U)$ est l'espace des fonctions $u \in L_p(U)$

dont toutes les dérivées distributions d'ordre $\leq k$, sont dans

$L_p(U)$; c'est un espace de Banach réflexif pour la norme :

$$u \rightsquigarrow \left\{ \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_p^p \right\}^{1/p} = \|u\|_{k,p}$$

Pour s non entier > 0 , $s = k + \sigma$ (k entier ≥ 0 , $0 < \sigma < 1$)

$W_p^s(U)$ est l'espace des fonctions $u \in W_p^k(U)$, telles que

$$\iint_{U \times U} \frac{|D^\alpha u(x) - D^\alpha u(y)|^p}{|x-y|^{n+p\sigma}} dx dy < +\infty$$

pour tout $|\alpha| = k$; c'est un espace de Banach réflexif pour la

norme :

$$u \rightsquigarrow \left\{ \|u\|_{k,p}^p + \sum_{|\alpha|=k} \iint_{U \times U} \frac{|D^\alpha u(x) - D^\alpha u(y)|^p}{|x-y|^{n+p\sigma}} dx dy \right\}^{1/p} = \|u\|_{s,p}$$

$\overset{\circ}{W}_p^s(U)$ désigne la fermeture de $C_0^\infty(U)$ dans $W_p^s(U)$; c'est un

espace normal de distributions dans U , pour la norme induite

par $W_p^s(U)^{(1)}$; on note $W_p^{-s}(U)$ le dual de $\overset{\circ}{W}_p^s(U)$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Dans le cas particulier $p = 2$, on pose :

$H^s(U) = W_2^s(U)$ pour tout s réel, $\overset{\circ}{H}^s(U) = \overset{\circ}{W}_2^s(U)$ pour s réel

≥ 0

(1) $\overset{\circ}{W}_p^s(U)$ coïncide avec $W_p^s(U)$ lorsque $U = \mathbb{R}^n$.

et $\|u\|_{s,2} = \|u\|_s$.

On vérifie facilement que pour k entier ≥ 0 , $W_{p'}^{-k}(U)$ est l'espace des distributions

$$T = \sum_{|\alpha| \leq k} D^\alpha f_\alpha$$

avec $f_\alpha \in L_{p'}(U)$; la norme de dual fort de $\overset{\circ}{W}_p^k(U)$ étant équivalente à la norme

$$T \rightsquigarrow \inf \left\{ \sum_{|\alpha| \leq k} \|f_\alpha\|_{p'} \right\}^{1/p'} = \|T\|_{-k,p'}$$

$$\{f_\alpha\}_{|\alpha| \leq k} \in L_{p'}(U)$$

$$T = \sum_{|\alpha| \leq k} D^\alpha f_\alpha$$

Remarque 1.1 Pour tout s réel, $H^s(\mathbb{R}^n)$ est l'espace des distributions tempérées T telles que

$$(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{T}(\xi) \in L_2(\mathbb{R}^n)$$

la norme $T \rightsquigarrow \|T\|_s$ étant équivalente à la norme

$$T \rightsquigarrow \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{T}(\xi)\|_{0,2}$$

L'analogue pour $p \neq 2$, de cette remarque est fausse en général:

$W_p^s(\mathbb{R}^n)$ ne coïncide avec l'espace $H^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ des distributions tempérées telles que

$$(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{T}(\xi) \in \mathcal{F} L_p(\mathbb{R}^n)$$

pour $p \neq 2$, que lorsque s est entier (de signe quelconque)

ce fait, que nous n'aurons pas à utiliser dans la suite résulte du théorème de Mihlin [29] (voir p.ex. [16])

Nous allons étudier plus en détail les espaces $W_p^s(U)$ lorsque $U = \mathbb{R}_+^n$ ou Ω . Leurs propriétés essentielles résultent de leur "caractère local".


Proposition 1.1 :

- a) Soient U_1 et U_2 deux ouverts bornés de $\mathbb{R}^n$, tels qu'il existe un difféomorphisme $\phi \in C^\infty$ de $\bar{U}_1$ sur $\bar{U}_2$;⁽¹⁾
alors l'application $u \mapsto \phi^* u$ est un isomorphisme de $W_p^s(U_2)$ sur $W_p^s(U_1)$ pour tout s , et de $\dot{W}_p^s(U_2)$ sur $\dot{W}_p^s(U_1)$ pour $s > 0$.
- b) Si U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et $\alpha \in C_0^\infty(\bar{U})$ ⁽²⁾
l'application $u \mapsto \alpha \cdot u$ est linéaire continue de $W_p^s(U)$ dans lui-même pour s réel quelconque et de $\dot{W}_p^s(U)$ dans lui-même pour $s \geq 0$.

Pour $s \geq 0$, on vérifie aisément ces propriétés sur la définition des espaces W_p^s ; le cas $s \leq 0$ s'en déduit par transposition.

(1) c.à.d. ϕ est un difféomorphisme d'un voisinage de $\bar{U}_1$ sur un voisinage de $\bar{U}_2$, qui applique $\bar{U}_1$ sur $\bar{U}_2$ (2) α est indéfiniment dérivable dans un voisinage de $\bar{U}$.

Cette proposition permet de donner une nouvelle définition des espaces $W_p^s(\Omega)$, $\overset{o}{W}_p^s(\Omega)$ pour $s \geq 0$, à partir des espaces modèles $W_p^s(R_+^n)$, $\overset{o}{W}_p^s(R_+^n)$: on fixe un recouvrement fini du compact $\Gamma = \partial\Omega$ par des ouverts $\{\sigma_i\}_{i=1}^N$ ayant la propriété suivante : pour tout i il existe un difféomorphisme ϕ_i de σ_i sur $B = \{x \in R^n ; |x| < 1\}$, tel que l'image de $\sigma_i \cap \Omega$ par ϕ_i soit $B_+ = \{x \in B ; x_n > 0\}$ et que l'image de $\sigma_i \cap \Gamma$ par ϕ_i soit $B_0 = \{x \in B ; x_n = 0\}$; on note ψ_i le difféomorphisme inverse. On complète ce recouvrement avec un ouvert σ_0 , tel que $\overline{\sigma_0} \subset \Omega$ et que $\{\sigma_i\}_{i=0}^N$ soit un recouvrement de $\overline{\Omega}$. On



fixe une partition indéfiniment dérivable de l'unité : $\{\alpha_i\}_{i=0}^N$ sur $\overline{\Omega}$, subordonnée au recouvrement $\{\sigma_i\}_{i=0}^N$.

Alors pour $u \in L_p(\Omega)$, les fonctions $\psi_i^*(\alpha_i u)$, $i = 1, 2, \dots, N$, sont définies dans B_+ ; on note $\widetilde{\psi_i^*(\alpha_i u)}$ leur prolongement par 0 dans $R_+^n - B_+$, et on note $(\widetilde{\alpha_0 u})$ le prolongement de $\alpha_0 u$ par 0 dans $R^n - \Omega$. De la proposition 1.1 on déduit aisément la :

Proposition 1.2 : $W_p^s(\Omega)$ (resp^t $\overset{o}{W}_p^s(\Omega)$) $s \geq 0$, est l'espace
des fonctions $u \in L_p(\Omega)$ telles que

$$i) \quad \widetilde{(\alpha_0 u)} \in W_p^s(\mathbb{R}^n)$$

$$ii) \quad \widetilde{\psi_i^* (\alpha_i u)} \in W_p^s(\mathbb{R}_+^n) \quad (\text{resp}^t \quad \overset{o}{W}_p^s(\mathbb{R}_+^n)) \quad i = 1, 2, \dots, N$$

et les normes $u \rightsquigarrow \|u\|_{s,p}$ et

$$u \rightsquigarrow \left\{ \|\widetilde{(\alpha_0 u)}\|_{s,p}^p + \sum_{i=1}^N \|\widetilde{\psi_i^* (\alpha_i u)}\|_{s,p}^p \right\}^{1/p}$$

sont équivalentes (1).

Nous allons développer quelques conséquences de cette proposition ; U désignant soit $\mathbb{R}_+^n$, soit Ω , il existe un opérateur linéaire continu P (de prolongement) de $W_p^s(U)$ dans $W_p^s(\mathbb{R}^n)$, tel que $P_u|_U = u$ pour toute $u \in W_p^s(U)$; la démonstration se réduit immédiatement au cas de $W_p^s(\mathbb{R}_+^n)$ grâce à la proposition 1.2 ; et dans ce dernier cas la démonstration est classique, au moins dans le cas s entier cf. par ex. [22].

Comme $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ est dense dans $W_p^s(\mathbb{R}^n)$ (par régularisation et troncature) on en déduit la :

Proposition 1.3: Pour $U = \mathbb{R}_+^n$ ou $= \Omega$, $C_0^\infty(\bar{U})$ est dense dans
 $W_p^s(U)$.

(1) On peut évidemment donner des caractérisations analogues pour $s < 0$.

Une autre conséquence intéressante de l'existence de l'opérateur

P est la suivante :

Proposition 1.4 : L'injection de $W_p^{k+1}(\Omega)$ dans $W_p^k(\Omega)$ est com-
pacte (k entier ≥ 0) (1)

En effet par prolongement, on se ramène à montrer qu'un ensemble borné de $W_p^{k+1}(R^n)$ formé de fonctions ayant leurs supports dans un compact fixe, est relativement compact dans $W_p^k(\Omega)$, ce qui est classique ("lemme de Weyl"). Il en résulte la :

Proposition 1.5 : Pour $k \geq 2$ et pour tout $\varepsilon > 0$ il existe
un nombre $C(\varepsilon)$ tel que pour toute $u \in W_p^k(\Omega)$ on ait l'inégalité
té $\|u\|_{k-1,p} \leq \varepsilon \|u\|_{k,p} + C(\varepsilon) \|u\|_{0,p}$

Cette proposition est un cas particulier du :

Lemme 1.1 : Soient E_1, E_2, E_3 trois espaces de Banach avec
 $E_1 \subset E_2 \subset E_3$ (injections continues), l'injection de E_1 dans
 E_2 étant de plus complètement continue; alors pour tout $\varepsilon > 0$,
il existe $C(\varepsilon)$ tel que

$$\|e\|_{E_2} < \varepsilon \|e\|_{E_1} + C(\varepsilon) \|e\|_{E_3}$$

pour tout $e \in E_1$.

(1) de même l'injection de $W_p^s(\Omega)$ dans $W_p^{s-\varepsilon}(\Omega)$ est compacte pour tout s et tout $\varepsilon > 0$, [23].

Pour la démonstration (élémentaire) de ce lemme, on peut voir [26].

La proposition 1.2 suggère un procédé de définition des espaces $W_p^s(\Gamma)$ (pour $s \geq 0$) à partir de l'espace modèle $W_p^s(R^{n-1})$:

Pour $u \in L_p(\Gamma)$ (1) les fonctions $\psi_i^*(\alpha_i u)$, $i = 1, 2, \dots, N$ sont définies dans B_0 , on note $\widetilde{\psi_i^*(\alpha_i u)}$ leur prolongement par 0 dans $R^{n-1} - B_0$, et on définit $W_p^s(\Gamma)$ de la manière suivante : $W_p^s(\Gamma)$ ($s \geq 0$) est l'espace des fonctions $u \in L_p(\Gamma)$ telles que $\widetilde{\psi_i^*(\alpha_i u)} \in W_p^s(R^{n-1})$, $i = 1, 2, \dots, N$; c'est un espace de Banach réflexif pour la norme :

$$u \longmapsto \left\{ \sum_{i=1}^N \left\| \widetilde{\psi_i^*(\alpha_i u)} \right\|_{p, s, p}^p \right\}^{1/p}$$

Il est facile de vérifier que cette définition ne dépend pas du

choix particulier des θ_i et des α_i que nous avons fait (2)

et que $W_p^s(\Gamma)$ est un espace normal de distributions sur Γ , on

note $W_p^{-s}(\Gamma)$ son dual ($\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$).

(1) On munit Γ d'une mesure de la manière suivante : une fonction u définie sur Γ est mesurable si les $\psi_i^*(\alpha_i u)$ sont mesurables dans B_0 pour la mesure de Lebesgue et on pose

$\int_{\Gamma} |u(x)| d\sigma(x) = \sum_{i=1}^N \int_{B_0} |\psi_i^*(\alpha_i u)(y)| dy$. Si l'on change de recouvrement $\{\theta_i\}$ et de partition $\{\alpha_i\}$, on définit une mesure équivalente.

(2) Les diverses normes ainsi définies sur $W_p^s(\Gamma)$ sont équivalentes.

Remarque 1.2 : On aurait pu donner une caractérisation directe de $W_p^s(\Gamma)$ au moins pour $0 < s < 1$: si on fixe une mesure $d\sigma(x)$ sur Γ (cf. note de bas de page 8), $W_p^\sigma(\Gamma)$ pour $0 < \sigma < 1$, est l'espace des $u \in L_p(\Gamma)$ telles que

$$\iint_{\Gamma \times \Gamma} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x-y|^{n+p\sigma-1}} d\sigma(x) d\sigma(y) < +\infty$$

Le résultat suivant qui motive l'introduction des espaces W_p^s avec s non entier, est fondamental dans la suite : pour $U = \mathbb{R}_+^n$ ou Ω et $u \in C_0^\infty(\bar{U})$ (qui est un sous-espace dense de $W_p^s(U)$), on peut définir $\frac{\partial^j u}{\partial n^j}$, $j = 0, 1, 2, \dots$ où n est la normale extérieure à ∂U $\frac{\partial^0 u}{\partial n^0} = u|_{\partial U}$

Théorème 1.1 : Pour $s > \frac{1}{p}$, ($s - \frac{1}{p}$ non entier pour $p \neq 2$), le plus grand entier $< s - \frac{1}{p}$ étant noté $[s - \frac{1}{p}]$, l'application

$$u \rightsquigarrow \left\{ \frac{\partial^j u}{\partial n^j} \right\}_{j=0}^{[s - \frac{1}{p}]}$$

qui est définie pour $u \in C_0^\infty(\bar{U})$, se prolonge par continuité en
une application notée

$$u \rightsquigarrow \vec{\gamma} u = \left\{ \gamma_j u \right\}_{j=0}^{[s - \frac{1}{p}]}$$

qui est linéaire continue surjective de $W_p^s(U)$ sur

$$\prod_{j=0}^{[s-\frac{1}{p}]} W_p^{s-j-\frac{1}{p}}(\partial U), \quad \text{et dont le noyau est } \overset{\circ}{W}_p^s(U) \quad (1)$$

En résumé on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \overset{\circ}{W}_p^s(U) \longrightarrow W_p^s(U) \xrightarrow[\delta]{\prod_{j=0}^{[s-\frac{1}{p}]} W_p^{s-j-\frac{1}{p}}(\partial U)} 0$$

On peut donner un théorème de traces analogue pour $s = \frac{1}{p}$ entier et $p \neq 2$, mais il est alors nécessaire d'introduire de nouveaux espaces (de Besov [6]); notre but n'étant pas d'introduire toutes les généralisations possibles des espaces de Sobolev, nous n'en parlerons pas. Le théorème 1.1 montre la nécessité d'introduire les espaces $W_p^s(\Gamma)$ d'exposant non entier, si l'on veut caractériser les traces des fonctions de $W_p^k(\Omega)$ avec exposant k entier. Dans les sept premiers exposés, nous n'utiliserons le théorème 1.1 qu'avec s entier; pour la démonstration nous nous bornerons à détailler le cas $s = 1$ $n = 2$, car le cas général utilise les mêmes idées avec quelques complications techniques.

démonstration pour $s = 1$, $n = 2$:

Grâce à la proposition 1.2 et à la manière dont nous avons

(1) $\overset{\circ}{W}_p^s(U)$ et $W_p^s(U)$ coïncident pour $s \leq 1/p$.

défini $W_p^{1-\frac{1}{p}}(\Gamma)$, on se réduit immédiatement au cas $U = R_+^2$.

Pour montrer que γ_0 applique $W_p^1(R_+^2)$ dans $W_p^{1-\frac{1}{p}}(R)$ il suffit de vérifier les inégalités suivantes, pour $u \in C_0^\infty(\overline{R_+^2})$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(0,y)|^p dy \leq C \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |u(x,y)|^p dx dy + C \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) \right|^p dx dy \quad (1.1)$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{u(0,y+t) - u(0,y)}{t} \right|^p dy dt &\leq \\ &\leq C \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) \right|^p dx dy + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) \right|^p dx dy \end{aligned} \quad (1.2)$$

L'inégalité (1.1) résulte de l'identité suivante, où $x \rightsquigarrow \zeta(x)$ est une fonction (indéfiniment) dérivable de $x \geq 0$, nulle pour x assez grand et telle que $\zeta(0) = 1$:

$$\begin{aligned} u(0,y) &= - \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} [\zeta(x) u(x,y)] dx \\ &= - \int_0^{+\infty} \zeta'(x) u(x,y) dx - \int_0^{+\infty} \zeta(x) \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) dx \end{aligned} \quad (1.3)$$

L'inégalité (1.2) résulte de l'inégalité de Hardy [15] et de l'identité

$$\begin{aligned} \frac{u(0,y+t) - u(0,y)}{t} &= - \frac{1}{t} \int_0^t \frac{\partial u}{\partial x}(x,y+t) dx \\ &+ \frac{1}{t} \int_0^t \left[\frac{\partial u}{\partial x}(s,y+s) + \frac{\partial u}{\partial y}(s,y+s) \right] ds. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Pour montrer que γ_0 est surjective on construit un relèvement

de $W_p^{1-\frac{1}{p}}(R)$ dans $W_p^1(R_+^2)$: Pour $f \in W_p^{1-\frac{1}{p}}(R)$ on pose

$$u(x,y) = \zeta(x) \frac{1}{x} \int_0^x f(y+s) ds ;$$

il est facile de vérifier (à l'aide de l'inégalité de Hardy)

que l'application $f \rightsquigarrow u$ est linéaire continue de $W_p^{1-\frac{1}{p}}(R)$

dans $W_p^1(R_+^2)$, et que $\gamma_0 u = f$.

Il reste à déterminer le noyau de γ_0 . Pour $u \in C_0^\infty(R_+^2)$ on a

évidemment $\gamma_0 u = 0$, d'où $\overset{\circ}{W}_p^1(R_+^2) \subset \overset{-1}{\gamma}_0(0)$.

Réciproquement si $u \in W_p^1(R_+^2)$ et $\gamma_0 u = 0$, on vérifie aisément

que la suite de fonctions

$$u_n(x,y) = \begin{cases} u(x-\frac{1}{n}, y) & x > \frac{1}{n} \\ 0 & 0 < x \leq \frac{1}{n} \end{cases}$$

converge vers u dans $W_p^1(R_+^2)$; comme u_n a son support dans

$x \geq \frac{1}{n}$, il est facile d'approcher u_n par des fonctions de

$C_0^\infty(R_+^2)$ (par régularisation et troncature), ce qui montre que

$u \in \overset{\circ}{W}_p^1(R_+^2)$.

C.Q.F.D.

Remarque 1.3 : Dans le cas $s = 1$ nous venons de vérifier l'existence d'un "relèvement" linéaire continu de $W_p^{1-\frac{1}{p}}(R)$ dans $W_p^1(R_+^2)$; plus généralement on montre l'existence d'un opérateur linéaire continu de $\prod_{j=0}^{[s-1/p]} W_p^{s-j-1/p}(\partial U)$ dans $W_p^s(U)$, inverse à droite de $\vec{\gamma}$.

Remarque 1.4 : On peut déduire ceci de l'inégalité (1.2).

L'opération $u \rightsquigarrow u|_{R^{n-1}}$ définie pour les fonctions u continues se prolonge par continuité en une application $u \rightsquigarrow \gamma_0 u$ linéaire continue de l'espace des fonctions localement intégrables dans R^n , dont les dérivées premières sont dans $L_p(R^n)$, dans l'espace des fonctions f définies dans R^{n-1} , localement intégrables et telles que

$$\iint_{R^{n-1} \times R^{n-1}} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x-y|^{n+p-2}} dx dy < +\infty.$$

Pour terminer nous rappelons (sans démonstration) le

Théorème (de Sobolev) :

Pour $s < \frac{n}{p}$, on a l'inclusion $W_p^s(\Omega) \subset L_q(\Omega)$ avec
 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{s}{n}$; et pour $s > \frac{n}{p}$, on a l'inclusion $W_p^s(\Omega) \subset C^{[s-n/p]}(\bar{\Omega})$

où $[s-n/p]$ désigne la partie entière de $s-n/p$.

Pour plus de détails sur les théorèmes de traces du type du théorème 1.1 on peut consulter [12] [20] [30bis] [38] [22] (III et IV) [23] sur les théorèmes d'immersion du type du théorème de Sobolev [36] [18] [13] [30bis], et plus généralement pour toutes les questions concernant les espaces de Sobolev [21].

2 - Position du problème

Soit A un opérateur différentiel linéaire à coefficients (à valeurs complexes) dans $C^\infty(\bar{\Omega})$, elliptique d'ordre $2m$. $B_1, \dots, B_m$ sont des opérateurs différentiels linéaires à coefficients (à valeurs complexes) dans $C^\infty(\Gamma)$; on suppose que l'ordre de B_j est $m_j \leq 2m-1$. (On les appellera "opérateurs-frontières")

Dans un langage approximatif, un problème aux limites consiste en ceci : On se donne f fonction (ou distribution) dans Ω et $g_1, \dots, g_m$ fonctions (ou distributions) sur Γ , et on cherche une fonction (ou distribution) u dans $\bar{\Omega}$ telle que

$$\begin{cases} A u = f & \text{dans } \Omega \\ B_j u = g_j & \text{sur } \Gamma, j = 1, 2, \dots, m \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

Naturellement il faudra préciser le sens des équations (1) et (2) ; pour cela on fixera un espace K de fonctions (ou distributions) dans lequel on peut donner un sens aux opérateurs $\frac{\partial}{\partial x_i}$, A et B_j . En pratique nous prendrons pour espaces K des espaces de Sobolev. Si l'on prend

$$K = W_p^{2m}(\Omega)$$

l'équation (1) a un sens pourvu que $f \in L_p(\Omega)$. Pour donner un sens à l'équation (2) on considère un prolongement $\tilde{B}_j$ d'ordre m_j , à coefficients $C^\infty(\bar{\Omega})$ de l'opérateur B_j (qui est défini sur Γ), $j = 1, 2, \dots, m$; on posera

$$B_j u = \gamma_0(\tilde{B}_j u)$$

ceci a un sens et définit $B_j u \in W_p^{2m-m_j-\frac{1}{p}}(\Gamma)$ et l'équation (2) aura elle-même un sens pourvu que

$$g_j \in W_p^{2m-m_j-\frac{1}{p}}(\Gamma) \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

(On peut facilement vérifier que $B_j u$ ainsi défini ne dépend pas du prolongement $\tilde{B}_j$ choisi).

On démontrera le résultat suivant (exp. VII et IX), sous des hypothèses convenables sur A et B_j (voir exp. V). L'opérateur

A considéré comme opérant de

$$W_p^{2m+l}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m) = \{ u \in W_p^{2m+l}(\Omega) ; B_j u = 0 \quad j = 1, 2, \dots, m \}$$

dans $W_p^l(\Omega)$ est un opérateur fermé et à indice, cet indice, de même que le spectre de l'opérateur ne dépend ni de $p \in]1, +\infty[$ ni de $l = 0, 1, 2, \dots$

La transposition du résultat précédent permettra de résoudre (en un sens à préciser : exp VIII) le problème (1) (2) avec (par exemple) $f \in L_p(\Omega)$ et $g_j \in \mathcal{D}'(\Gamma)$ distributions sur Γ d'ordre quelconque.

Par interpolation entre ces deux types de résultats on obtiendra quelques types de résultats intermédiaires, voisins (lorsque $p = 2$) de ceux obtenus par la méthode variationnelle [19], [26] (qui ne peut pas s'appliquer à tous les problèmes considérés ici !)

Un outil fondamental pour démontrer les résultats dont on vient de parler, est fourni par les "estimations a priori" (exp. III) dont un cas particulier est le suivant :

Si $u \in W_p^{2m}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m)$ on a l'inégalité

$$\|u\|_{2m,p} \leq C [\|Au\|_{0,p} + \|u\|_{0,p}] \quad (1.5)$$

Il est facile de vérifier que cette inégalité est nécessaire

pour que A soit un opérateur fermé de $W_p^{2m}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m)$ dans

$L_p(\Omega)$: En effet dire que cet opérateur est fermé c'est dire que

$W_p^{2m}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m)$ est un espace de Banach pour la "norme du graphe"

$$u \rightsquigarrow \|Au\|_{0,p} + \|u\|_{0,p}$$

Comme $W_p^{2m}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m)$ est aussi un espace de Banach pour

la norme induite par $W_p^{2m}(\Omega)$, et comme cette norme est comparable

à la norme du graphe grâce à l'inégalité :

$$\|Au\|_{0,p} + \|u\|_{0,p} \leq C \|u\|_{2m,p}$$

les normes considérées sont équivalentes, et en particulier on a

l'inégalité "a priori" (1.5).

Il faut se garder de croire que le choix des espaces de Sobolev comme espace K soit l'unique choix possible ; dans la littérature on considère souvent par exemple, les espaces $C^\alpha(\bar{\Omega})$.

3 - Plan et Bibliographie

Nous supposerons connue l'hypoellipticité des opérateurs elliptiques à coefficients indéfiniment dérivables [35] [28] [17]

le théorème de Calderon-Zygmund et l'existence de solutions élémentaires des opérateurs elliptiques à coefficients constants, ayant de "bonnes" propriétés ; ces points étant mis à part, de même que les propriétés des espaces de Sobolev, tous les résultats que nous énoncerons, seront démontrés.

Le plan est le suivant :

II - Noyaux de Poisson et représentation des solutions :

Nous démontrons les résultats des n° 1 à 4 de [4], en suivant à peu près cet article, sauf pour le lemme 2.2 qui développe une idée de [37]. Pour une construction explicite des noyaux de Poisson dans le cas du problème de Dirichlet, on peut voir [1] et [30] pour des généralisations (dans le cas $n = 2$), et pour d'autres formules de représentation [9].

III - Estimations a priori dans L_p :

On suit l'exposé de [4] n° 14-15 ; pour le cas $p = 2$ on peut consulter [32] et plus généralement pour $p \neq 2$: [9]. Un autre type d'estimations a priori, est lié à la théorie variationnelle, cf. par ex : [26] , [0] .

IV - Formules de Green :

Les résultats sont de [5] et [33] on suit l'exposé de [33] n° 4 et appendice II.

V - Réalisations d'un opérateur elliptique dans L_p :

On s'est inspiré de [7] ; l'appendice d'analyse fonctionnelle suit [8] .

VI - Existence dans L_2 :

On suit l'exposition de [34] ; le théorème 6.2 est dû à [31]

VII - Existence dans L_p :

Les résultats sont annoncés sous une forme plus générale dans [7] et par Agmon (cf. General elliptic boundary value problems, à paraître). Pour l'inégalité de Garding, on peut voir [14], pour la V-ellipticité, voir [19], [26], [21] ; la proposition 7.2 est inspirée du n° 12.4 de [4] .

VIII - Application de la transposition et de l'interpolation :

On a suivi [22] (VI) en évitant l'utilisation de [2] . Pour l'existence du foncteur $\Phi_{p,\sigma}$, on peut consulter [20] et [23] ;

pour l'existence de $\phi_{\ell,m}$ voir [11] . Plus généralement pour un exposé systématique on peut voir [24] et [25] .

IX - Quelques éléments de théorie spectrale :

On a suivi de près le n° 2 de [3] ; le cas du problème de Dirichlet est traité en détail dans [10] .

Remarque 1.5 : Pour démontrer les théorèmes d'existence nous utilisons le "problème adjoint" (cf. exp. IV); une méthode différente (n'utilisant pas l'adjoint) est développée (dans le cas $p = 2$) dans [17] ainsi que dans l'exposé de B. Malgrange au Séminaire Bourbaki 16ème année (1963/64) : Problèmes aux limites elliptiques.

- [0] AGMON S. - The coerciveness problem... J. d'analyse Math.
6 (1958) pp. 183 - 223
- [1] AGMON S. - Multiple layer potentials and the Dirichlet problem for higher order elliptic equations in the plane I. C.P.A.M. Vol 10 (1957) pp. 179 - 239
- [2] AGMON S. - The L_p approach to the Dirichlet problem I
Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa 13 (1959) pp. 405 - 448
- [3] AGMON S. - On the Eigenfunctions and on the Eigenvalues of General elliptic boundary value problems. C.P.A.M. Vol. 15 (1962) pp. 119 - 147
- [4] AGMON S. - DOUGLIS A. - NIRENBERG L. - Estimates near the Boundary for solutions of elliptic partial diff. C.P.A.M. Vol. 12 (1959) pp. 623 - 727
- [5] ARONSZAJN N. - MILGRAM N. - Differential operators on Riemannian manifolds : Rend. Circ. Mat. Palermo, 2 (1952) pp. 1 - 61
- [6] BESOV O. V. - Recherches sur une famille d'espaces fonctionnels : Trudy Math. Inst. Steklova : 60 (1961) p. 42
- [7] BROWDER F. E. - Estimates and existence theorems for elliptic boundary value problems : Proceeding of Nat. Acad. Sc. Vol. 45 (1959) p. 365 - 372
- [8] BROWDER F. E. - On functional analysis and partial diff. equations I : Math. Annalen 138 (1959) p. 55 - 79
- [9] BROWDER F. E. - A priori estimates for solutions of elliptic boundary value problems : Indagationes Mathematicae : I (1960) p. 145, II (1960) p. 160, III (1961) p. 404
- [10] BROWDER F. E. - On the spectral theory of elliptic diff. operators I : Math. Annalen 142 (1961) p. 22 - 130
- [11] CALDERON A. P. - Conférences au Collège de France. Paris (1962)
- [12] GAGLIARDO E. - Caratterizzazione delle tracce sulla frontiera

- relative ad alcune classi di funzioni in n variabili, Rend. Sem. Math. Padova 27 (1957) pp. 284 - 305
- [13] GAGLIARDO E. - Proprietà di alcune classi di funzioni in più variabili : Ricerche Math. 7 (1958) pp. 102 - 137 et Ulteriori proprietà di alcune classi di funzioni in più variabili : Ricerche Math. 8 (1959) pp. 24 - 51
- [14] GARDING L. - Dirichlet's problem for linear elliptic partial diff. eq. Math. Scand. Vol. 1 (1953) pp. 55 - 72
- [15] HARDY G.H. LITTLEWOOD J. E. - POLYA G. - Inequalities, Cambridge Univer. Press (1934)
- [16] HORMANDER L. - Estimates for Translation invariant operators in L^p spaces, Acta Math. 104 (1960) pp. 93 - 139
- [17] HORMANDER L. - Linear partial differential operators Springer Verlag (1963)
- [18] IL'IN V. P. - Sur les théorèmes d'immersion pour l'exposant limite, Doklady Akad Nauk. 96 (1954) pp. 908 - 909
- [19] LIONS J. L. - Problèmes aux limites en théorie des distributions : Acta Math. 94 (1955) pp. 1 - 153
- [20] LIONS J. L. - Théorèmes de trace et d'interpolation
(I) Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa XIII (1959) p p. 389 - 403
(II) Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa XIV (1960) pp. 317 - 331
(IV) Math. Annalen 151 (1963) p p. 42 - 56
- [21] LIONS J. L. - Problèmes aux limites dans les éq. aux dérivées partielles : Séminaire de Math. Supérieures Montréal (1962)
- [22] LIONS J. L. - MAGENES E. - Problèmes aux limites non homogènes (II) Annales de l'Inst. Fourier XI (1961) p p. 137 - 178 (III) : Annali Scuola Norm. Sup. Pisa XV (1961) p p. 39 - 101 (IV) Annali Scuola

- Norm. Sup. Pisa XV (1961) pp. 311 - 326 (V) Annali Scuola Norm. Sup. Pisa XVI (1962) p p. 1 - 44 (VI) Journal d'analyse Mathématique XI (1963) p p. 165 - 188.
- [23] LIONS J. L.-PEETRE J.- Sur une classe d'espaces d'interpolation, à paraître aux publications de l'I.H.E.S. Paris.
- [24] MAGENES E. - Sur les problèmes aux limites pour les équations linéaires elliptiques : Colloque International du C.N.R.S. n° 117 Paris (1962)
- [25] MAGENES E. - Spazi di Interpolazione ed equazioni a derivate parziali : 7ème Congrès de l'U.M.I. Genova (1963)
- [26] MAGENES E. - STAMPACCHIA G. - I Problemi al contorno per les equazioni differenziali di tipo ellittico : Annali della Scuola Norm. Sup. Pisa 12 (1958) p p. 247 - 357
- [27] MALGRANGE B. - Existence et approximation des solutions des équations aux dérivées partielles et des équations de convolution ; Annales de l'Inst. Fourier 6 (1955-56) p p. 271 - 355
- [28] MALGRANGE B. - Sur une classe d'opérateurs différentiels hypoelliptiques : Bull. Soc. Math. de France 85 (1957) p p. 283 - 306
- [29] MIHLIN S. G. - Sur les multiplicateurs des Intégrales de Fourier : Doklady Akad. Nauk. (1956) 109 p p. 701 - 703
- [30] MIRANDA C. - Teorema del massimo modulo : Ann. Math. pura Appl. 46 (1958) p p. 265 - 312
- [30 bis] NIKOLSKIĬ S. M. - Théorèmes d'immersion de prolongement et d'approximation ... : Uspeki Math. Nauk 16 (1961) p p. 63 - 114
- [31] NIRENBERG L. - Remarks on strongly elliptic partial diff. equations C.P.A.M. VIII (1955) p p. 648 - 674
- [32] SCHECHTER M. - Integral inequalities for partial diff. op... C.P.A.M. XII (1959) p p. 37 - 66

- [33] SCHECHTER M. - General boundary value problems for elliptic
... C.P.A.M. XII (1959) p p. 457 - 486
- [34] SCHECHTER M. - Remarks on elliptic boundary value problems
... C.P.A.M. XII (1959) p p. 561 - 573
- [35] SCHWARTZ L. - S u alcuni problemi della teoria delle equa-
zioni diff... Rendiconti del Sem. Math. fis. Mi-
lano XXVII (1958) p p. 1 - 41
- [36] SOBOLEV S. L. - Applications de l'analyse fonctionnelle à
la physique mathématique. Leningrad (1950) tra-
duction de l'A.M.S. (1963).
- [37] USPENSKIĬS. V. - Sur les théorèmes d'immersion pour les
classes avec poids : Trudy Math. Inst. Steklova
(1961) T. 61 p p. 283 - 303
- [38] USPENSKIĬS. V. - Propriétés des classes généralisées W_p^r de
Sobolev : Sibinskiĭ Math. J. (1962) T. III p p.
418 - 445 .

II - NOYAUX DE POISSON ET REPRESENTATION DES SOLUTIONS

La démonstration des estimations a priori dans l'exposé III réduira le problème au cas du demi-espace (cartes locales) des coefficients constants (artifice de Korn) et des opérateurs homogènes ; dans ce cas réduit la démonstration des estimations a priori utilisera une construction explicite des solutions à l'aide de la "formule de représentation" qui est établie dans le présent exposé.

1 - Préliminaires :

$$A = A(D_x, D_t) = \sum_{i=0}^{2m} \sum_{|\alpha|=2m-i} a_{\alpha,i} D_x^\alpha D_t^i$$

est un opérateur différentiel à coefficients constants, homogène d'ordre $2m$ (1). On fera sur A l'hypothèse suivante

(I) A est proprement elliptique :

(i) Il existe $C > 0$ tel que pour $\xi \in R^{n-1}$, $\tau \in R$

$$C^{-1} (|\xi|^2 + \tau^2)^m \leq |A(\xi, \tau)| = \left| \sum_{i=0}^{2m} \sum_{|\alpha|=2m-i} a_{\alpha,i} \xi^\alpha \tau^i \right| \leq C (|\xi|^2 + \tau^2)^m \quad (2.1)$$

(ii) Pour $\xi \in R^{n-1}$, $\xi \neq 0$, le polynôme en τ , $A(\xi, \tau)$ a

(1) On note (x, t) avec $x \in R^{n-1}$, $t \in R$ les points de R^n ;
 $R_+^n = \{(x, t) / t > 0\}$.

exactement m racines avec partie imaginaire positive.

Remarque 2.1 : Le point (i) exprime simplement que A est elliptique. Le point (ii) (lorsque (i) a lieu) n'est une restriction que pour $n = 2$, car dans ce cas $\{\xi \in \mathbb{R}^{n-1}; \xi \neq 0\}$ n'est pas connexe ; en dimension $n \geq 3$ tout opérateur elliptique est proprement elliptique. Il est également immédiat de vérifier que tout opérateur elliptique à coefficients réels est proprement elliptique. Nous développons pour commencer quelques conséquences de l'hypothèse (I) : De (2.1) (faisant $\xi = 0$) on obtient

$$C^{-1} \leq |a_{0,2m}| \leq C \quad (2.2)$$

Par ailleurs on a

$$\left| \sum_{|\alpha|=2m-i} a_{\alpha,i} \xi^\alpha \right| \leq C \quad \text{pour } \xi \text{ réel, } |\xi| = 1$$

On en déduit que pour toutes les racines $\tau(\xi)$ de $A(\xi, \tau)$ avec ξ réel, $|\xi| = 1$, on a

$$|\tau(\xi)| \leq C \quad (2.3)$$

$$\text{puis} \quad |\operatorname{Im} \tau(\xi)|^{-1} \leq C \quad (2.3)'$$

Nous notons $\tau_k^+(\xi)$ (resp^t $\tau_k^-(\xi)$), $k = 1, 2, \dots, m$ les racines de $A(\xi, \tau)$ dont la partie imaginaire est positive (resp^t négative),

pour ξ réel $\neq 0$; nous posons

$$M^+(\xi, \tau) = \prod_{k=1}^m (\tau - \tau_k^+(\xi)) = \sum_{p=0}^m \alpha_p^+(\xi) \tau^{m-p} \quad (2.4)$$

$$M^-(\xi, \tau) = \prod_{k=1}^m (\tau - \tau_k^-(\xi)) = \sum_{p=0}^m \alpha_p^-(\xi) \tau^{m-p}$$

Observons que

$$A(\xi, \tau) = a_{0,2m} M^+(\xi, \tau) M^-(\xi, \tau) \quad \text{et}$$

$$M^+(\xi, \tau) = (-1)^m M^-(-\xi, -\tau) \quad (2.5)$$

Il est facile de vérifier que les coefficients $\alpha_p^+(\xi)$ et $\alpha_p^-(\xi)$ sont des fonctions analytiques de ξ , pour $\xi \in \mathbb{R}^{n-1} - \{0\}$, et homogènes de degré p .

Considérons les polynômes en τ de degré j :

$$M_j^+(\xi, \tau) = \sum_{p=0}^j \alpha_p^+(\xi) \tau^{j-p}, \quad j = 0, 1, \dots, m-1 \quad (2.6)$$

ces polynômes possèdent la propriété suivante :

Proposition 2.1 : Soit γ une courbe fermée de Jordan, contenue

en entier dans le demi-plan $\{\tau ; |\operatorname{Im} \tau| > 0\}$, et qui entoure toutes

les racines $\tau_k^+(\xi)$, ⁽¹⁾ $k = 1, \dots, m$ pour $\xi \in \mathbb{R}^{n-1}$, $|\xi| = 1$; on a

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{M_{m-1-j}^+(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau)} \tau^k d\tau = \delta_{j,k} \quad j, k = 0, 1, \dots, m-1 \quad (2.7)$$

(1) L'existence d'une telle courbe est assurée par les inégalités (2.3), (2.3)'.

démonstration :

Pour $j \geq k$, on a

$$\frac{M_{m-j-1}^+(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau)} \tau^k \sim \tau^{k-j-1}$$

pour $|\tau| \rightarrow +\infty$, et on obtient le résultat par déformation

du contour γ_+ en un cercle centré à l'origine et dont le rayon

augmente indéfiniment. Pour $j < k$, on remarque que

$$\tau^k M_{m-j-1}^+(\xi, \tau) - \tau^{k-j-1} M^+(\xi, \tau) = Q(\xi, \tau)$$

est un polynôme en τ (à coefficients analytiques en ξ) de degré

$\leq k-1 \leq m-2$, on a donc

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{M_{m-j-1}^+(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau)} \tau^k d\tau = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{Q(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau)} d\tau ;$$

on vérifie que cette dernière intégrale est nulle en déformant

à nouveau le contour d'intégration en un cercle de centre l'ori-

gine et de rayon augmentant indéfiniment et en utilisant l'esti-

mation suivante :

$$\frac{Q(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau)} = O\left(\frac{1}{|\tau|^2}\right) \quad \text{pour } |\tau| \rightarrow +\infty .$$

C.Q.F.D.

On considère ensuite m opérateurs différentiels à coefficients

constants homogènes :

$$B_j = B_j(D_x, D_t) = \sum_{i=0}^{m_j} \sum_{|\alpha|=m_j-i} b_{j,\alpha,i} D_x^\alpha D_t^i \quad j = 1, 2, \dots, m$$

avec $m_j \leq 2m-1$ $j = 1, 2, \dots, m$. On fera sur les B_j

l'hypothèse suivante :

(II) Les B_j recouvrent l'opérateur A :

Pour tout $\xi \in R^{n-1}$, $\xi \neq 0$, les polynômes en τ $B_j(\xi, \tau)$ sont linéairement indépendants modulo $M^+(\xi, \tau)$, (donc aussi grâce à (2.5), modulo $M^-(\xi, \tau)$).

Nous notons :

$$B_j^+(\xi, \tau) = \sum_{k=1}^m \beta_{j,k}(\xi) \tau^{k-1}$$

le reste de la division de $B_j(\xi, \tau)$ par $M^+(\xi, \tau)$.

L'hypothèse (II) signifie que

$$d(\xi) = \det \|\beta_{j,k}(\xi)\|_{j,k=1,2,\dots,m} \neq 0$$

pour $\xi \in R^{n-1} - \{0\}$; comme $d(\xi)$ est évidemment analytique,

on en déduit qu'il existe $C > 0$ telle que

$$|d(\xi)| \geq C$$

pour ξ réel, $|\xi| = 1$.

$$\text{Posons } \|\beta^{j,k}(\xi)\|_{j,k=1,2,\dots,m} = \|\beta_{j,k}(\xi)\|_{j,k=1,2,\dots,m}^{-1}$$

$$\text{et } N_k(\xi, \tau) = \sum_{q=1}^m \beta^{q,k}(\xi) M^{m-q}(\xi, \tau) \quad (2.8)$$

ces polynômes en τ vérifient la :

Proposition 2.2 : γ désignant la même courbe que dans la proposition 2.1 on a

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{N_k(\xi, \tau) B_j(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau)} d\tau = \delta_{j,k} \quad j, k=1, 2, \dots, m \quad (2.9)$$

pour $\xi \in \mathbb{R}^{n-1}, |\xi| = 1$.

Démonstration : On a

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{N_k(\xi, \tau) B_j(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau)} d\tau = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{N_k B_j}{M^+} d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{N_k B_j^+}{M^+} d\tau \\ &= \sum_{q,p=1}^m \beta^{q,k}(\xi) \beta_{j,p}(\xi) \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{M_{m-q}^+}{M^+} \tau^{p-1} d\tau \\ &= \sum_{q,p=1}^m \beta^{q,k} \beta_{jp} \delta_{q,p} = \sum_{q=1}^m \beta^{q,k} \beta_{j,q} = \delta_{j,k} \end{aligned}$$

grâce à la proposition 2.1

C.Q.F.D.

2. On appelle "noyaux de Poisson" du problème $\{A, B_j\}$, les

fonctions :

$$K_j(x, t) = \frac{\beta_j}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \left[\int_{\gamma_+} \frac{N_j(\xi, \tau) (\langle x, \xi \rangle + t\tau)^{m_j-n+1}}{M^+(\xi, \tau)} \log \frac{\langle x, \xi \rangle + t\tau}{i} d\tau \right] \quad (2.10)$$

pour $m_j \geq n-1$

$$K_j(x, t) = \frac{\beta_j}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \left[\int_{\gamma_t} \frac{N_j(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau) (\langle x, \xi \rangle + t\tau)^{n-m_j-1}} d\tau \right]$$

pour $m_j \leq n-1$

(2.11)

où (i) $d\omega_\xi$ désigne la mesure de surface sur la sphère $|\xi| = 1$

(ii) le logarithme est défini par $-\pi < \arg. \log \zeta \leq \pi$

(iii) $\langle x, \xi \rangle = \sum_{i=1}^{n-1} x_i \xi_i$, $x, \xi \in \mathbb{R}^{n-1}$, $\tau > 0$

(iv) γ est la même courbe que dans la

Proposition 2;1.

$$(v) \quad \beta_j = - \frac{1}{(2\pi i)^{n-1} (m_j - n + 1)!} \quad \text{si } m_j \geq n-1$$

$$\beta_j = (-1)^{n-m_j-1} \frac{(n-m_j-2)!}{(2\pi i)^{n-1}} \quad \text{si } 0 \leq m_j < n-1$$

La propriété essentielle de ces fonctions est donnée par le théorème suivant, qui justifie leur appellation de "Noyaux de Poisson":

Théorème 2.1 : Pour $\phi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ $j=1, 2, \dots, m$, la fonction

$$u(x, t) = \sum_{j=1}^m \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K_j(x-y, t) \phi_j(y) dy = \sum_{j=1}^m K_j * \phi_j(x)$$

est solution du problème :

$$\begin{cases} A u = 0 & \text{dans } t > 0 \\ B_j u = \phi_j & \text{pour } t = 0 \end{cases} \quad j=1,2,\dots,m$$

Remarque 2.2 : Nous avons donné les expressions des noyaux de Poisson et nous allons vérifier a posteriori leurs propriétés, on peut évidemment construire ces noyaux au moins d'une manière "heuristique" (1).

(1) L'idée est la suivante : on peut formellement, chercher K_j solution à croissance lente en t du problème

$$\begin{cases} A K_j = 0 & \text{dans } t > 0 \\ B_\ell K_j = 0 & \text{pour } t = 0, \quad j \neq \ell \\ B_j K_j = \delta & \text{pour } t = 0 \end{cases}$$

ou ce qui revient au même, après transformation de Fourier partielle par rapport à la variable x , chercher $\hat{K}_j(\xi, t)$ solution

$$\text{de } \begin{cases} M^+(2\pi i\xi, D_t) \hat{K}_j(\xi, t) = 0 & t > 0 \\ B_\ell^+(2\pi i\xi, D_t) \hat{K}_j(\xi, t) = 0 & t = 0, \quad j \neq \ell \\ B_j^+(2\pi i\xi, D_t) \hat{K}_j(\xi, t) = 1 & t = 0 \end{cases}$$

On résoud ce dernier problème en fixant ξ ; l'hypothèse (II)

assure l'existence et l'unicité de la solution. On obtient K_j par transformation de Fourier inverse.

Avant de démontrer le théorème 2.1 il nous faut établir un certain nombre de propositions.

Proposition 2.3 : Pour q entier positif de même parité que $n-1$,

$n-1$, on a

$$K_j(x,t) = \Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}} K_{j,q}(x,t) \quad (2.12)$$

$$K_{j,q}(x,t) = \Delta_x K_{j,q+2}(x,t)$$

avec

$$K_{j,q}(x,t) = \frac{\beta_j(m_j-n+1)!}{2\pi i (m_j+q)!} \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \left[\int_{\gamma_+} \frac{N_j(\xi,\tau) (<x,\xi>+t\tau)^{m_j+q} \left\{ \log \frac{<x,\xi>+t\tau}{i} + C(n,m_j,q) \right\}}{M^+(\xi,\tau)} d\tau \right] \quad (2.13)$$

pour $m_j \geq n-1$ (1) .

$$K_{j,q}(x,t) = \frac{\beta_j(-1)^{m_j-n+2}}{2\pi i (m_j+q)! (n-m_j-2)!} \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \left[\int_{\gamma_+} \frac{N_j(\xi,\tau) (<x,\xi>+t\tau)^{m_j+q}}{M^+(\xi,\tau)} \log \frac{<x,\xi>+t\tau}{i} d\tau \right] \quad (2.14)$$

pour $m_j < n-1$.

Démonstration : Il suffit d'appliquer les formules :

$$\frac{\mu!}{(\lambda+\mu)!} \left(\frac{d}{dz} \right)^\lambda \left[z^{\lambda+\mu} \left(\log \frac{z}{i} + C(\lambda,\mu) \right) \right] = z^\mu \log \frac{z}{i}, \quad \mu \geq 0, \lambda \geq 0 \quad (2.15)$$

(1) $C(n,m_j,q)$ désigne une constante réelle qui dépend de n,m_j et q .

$$\frac{(-1)^{\mu+1}}{(\lambda+\mu)! (-\mu-1)!} \left(\frac{d}{dz} \right)^{\lambda} (z^{\lambda+\mu} \log \frac{z}{i}) = z^{\mu} \quad , \mu < 0 , \lambda + \mu \geq 0$$

où $C(\lambda, \mu)$ désigne une constante réelle dépendant de λ et μ .

Proposition 2.4 : $K_{j,q} \in C^{\frac{m_j+q-1}{2}}(R_+^n)$

Proposition 2.5 : K_j et $K_{j,q}$ sont analytiques dans R_+^n

Proposition 2.6 : $A(D_x, D_t) K_j(x, t) = 0$ dans R_+^n

et $A(D_x, D_t) K_{j,q}(x, t) = 0$ dans R_+^n

Lemme 2.1 ⁽¹⁾ : Pour $\phi \in C_0^\infty(R^{n-1})$ on a l'identité :

$$\phi(x) = \frac{-1}{(2\pi i)^{n-1} q!} \Delta_x^{\frac{n-1+q}{2}} \int_{R^{n-1}} \phi(y) \left(\int_{|\xi|=1} (\langle x-y, \xi \rangle)^q \log \frac{\langle x-y, \xi \rangle}{i} d\omega_\xi \right) dy \quad (2.16)$$

Démonstration : On considère la solution élémentaire E de

$\Delta_x^{\frac{n-1+q}{2}}$ donnée par (2)

$$E(x) = \frac{-1}{(2\pi i)^{n-1} q!} \int_{|\xi|=1} (\langle x, \xi \rangle)^q \log \frac{\langle x, \xi \rangle}{i} d\omega_\xi$$

et on écrit

$$\phi = S * \phi = \Delta^{\frac{n-1+q}{2}} (\partial * \phi)$$

C.Q.F.D.

Démonstration du théorème 2.1 : Posons $u_j = K_j * \phi_j$ et soit

q un entier de même parité que $n-1$, tel que $q \geq s-m_j + 1$,

nous avons pour $|\alpha| = s$ et $t > 0$

(2) cf. par ex : Guelfand-Chilov, Les distributions tome I p.119 et suivantes de l'édition française (Dunod) (1) F. John Plane waves and spherical means...Interscience New-York 1955).

$$D^\alpha u_j = (D^\alpha K_{j,q}) \left(\frac{*}{x} \right) \left(\Delta^{\frac{n+q-1}{2}} \phi_j \right) \quad (2.17)$$

car $\phi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$; comme $|\alpha| \leq m_j + q - 1$, il résulte de (2.17) grâce à la proposition 2.4 que $D^\alpha u_j$ est continue dans $\mathbb{R}_+^n$ et peut être prolongée à $\overline{\mathbb{R}_+^n}$ en une fonction continue. s'étant arbitraire le raisonnement précédent montre que

$$u_j \in C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$$

Grâce à (2.17) et à la proposition 2.6 , on a

$$A u_j = 0 \text{ dans } t > 0$$

Il faut encore calculer $B_k(D) u_j (x,0)$; on a

$$[B_k(D) u_j] (x,0) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}} \phi_j(x-y) [B_k(D) K_{j,q}] (y,0) dy \quad (2.18)$$

Pour $k \neq j$ il résulte de (2.13) (2.14) que

$$[B_k(D) K_{j,q}] (y,0) = C \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \left[\int_{\gamma_+} \frac{N_j(\xi, \tau) B_k(\xi, \tau)}{M^+(\xi, \tau)} \langle y, \xi \rangle^{m_j - m_k + q} (\log \frac{\langle y, \xi \rangle}{i} + C) d\tau \right]$$

$$\text{d'où } [B_k(D) K_{j,q}] (y,0) = 0 \text{ et } [B_k(D) u_j] (x,0) = 0$$

$$\text{puisque } \int_{\gamma_+} \frac{N_j B_k}{M^+} d\tau = 0 \text{ pour } k \neq j \quad (\text{cf. Prop. 2.2}).$$

Pour $k = j$ et $m_j \geq n-1$, on a

$$[B_j(D) K_{j,q}] (y,0) = \frac{j^{(m_j - n + 1)!}}{2\pi i q!} \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi$$

$$\left[(\langle y, \xi \rangle)^q \left(\log \frac{\langle y, \xi \rangle}{i} + C \right) \int_{\gamma_+} \frac{N_j B_j}{M^+} d\tau \right]$$

$$= \frac{\beta_j (m_j - n + 1)!}{q!} \int_{|\xi|=1} (\langle y, \xi \rangle)^q \log \frac{\langle y, \xi \rangle}{i} d\omega_\xi + \psi_q(y)$$

où $\psi_q(y)$ est un polynôme homogène de degré q , puisque

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_+} \frac{N_j B_j}{M^+} d\tau = 1 \quad (\text{cf. Prop. 2.2}). \text{ On en déduit l'iden-}$$

tité

$$\left[B_j(D) u_j \right] (x, 0) = - \frac{1}{(2\pi i)^{n-1} q!} \Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}} \int \phi_j(y)$$

$$\left[\int_{|\xi|=1} (\langle x-y, \xi \rangle)^q \log \frac{\langle x-y, \xi \rangle}{i} d\omega_\xi \right] dy$$

$$= \phi_j(x)$$

grâce au lemme 2.1 (on a utilisé le fait que $\Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}} \psi_q = 0$).

Le calcul pour $m_j < n-1$ est analogue.

C.Q.F.D.

Remarque 2.3 : Il est clair que lorsque $\phi_j \in C_0^{n-m_j+s+1}(\mathbb{R}^{n-1})$,

$j=1, \dots, m$ et $s \geq \max(m_k)$ alors u est solution du problème

$$\begin{cases} A u = 0 & \text{dans } t > 0 \\ B_j u = \phi_j & \text{pour } t = 0, \quad j=1, \dots, m \end{cases}$$

de classe $C^s(\overline{\mathbb{R}_+^n})$. Pour le voir on raisonne comme dans la démonstration du théorème 2.1.

Dans la suite nous utiliserons la :

Proposition 2.7 : $K_j, K_{j,q} \in C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n} - \{0\})$ et vérifient les iné-

-galités (1)

$$|D^\alpha K_{j,q}(P)| \leq C |P|^{m_j+q-s} (1+|\log|P||) , \quad |\alpha|=s \geq 0 \quad (2.19)$$

$$|D^\alpha K_j(P)| \leq C |P|^{m_j-n+1-s} (1+|\log|P||) , \quad |\alpha|=s \geq 0 \quad (2.20)$$

et (i) lorsque $s \geq m_j + q + 1$, $D^\alpha K_{j,q}$ est homogène de degré $m_j + q - s$ et le terme logarithmique peut être supprimé dans (2.19) (ii) lorsque $s \geq m_j - n + 2$, $D^\alpha K_j$ est homogène de degré $m_j - n + 1 - s$ et le terme logarithmique peut être supprimé dans (2.20) .

Démonstration : Les propriétés énoncées de K_j , résultent de celles de $K_{j,q}$, grâce à (2.12) ; il suffit donc de vérifier (2.19) et (i). L'inégalité (2.19) pour $s < m_j + q + 1$ et l'homogénéité affirmée au point (i) pour $s \geq m_j + q + 1$, sont faciles à vérifier sur les formules explicites (2.13) (2.14). Il reste donc à démontrer (2.19) pour $s \geq m_j + q + 1$ et $|P| = 1$ grâce à l'homogénéité. C'est le seul point délicat de la démonstration :

On peut écrire pour $|\alpha| = s \geq m_j + q + 1$, $\alpha = (\alpha', \alpha_n)$

$$D^\alpha K_{j,q} = C \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \int_{\gamma_+} \frac{N_j}{M_+} \frac{\alpha_n}{\tau^\alpha} \frac{\alpha'}{\xi} \frac{d\tau}{(\langle x, \xi \rangle + t\tau)^{s-m_j-q}} \quad (2.21)$$

$$= \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \int_{\gamma_+} \frac{F(\xi, \tau) d\tau}{(\langle x, \xi \rangle + t\tau)^s}$$

(1) P désigne un point de R_+^n : $P = (x, t)$

avec $\sigma = s - m_j - q \geq 1$ et $F(\xi, \tau)$ fonction analytique en ξ et τ dans un voisinage de $\{\xi \in \mathbb{R}^{n-1}; |\xi| = 1\} \times \gamma$.

Pour montrer que toutes les dérivées d'ordre $\geq m_j + q - 1$ de $K_{j,q}$ sont bornées sur $\{|P| = 1; t \geq 0\}$, il suffit (par intégration) de vérifier les estimations

$$|D^\alpha K_{j,q}(x, t)| \leq \frac{C(\alpha)}{t} \quad (2.22)$$

pour $|P| = 1, t > 0, P = (x, t)$; comme (2.22) est facile à vérifier pour $t \geq \frac{1}{2}$, on supposera dans la suite $t \leq \frac{1}{2}$ i.e.

$|x| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. Dans le cas où t est petit, la difficulté provient de ce que dans l'intégrale (2.21) on peut avoir $\langle x, \xi \rangle = 0$; on isole cette singularité : Soit $r \mapsto \zeta(r)$ une fonction réelle indéfiniment dérivable dans $[-1, +1]$ telle que $0 \leq \zeta(r) \leq 1$ pour tout r , $\zeta(r) \equiv 0$ pour $|r| \geq \frac{3}{4}$, $\zeta(r) \equiv 1$ pour $|r| \leq \frac{1}{2}$; on pose :

$$D^\alpha K_{j,q} = I_1 + I_2 \quad (2.23)$$

$$\text{avec } I_1 = \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \int_{\gamma_+} \frac{F(\xi, \tau)}{(\langle x, \xi \rangle + t\tau)^\sigma} \zeta(\langle x, \xi \rangle) d\tau$$

$$\text{et } I_2 = \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi \int_{\gamma_+} \frac{F(\xi, \tau)}{(\langle x, \xi \rangle + t\tau)^\sigma} [1 - \zeta(\langle x, \xi \rangle)] d\tau$$

Puisque dans I_2 la fonction à intégrer est $\neq 0$, seulement pour $|\langle x, \xi \rangle| \geq \frac{1}{2}$, on a $|I_2| \leq C$. (2.24)

Il reste à estimer I_1 : Soit T_x la rotation dans R^{n-1} qui transforme $x = (x_1, \dots, x_{n-1})$ en $(|x|, 0, \dots, 0)$; nous effectuons dans I_1 , le changement de variable $\xi \rightsquigarrow \eta = T_x \xi$:

$$I_1 = \int_{\substack{|\eta|=1 \\ |\eta_1| \leq \sqrt{3/4}}} d\omega_\eta \int_{\gamma_+} \frac{F(T_x^{-1}\eta, \tau) \zeta(\eta_1 |x|)}{(|x|\eta_1 + t\tau)^\sigma} d\tau$$

$$= \int_{|\eta'|=1} d\omega_{\eta'} \int_{-\sqrt{3/4}}^{\sqrt{3/4}} d\eta_1 \int_{\gamma_+} \frac{F(T_x^{-1}\eta, \tau) \zeta(\eta_1 |x|)}{(|x|\eta_1 + t\tau)^\sigma} (1-\eta_1^2)^{\frac{n-4}{2}} d\tau$$

où $\eta' = (\eta_2, \dots, \eta_{n-1}) \in R^{n-2}$ (1). Par intégration par parties

$$\text{on a : } |I_1| = \left| \frac{C}{|x|^{\sigma-1}} \int_{|\eta'|=1} d\omega_{\eta'} \int_{-\sqrt{3/4}}^{+\sqrt{3/4}} d\eta_1 \left[\int_{\gamma_+} \frac{1}{|x|\eta_1 + t\tau} \left(\frac{\partial}{\partial \eta_1} \right)^{\sigma-1} (F(T_x^{-1}\eta) \zeta(\eta_1 |x|) (1-\eta_1^2)^{\frac{n-4}{2}}) d\tau \right] \right|$$

et comme on a $|x| > 1/2$, on obtient $|I_1| \leq C/t$ (2.25)

C.Q.F.D.

Proposition 2.8 $[B_k(D)K_j](x, 0) = 0$ pour $x \neq 0$, $j, k = 1, 2, \dots, m$

et

$$|B_k(D)K_j(x, t)| \leq C \ t(1+|\log|P||) \ |P|^j t^{-m} k^{-n} \quad (2.26)$$

C'est immédiat

Proposition 2.9 : On suppose que $\phi_j \in C^{n+2m-mj+1}(R^{n-1})$ est

(1) Pour $n = 2$ ou 3 les modifications à apporter à la démonstration sont évidentes.

telle que

$$|D^\alpha \phi_j(x)| = O((1 + \log|x|) |x|^{2m-n-m_j-k}) , \quad j=1,2,\dots,m$$

pour $|\alpha| = k = 0,1,\dots,2m-m_j$; on pose pour $t > 0$, $|\beta| = 2m-m_j$

$$\tilde{u}_j(x,t) = \sum_{i=1}^m \int_{R^{n-1}} D_x^\beta B_j (D_x, D_t) K_i(x-y,t) \phi_i(y) dy$$

Alors $\tilde{u}_j(x,t)$ peut être prolongée à $\overline{R_+^n}$ en une fonction conti-

nue telle que $\tilde{u}_j(x,0) = D_x^\beta \phi_j(x)$

Démonstration : Grâce à l'inégalité (2.20) et aux hypothèses sur

ϕ_j , on peut faire les intégrations par parties qui permettent

d'écrire

$$\tilde{u}_j(x,t) = \sum_{i=1}^m \int_{R^{n-1}} B_j K_i(x-y,t) D_y^\beta \phi_i(y) dy$$

Soit $\zeta \in C_0^\infty(R^{n-1})$ une fonction $\equiv 1$ dans la boule de rayon R

et telle que $|\zeta| \leq 1$; nous pouvons écrire

$$\tilde{u}_j = B_j w_1 + w_2$$

$$\text{avec } w_1 = \sum_{i=1}^m \int_{R^{n-1}} K_i(x-y,t) \zeta(y) D_y^\beta \phi_i(y) dy$$

$$w_2 = \sum_{i=1}^m \int_{R^{n-1}} B_j K_i(x-y,t) (1-\zeta(y)) D_y^\beta \phi_i(y) dy$$

Grâce à la remarque 2.3 on voit que $B_j w_1$ peut être prolongée

à $\overline{R_+^n}$ en une fonction continue et que pour $|x| < \frac{1}{2}R$,

$B_j w_1(x,0) = D_x^\beta \phi_j(x)$. Pour $|x| < R/2$ on considère à présent w_2 ; la fonction à intégrer est $\neq 0$ seulement pour $|y| > R$, et dans ce domaine on a $\frac{1}{2}|y| < |x-y| < \frac{3}{2}|y|$, on en déduit à l'aide de (2.26) et des hypothèses sur ϕ_j que

$$|w_2(x,t)| \leq C t \int_{|y|>R} (1 + \log|y|)^2 |y|^{-2n} dy$$

et cette quantité tend vers zéro lorsque $t \rightarrow 0$. Nous avons ainsi démontré que $\tilde{u}_j$ est continue aux points $(x,0)$ tels que $|x| < \frac{1}{2}R$ et que $\tilde{u}_j(x,0) = D_x^\beta \phi_j(x)$ pour $|x| < \frac{1}{2}R$; comme R est arbitraire la proposition est démontrée.

3 - Pour démontrer la "formule de représentation" et les estimations a priori nous utiliserons le :

Lemme 2.2 : Soit K une fonction de $C^\infty(R_+^n - \{0\})$ solution dans R_+^n de $A(D)K = 0$. On suppose que les dérivées d'ordre $2m$ de K sont homogènes de degré $-n$. Pour $\phi \in L^\infty(R^{n-1})$ on considère les transformations

$$\phi \rightsquigarrow u_\alpha(x,t) = \int_{R^{n-1}} D^\alpha K(y,t) \phi(x-y) dy \quad (t > 0) \quad (2.27)$$

avec $|\alpha| = 2m$.

Alors il existe $C > 0$ telle que

$$\left\{ \int_{R_+^n} |u_\alpha(x,t)|^p dx dt \right\}^{1/p} \leq C \left\{ \iint_{R^{n-1} \times R^{n-1}} \frac{|\phi(x) - \phi(y)|^p}{|x-y|^{n+p-2}} dx dy \right\}^{1/p} \quad (2.28)$$

pour $|\alpha| = 2m$ et toute ϕ telle que l'intégrale de droite dans (2.28) soit finie.

Démonstration : Pour $|\alpha| = 2m$, $D^\alpha K(x,t)$ est indéfiniment dérivable dans $R_+^n - \{0\}$ et homogène de degré $-n$; il existe donc une constante $C > 0$ telle que

$$|D^\alpha K(x,t)| \leq \frac{C}{(|x|^2 + t^2)^{n/2}} \quad (2.29)$$

et comme $\phi \in L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ les intégrales (2.27) convergent.

a) Nous considérons pour commencer le cas où D^α contient au moins une dérivation en x (ou y !); dans ce cas nous avons

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} D^\alpha K(y,t) dy = 0 \quad \text{pour } t > 0$$

(l'intégrale converge grâce à (2.29)), et nous pouvons écrire

$$u_\alpha(x,t) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} D^\alpha K(y,t) \{ \phi(x) - \phi(x-y) \} dy \quad (2.30)$$

d'où grâce à (2.29) :

$$|u_\alpha(x,t)| \leq C \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{|\phi(x) - \phi(x-y)|}{(|y|^2 + t^2)^{n/2}} dy$$

$$\begin{aligned} \text{et } & \left\{ \int_{\mathbb{R}_+^n} |u_\alpha(x,t)|^p dx dt \right\}^{1/p} \\ & \leq C \left\{ \int_0^\infty \left[\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{\left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\phi(x) - \phi(x-y)|^p dx \right)^{1/p}}{(|y|^2 + t^2)^{n/2}} dy \right]^p dt \right\}^{1/p} \\ & = C \left\{ \int_0^\infty \left[\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{\partial(y)}{(|y|^2 + t^2)^{n/2}} dy \right]^p dt \right\}^{1/p} \quad (2.31) \end{aligned}$$

$$\text{avec } \partial(y) = \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\phi(x) - \phi(x-y)|^p dx \right)^{1/p}$$

Ensuite, grâce à l'inégalité de Minkovski, nous avons

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{\partial(y) dy}{(|y|^2 + t^2)^{n/2}} \leq$$

$$\left(\int_{R^{n-1}} \frac{|\partial(y)|^p}{(|y|^2 + t^2)^{\theta p}} dy \right)^{1/p} \left(\int_{R^{n-1}} \frac{dy}{(|y|^2 + t^2)^{(n/2 - \theta)p}} \right)^{1/p},$$

où θ est choisi tel que $n-1+p > 2\theta p > n+p-2$.

On en déduit

$$\int_{R^{n-1}} \frac{\partial(y) dy}{(|y|^2 + t^2)^{n/2}} \leq c t^{\frac{n-1}{p} - (n-2\theta)} \left(\int_{R^{n-1}} \frac{|\partial(y)|^p}{(|y|^2 + t^2)^{\theta p}} dy \right)^{1/p}$$

et de (2.31) il vient :

$$\begin{aligned} & \left\{ \int_{R_+^n} |u_\alpha(x, t)|^p dx dt \right\}^{1/p} \leq \\ & c \left\{ \int_0^\infty t^{(n-1)\frac{p}{p} - (n-2\theta)p} \int_{R^{n-1}} \frac{|\partial(y)|^p}{(|y|^2 + t^2)^{\theta p}} dt dy \right\}^{1/p} \\ & = c \left\{ \int_{R^{n-1}} |\partial(y)|^p \int_0^\infty \frac{t^{-n-p+1+2\theta p}}{(|y|^2 + t^2)^{\theta p}} dt dy \right\}^{1/p} \\ & = c \left(\int_{R^{n-1}} \frac{|\partial(y)|^p}{|y|^{n+p-2}} dy \right)^{1/p} \end{aligned}$$

C'est l'inégalité (2.28).

b) Il reste à examiner le cas où $D^\alpha = \frac{\partial}{\partial t}^{2m}$; on le déduit

du cas a) en utilisant l'ellipticité de A :

$$\text{On écrit } D_t^{2m} = \frac{1}{a_{0;2m}} \left\{ A(D_x, D_t) - \sum_{i=0}^{2m-1} |\alpha| \sum_{|\alpha|=2m-i} a_{\alpha,i} D_x^\alpha D_t^i \right\}$$

d'où (puisque $AK = 0$ dans R_+^n)

$$u_{0, \dots, 0; 2m}(x, t) = \frac{1}{a_{0, 2m}} \sum_{i=0}^{2m-1} \sum_{|\alpha|=2m-i} a_{\alpha, i} u_{\alpha, i}(x, t) \quad t > 0$$

L'inégalité (2.22) pour $u_{0, \dots, 0; 2m}$ est alors immédiate.

4) On cherche à construire une solution du problème non homogène :

$$\begin{cases} A(D) u(x, t) = f(x, t) & t > 0 \\ [B_j(D) u](x, 0) = \phi_j(x) & t = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

avec $f \in C_0^\infty(\overline{R_+^n})$ et $\phi_j \in C_0^\infty(R^{n-1})$ $j = 1, 2, \dots, m$.

Ce problème est résolu par le théorème 2.1 lorsque $f \equiv 0$.

Dans le cas $f \neq 0$ nous utiliserons une solution élémentaire⁽¹⁾

de l'opérateur A de la forme :

$$E(P) = |P|^{2m-n} \psi\left(\frac{P}{|P|}\right) + q(P) \log |P| \quad (2.32)$$

où $q(P)$ est un polynôme de degré $2m-n$ (éventuellement nul) et

ψ une fonction analytique sur la sphère unité de R^n , avec les

majorations :

$$|D^\alpha E(P)| \leq C |P|^{2m-n-s} \quad (2.33)$$

pour $|\alpha| = s \geq 0$ lorsque n est impair, ou lorsque n est

pair et $> 2m$, ou lorsque n est pair et $\leq 2m$ et $|\alpha| = s > 2m-n$

(1) mêmes références que pour le lemme 2.1.

$$|D^\alpha E(P)| \leq C |P|^{2m-n-s} (1 + |\log |P||) \quad (2.33)'$$

pour $|\alpha| = s \leq 2m-n$ lorsque n est pair.

Nous considérons un prolongement f_N de f à R^n tel que $f \rightsquigarrow f_N$ soit linéaire continue de $C_0^\infty(R_+^n)$ dans $C_0^N(R^n)$; et nous posons

$$v = E * f_N \quad (2.34)$$

On a $v \in C^{N+2m-1}(R^n)$ et évidemment

$$A(D) v(x,t) = f(x,t) \quad \text{pour } t > 0$$

Posons $\psi_j(x) = [B_j(D)v](x,0) \quad j = 1,2,\dots,m \quad (2.35)$

et $\omega_j = \phi_j - \psi_j$, $j = 1,2,\dots,m$; il nous faut encore résoudre le problème

$$\begin{cases} A(D) w(x,t) = 0 & \text{pour } t > 0 \\ [B_j(D) w](x,0) = \omega_j(x) & j = 1,2,\dots,m \end{cases}$$

ω_j n'étant pas à support compact, la solution de ce problème

n'est pas donnée par le théorème 2.1; dans le cas général les

intégrales qui représenteraient $K_{j(x)} * \omega_j$ peuvent ne pas conver-

ger. Nous avons seulement le résultat suivant :

Théorème 2.2 : Si $u \in C_0^\infty(\overline{R_+^n})$, on pose $f = A u$ et

$\phi_j = [B_j(D) u](x,0)$, $j = 1,2,\dots,m$. Alors si v est définie

par (2.34) et les ψ_j par (2.35) on a la "formule de représentation" :

$$D^\alpha u(x,t) = D^\alpha v(x,t) + \sum_{j=1}^m (D^\alpha K_j)_{(x)} * \omega_j \quad (2.36)$$

pour $|\alpha| \geq 2n$, $t > 0$, avec $\omega_j = \phi_j - \psi_j$, $j = 1, 2, \dots, m$.

Vérifions pour commencer la convergence des intégrales représentant $(D^\alpha K_j)_{(x)} * \omega_j$: comme f_N est à support compact, v (et ses dérivées) a un comportement asymptotique pour $|P| \rightarrow +\infty$, identique à celui de E (et de ses dérivées), plus précisément

$$\text{on a } |D^\beta v(P)| \leq C |P|^{2m-n-|\beta|} (1 + |\log|P||) \quad (2.37,$$

(pour $|\beta| \leq N + 2m - 1$) d'où (pour $|\gamma| \leq N + 2m - m_j - 1$)

$$|D_x^\gamma \psi_j(x)| \leq C |x|^{2m-n-m_j-|\gamma|} (1 + |\log|x||) \quad (2.38)$$

L'inégalité (2.38) est valable avec ψ_j remplacée par ω_j car ϕ_j est à support compact ; on en déduit, grâce aux estimations (2.20) que l'identité (2.36) a un sens.

Dans la démonstration du théorème 2.2 nous utiliserons le :

Lemme 2.3 : Soit $u \in C^{2m}(\overline{R_+^n})$, solution de

$$A u = 0 \quad \text{dans } t \geq 0$$

$$B_j u = 0 \quad \text{pour } t = 0 \quad j = 1, 2, \dots, m$$

On suppose que

a) $u \in L^2(\mathbb{R}_+^n)$

b) u et ses dérivées d'ordre $\leq 2m$, considérées comme fonctions de t , sont continues dans $]0, +\infty[$ à valeurs dans $L_1(\mathbb{R}^{n-1})$

c) u et ses dérivées d'ordre $\leq 2m$, considérées comme fonctions de t , sont bornées dans $]0, +\infty[$ à valeurs dans $L_2(\mathbb{R}^{n-1})$

Alors $u \equiv 0$.

Démonstration : On effectue une transformation de Fourier partielle par rapport à x : $\hat{u}(\xi, t) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} u(x, t) dt$;

on déduit des hypothèses sur u , que

a) $\hat{u} \in L_2(\mathbb{R}_+^n)$

b) les dérivées d'ordre $\leq 2m$ en t de $\hat{u}$ sont continues dans $\mathbb{R}_+^n$

c) les dérivées d'ordre $\leq 2m$ en t de $\hat{u}$ considérées comme fonctions de t sont bornées dans $]0, +\infty[$ à valeurs dans $L_2(\mathbb{R}^{n-1})$.

On a donc

$$\left\{ \begin{array}{l} A(2\pi i \xi, D_t) \hat{u}(\xi, t) = 0 \quad t > 0 \end{array} \right. \quad (2.39)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} [B_j(2\pi i \xi, D_t) \hat{u}](\xi, 0) = 0 \quad j=1, 2, \dots, m \end{array} \right. \quad (2.40)$$

et grâce à b) c) ces identités sont vraies ponctuellement.

De (2.39), résulte que pour chaque ξ , $\hat{u}(\xi, t)$ est combinaison linéaire à coefficients polynômes en t des $e^{2\pi i t \tau_k^+(\xi)}$ et $e^{2\pi i t \tau_k^-(\xi)}$ $k=1, 2, \dots, m$; la condition a) montre que $\hat{u}$ est combinaison linéaire des seules exponentielles décroissantes en t :

$$e^{2\pi i t \tau_k^+(\xi)}, \quad k=1, 2, \dots, m$$

et on a

$$M^+(\xi, \frac{1}{2\pi i} D_t) \hat{u}(\xi, t) = 0 \quad t > 0 \quad (2.39)'$$

$$[B_j^+(\xi, \frac{1}{2\pi i} D_t) \hat{u}](\xi, 0) = 0 \quad j=1, 2, \dots, m \quad (2.40)'$$

Grâce à l'hypothèse (II) sur les B_j , la solution de ce dernier problème est (pour chaque ξ) unique, donc on a

$$\hat{u}(\xi, t) \equiv 0. \quad \text{C.Q.F.D.}$$

Démonstration du théorème 2.2 : Le schéma est le suivant :

i) on vérifie qu'il existe une fonction $g(x, t) \in C^{4m+2}(\overline{R_+^n})$

$$\text{telle que } D^\alpha g = \sum_{j=1}^m (D^{\alpha_{K_j}}) \underset{(x)}{*} \omega_j \quad (2.41)$$

pour $|\alpha| \geq 2m$, et on étudie les propriétés de g .

ii) On considère la fonction $h = u-v-g \in C^{4m+2}(\overline{R_+^n})$ et on démontre que toutes ses dérivées d'ordre $4m$ sont $\equiv 0$; donc h est un polynôme d'ordre $\leq 4m-1$.

iii) On vérifie que les dérivées d'ordre $2m$ de h sont de carré sommable sur chaque plan $t = C^t \cdot e$, et donc $\equiv 0$ grâce à ii) ; d'où $D^\alpha h = 0$, i.e.

$$D^\alpha u - D^\alpha v - \sum_{j=1}^m (D^\alpha K_j) *_{(x)} \omega_j = 0 \quad \text{pour } |\alpha| = 2m$$

ce qui achèvera la démonstration.

Vérification de i) : L'existence de g est évidente car les conditions de compatibilité entre les dérivées sont vérifiées par les $D^\alpha K_j *_{(x)} \omega_j$. Ensuite on a

$$A g = 0 \quad \text{dans } t > 0 \quad (2.42)$$

$$[D_x^\beta B_j(D)] g(x,0) = D_x^\beta \omega_j(x) \quad j=1,2,\dots,m, \quad |\beta| = 2m-m_j \quad (2.42)'$$

en effet, comme A est homogène de degré $2m$, on déduit de

$$(2.41) \text{ que } A g = \sum_{j=1}^m (A K_j) *_{(x)} \omega_j = 0 \quad (\text{Prop. 2.6}) \text{ et les}$$

identités (2.42)' résultent de la proposition 2.9

On va vérifier que

$$a) \quad D^\alpha g \in L_2(R_+^n) \quad \text{pour } 2m \leq |\alpha| \leq 4m+2$$

b) $D^\alpha g$ considérée comme fonction de t est continue dans $]0, \infty[$ à valeurs dans $L_1(R^{n-1})$, pour $2m+1 \leq |\alpha| \leq 4m+1$

c) $D^\alpha g$ considérée comme fonction de t est bornée dans $[0, +\infty[$ à valeurs dans $L_2(R^{n-1})$ pour $2m \leq |\alpha| \leq 4m+1$.

Le point c) résulte de a) grâce à l'inclusion élémentaire :

$$H^1(0, \infty) \subset L_\infty(0, \infty)$$

Pour établir a) il faut majorer les termes $D^\alpha K_j(x) \omega_j$ $|\alpha| \geq 2m$; nous les exprimons à l'aide des noyaux $K_{j,q}$ (toutes les intégrales écrites convergent grâce aux inégalités (2.19) et (2.38)) :

$$D^\alpha K_j(x) \omega_j = D^\alpha \Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}} K_{j,q}(x) \omega_j$$

1°) Pour $|\alpha| - m_j - 1$ pair et $= 2v$ on écrit

$$D^\alpha K_j(x) \omega_j = (D^\alpha \Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}-v} K_{j,q})^{(*)}(x) \Delta_x^v \omega_j \quad (2.43)$$

2°) Pour $|\alpha| - m_j - 1$ impair et $= 2v+1$ on écrit

$$D^\alpha K_j(x) \omega_j = \sum_{i=1}^{n-1} (D^\alpha \frac{\partial}{\partial x_i} \Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}-v-1} K_{j,q})^{(*)}(x) (\frac{\partial}{\partial x_i} \Delta_x^v \omega_j) \quad (2.43)'$$

On applique le lemme 2.2 avec K remplacé successivement

par $D^{\alpha''} \Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}-v} K_{j,q}$ dans le cas 1°) et par $D^{\alpha''} \frac{\partial}{\partial x_i} \Delta_x^{\frac{n+q-1}{2}} K_{j,q}$

dans le cas 2°) avec $\alpha = \alpha' + \alpha''$, $|\alpha'| = 2m$; ce sont des dérivées d'ordre $n+q+m_j-2m$ de $K_{j,q}$ et les conditions sur K sont vérifiées (Prop. 2.7) . $\Delta_x^\nu \omega_j$ dans le cas 1°) et $\frac{\partial}{\partial x_i} \Delta_x^\nu \omega_j$ dans le cas 2°) sont des fonctions bornées; par ailleurs comme $\omega_j \in C^{N+2m-m_j-1}(R^{n-1})$ où N est aussi grand que l'on veut, on déduit des estimations (2.38) que

$$D_x^\beta \omega_j \in H^1(R^{n-1}) \subset H^{1/2}(R^{n-1}), \text{ pour } s \geq |\beta| \geq 2m-m_j-1$$

avec s aussi grand que l'on veut; le lemme 2.2 montre alors que

$$D^\alpha K_j(x) \omega_j \in L_2(R_+^n)$$

pour $2m \leq |\alpha| \leq 2m+k$, k aussi grand que l'on veut.

Le point b) résulte facilement des estimations (2.38) et de la Proposition 2.7, grâce à l'inclusion

$$L^1(R^{n-1}) * L^1(R^{n-1}) \subset L^1(R^{n-1}).$$

Vérification de ii) : On pose $w = u-v$, d'où $h = w-g$ alors

$$h \in C^{4m+2}(\overline{R_+^n}) \text{ et}$$

$$A h = 0 \quad \text{pour } t > 0 \quad (2.44)$$

$$[D_x^\beta B_j(D)] h(x,0) = 0 \quad j=1,2,\dots,m \quad |\beta| = 2m-m_j$$

$$\text{d'où} \quad \begin{cases} A D_x^\beta h = 0 & \text{pour } t > 0 \\ [B_j (D) D_x^\beta h] (x, 0) = 0 & j=1, 2, \dots, m \text{ pour } |\beta| = 2m \end{cases}$$

Les conditions du lemme 2.3 sont vérifiées par $D_x^\beta h$ pour $|\beta| = 2m$ (grâce aux estimations (2.37) et au point i)), on en déduit que

$$D_x^\beta h \equiv 0 \quad \text{pour } |\beta| = 2m \quad (2.45)$$

Le point ii) résulte de (2.44) et (2.45) ; on a évidemment

$$D^{\beta'} D_x^\beta h \equiv 0 \quad \text{pour } |\beta| = |\beta'| = 2m ; \text{ nous allons montrer}$$

comment de (2.44) et (2.45) on déduit que $D^{\beta'} D_x^\beta h \equiv 0$ pour

$$|\beta'| = 2m+1, \quad |\beta| = 2m-1 \quad \text{cela résulte immédiatement (2.45)}$$

lorsque $D^{\beta'}$ contient une dérivation en x ; il reste à consi-

dérer le cas $D^{\beta'} = \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^{2m+1}$, on remarque alors que grâce à

$$(2.44) \quad D^{\beta'} D_x^\beta h \text{ est combinaison linéaire de dérivées } D^{\beta'} D_x^\beta h$$

avec $|\beta| = |\beta'| = 2m$, qui sont $\equiv 0$. En répétant $2m$ fois ce

raisonnement on obtient $D^\beta h \equiv 0$ pour $|\beta| = 4m$.

Vérification de iii) C'est une conséquence évidente des majorations (2.37) et du point i) c) .

Le théorème est démontré.

III - LES ESTIMATIONS A PRIORI DANS L_p .

1 - On commence par les estimations a priori dans le cas du demi-espace et des coefficients constants. On démontre avant tout le

Lemme 3.1 : Si E est la solution élémentaire de l'opérateur

A (v. exposé II.4) alors $D^\alpha E \in \mathcal{L}(L_p(\mathbb{R}^n), L_p(\mathbb{R}^n))$ pour

$|\alpha| = 2m, \quad 1 < p < +\infty.$

Démonstration : E est une distribution tempérée et l'on a

$$A E = \delta$$

et donc $A D^\alpha E = D^\alpha \delta$ pour $|\alpha| = 2m$; on sait déjà que

$D^\alpha E$ est C^∞ dans $\mathbb{R}^n - \{0\}$ et homogène de degré $-n$; par transformation de Fourier on obtient

$$A(\xi) (D^\alpha E)^\wedge = \xi^\alpha$$

d'où $(D^\alpha E)^\wedge = \frac{\xi^\alpha}{A(\xi)}$ dans $\mathbb{R}^n - \{0\}$

et $(D^\alpha E)^\wedge \in C^\infty(\mathbb{R}^n - \{0\})$, $(D^\alpha E)^\wedge$ est homogène de degré 0.

Notons

$$C_\alpha = \int_{|\xi|=1} \frac{\xi^\alpha}{A(\xi)} d\omega_\xi \quad \Bigg/ \quad \int_{|\xi|=1} d\omega_\xi ;$$

alors

$$(D^\alpha E)^\wedge = \left(\frac{\xi^\alpha}{A(\xi)} - C_\alpha \right) + C_\alpha = f_\alpha(\xi) + C_\alpha$$

où $f_\alpha(\xi) \in C^\infty(\mathbb{R}^n - \{0\})$, $f_\alpha(\xi)$ est homogène de degré 0 et

$\int_{|\xi|=1} f_\alpha(\xi) d\omega_\xi = 0$ et donc par le théorème de Calderon - Zygmund

$\bar{F}f_a * \in \mathcal{L}(L_p(\mathbb{R}^n), L_p(\mathbb{R}^n))$.

Comme $D^\alpha E = \bar{F}f_a + C_a \delta$ on a le lemme.

Théorème 3.1 : Si l'opérateur A et les opérateurs B_j , $j=1,$

...,m vérifient les hypothèses (I) et (II) de l'exposé II.1,

si $u \in W_p^{2m+k}(\mathbb{R}_+^n)$, $k=0,1,2,\dots$, et si $u(P)$ est nulle pour

$|P| \geq 1$, alors on a l'inégalité suivante :

$$(3.1) \quad \|u\|_{2m+k,p} \leq C \left(\|Au\|_{k,p} + \sum_{j=1}^m \|B_j u\|_{2m+k-m_j-1/p,p} \right)$$

où la constante C ne dépend pas de u.

Démonstration. On observe avant tout que les termes de (3.1)

sont bien définis, car si $u \in W_p^{2m+k}(\mathbb{R}_+^n)$, alors $Au \in W_p^k(\mathbb{R}_+^n)$ et

$B_j u \in W_p^{2m+k-m_j-1/p}(\mathbb{R}^{n-1})$.

Il suffit évidemment de démontrer l'inégalité dans le cas

où $u \in C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, et même, grâce à la propriété du support de u ,

il suffit de vérifier les inégalités

$$(3.2) \quad \|D^\beta u\|_{0,p} \leq C \left(\|Au\|_{k,p} + \sum_{j=1}^m \|B_j u\|_{2m+k-m_j-1/p,p} \right)$$

pour $|\beta| = 2m+k$.

Pour simplifier on pose $Au = f(x,t)$ et $B_j u = \phi_j(x)$;
pour démontrer les inégalités (3.2) on utilise la "formule de
représentation" (2.36) :

$$D^\beta u(x,t) = D^\beta v(x,t) + \sum_{j=1}^m (D^\beta K_j) \underset{(x)}{*} \omega_j$$

pour $|\beta| = 2m+k$.

a) Majoration de $\|D^\beta v\|_{0,p}$: grâce à (2.34) on a

$$D^\beta v = D^\alpha E \underset{*}{*} D^{\beta-\alpha} f_N \quad \text{avec} \quad |\alpha| = 2m ;$$

on en déduit grâce au lemme 3.1, l'inégalité :

$$(3.3) \quad \|D^\beta v\|_{0,p} \leq C_1 \|f_N\|_{k,p} \leq C_2 \|Au\|_{k,p}$$

b) Majoration de $\|(D^\beta K_j) \underset{(x)}{*} \omega_j\|_{0,p}$: le même raisonne-
ment qu'au point a) i) de la démonstration du théorème 2.2 montre
que l'on peut exprimer $(D^\beta K_j) \underset{(x)}{*} \omega_j$ à l'aide des noyaux
 $K_{j,q}$ et l'on obtient grâce au lemme 2.2 la majoration suivante

$$(3.4) \quad \|(D^\beta K_j) \underset{(x)}{*} \omega_j\|_{0,p} \leq C_3 \sum_{|\gamma|=2m+k-m_j-1} | [D_x^\gamma (\phi_j - \psi_j)] |_{1-1/p,p}$$

où l'on a posé

$$|[\phi]|_{1-1/p,p} = \left\{ \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{|\phi(x) - \phi(y)|^p}{|x-y|^{n+p-2}} dx dy \right\}^{1/p}$$

On a grâce au théorème 1.1 et à (3.3) la majoration

$$(3.5) \quad \| [D_x^\gamma \psi_j] \|_{1-1/p, p} \leq C_4 \| Au \|_{k, p} \quad \text{avec} \quad |\gamma| = 2m+k-m_j-1$$

et les inégalités (3.2) résultent de (3.3), (3.4), (3.5) .

C.Q.F.D.

2 - On donne les estimations a priori dans le cas du demi-espace et des coefficients variables.

A présent A est un opérateur elliptique d'ordre $2m$ à coefficients $C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ à valeurs complexes et les B_j sont m opérateurs-frontière d'ordre $m_j \leq 2m-1$ respectivement, à coefficients $C^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ à valeurs complexes.

On fait les hypothèses suivantes :

(I) Si $P = (x, 0) \in \mathbb{R}^{n-1}$, si A^0 désigne la partie homogène de degré $2m$ de A , alors $A^0(P, D)$ est proprement elliptique.

(II) Si B_j^0 désigne la partie homogène de degré m_j de B_j , alors le système $\left\{ B_j^0(x, D) \right\}_{j=1}^m$ recouvre $A^0(P, D)$ avec $P = (x, 0)$.

On pose $\Sigma(R) = \{ P = (x, t) \in \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^{n-1}, t > 0, |P| < R \}$

On démontre le

Théorème 3.2 : Il existe $r_1 < +\infty$ tel que pour $r \leq r_1$ toute

$u \in W_p^{2m}(\mathbb{R}_+^n)$ à support dans $\Sigma(r)$, avec $Au \in W_p^k(\mathbb{R}_+^n)$ et

$B_j u \in W_p^{2m+k-m_j-1/p}(\mathbb{R}^{n-1})$, $k=0, 1, 2, \dots$, est un élément de

$W_p^{2m+k}(\mathbb{R}_+^n)$, l'inégalité suivante ayant lieu :

$$(3.6) \quad \|u\|_{2m+k,p} \leq C \left\{ \|Au\|_{k,p} + \sum_{j=1}^m \|B_j u\|_{2m+k-m_j-1/p,p} + \|u\|_{0,p} \right\}$$

où la constante C ne dépend pas de u.

Démonstration. On démontre d'abord l'inégalité (3.6) pour

$u \in W_p^{2m+k}(\mathbb{R}_+^n)$. On applique le théorème 3.1 aux opérateurs

$A^0(0,D)$, $B_1^0(0,D)$, ..., $B_m^0(0,D)$ et on a donc

$$(3.7) \quad \|u\|_{2m+k,p} \leq C \left\{ \|f\|_{k,p} + \sum_{j=1}^m \|\phi_j\|_{2m+k-m_j-1/p,p} \right\}$$

avec

$$f = A^0(0,D)u = A(P,D)u + \{A^0(0,D) - A^0(P,D)\}u - L(P,D)u$$

$$\begin{aligned} \phi_j &= B_j^0(0,D)u(x,0) = B_j(x,D)u(x,0) - \{B_j^0(0,D) - B_j^0(x,D)\}u(x,0) \\ &\quad - R_j(x,D)u(x,0) \end{aligned}$$

où $L = A - A^0$ et $R_j = B_j - B_j^0$, $j=1, \dots, m$.

On vérifie facilement les inégalités suivantes

$$\|L(P,D)u\|_{k,p} \leq C_1 \|u\|_{2m+k-1,p}$$

$$\|\{A^0(0,D) - A(P,D)\}u\|_{k,p} \leq C_2 \left\{ r \|u\|_{2m+k,p} + \|u\|_{2m+k-1,p} \right\}$$

$$\|R_j(x,D)u(x,0)\|_{2m+k-m_j-1/p,p} \leq C_3 \|u\|_{2m+k-1,p}, \quad j=1, \dots, m$$

$$\|\{B_j^0(0,D) - B_j^0(x,D)\}u(x,0)\|_{2m+k-m_j-1/p,p} \leq$$

$$\leq C_4 \left\{ r \|u\|_{2m+k,p} + \|u\|_{2m+k-1,p} \right\} \quad j=1,2,\dots,m$$

d'où grâce à la proposition 1.5, on déduit de (3.7) :

$$\|u\|_{2m+k,p} \leq C_5 \left\{ \|Au\|_{k,p} + \sum_{j=1}^m \|B_j u\|_{2m+k-m_j-1/p,p} + \|u\|_{0,p} + C_6 r \|u\|_{2m+k,p} \right\}.$$

On choisit r_1 tel que pour $r \leq r_1$, on a $C_5 C_6 r \leq \frac{1}{2}$ et on

a (3.6) pour $u \in W_p^{2m+k}(\mathbb{R}_+^n)$, $k=0,1,2,\dots$.

Pour achever la démonstration du théorème il suffit de démontrer le lemme suivant de régularisation.

Lemme 3.2 : Si $u \in W_p^{2m}(\mathbb{R}_+^n)$ à support dans $\Sigma(r)$ est telle que $Au \in W_p^1(\mathbb{R}_+^n)$ et $B_j u \in W_p^{2m+1-m_j-1/p}(\mathbb{R}^{n-1})$ alors $u \in W_p^{2m+1}(\mathbb{R}_+^n)$.

Démonstration : On utilise l'inégalité (3.6) pour $k=0$ et la méthode des quotients différentiels :

$$\Delta_{i,h} u(x,t) = \frac{u(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i+h, x_{i+1}, \dots, x_{n-1}, t) - u(x_1, \dots, x_i, \dots, x_{n-1}, t)}{h}$$

Pour h assez petit et $i=1,2,\dots,n-1$, $\Delta_{i,h} u$ a son support dans $\Sigma(r)$ et par conséquent on a :

$$(3.8) \quad \|\Delta_{i,h} u\|_{2m,p} \leq C \left\{ \|A \Delta_{i,h} u\|_{1,p} + \sum_{j=1}^m \|B_j \Delta_{i,h} u\|_{2m+1-m_j-1/p,p} + \|\Delta_{i,h} u\|_{0,p} \right\}.$$

Majorons les termes de droite ; on vérifie aisément les inégalités

$$\|A \Delta_{i,h} u - \Delta_{i,h} A u\|_{1,p} \leq C \|u\|_{2m,p}$$

$$\|B_j \Delta_{i,h} u - \Delta_{i,h} B_j u\|_{2m+1-m_j-1/p,p} \leq C \|u\|_{2m,p} \quad j=1,\dots,m$$

les constantes étant indépendantes de h .

On obtient alors de (3.8) :

$$\|\Delta_{i,h} u\|_{2m,p} \leq C \left\{ \|A u\|_{1,p} + \sum_{j=1}^m \|B_j u\|_{2m+1-m_j-1/p,p} + \|u\|_{0,p} \right\}$$

et donc $\Delta_{i,h} u$ demeure dans un ensemble borné de $W_p^{2m}(\mathbb{R}_+^n)$.

Comme $W_p^{2m}(\mathbb{R}_+^n)$ est réflexif (car $1 < p < +\infty$) on en déduit faisant $h \rightarrow 0$ que

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} \in W_p^{2m}(\mathbb{R}_+^n) \quad i=1,2,\dots,n-1$$

Comme l'opérateur A est elliptique et $A u \in W_p^1(\mathbb{R}_+^n)$ on en déduit

$$\text{que } \frac{\partial^{2m} u}{\partial t^{2m}} \in W_p^1(\mathbb{R}_+^n) \text{ et donc } u \in W_p^{2m+1}(\mathbb{R}_+^n).$$

C.Q.F.D.

3 - On démontre quelques estimations dans L_p sans conditions aux limites, c.à.d. "à l'intérieur".

On commence par le théorème suivant analogue au théorème 3.1, où A est un opérateur elliptique à coefficients constants, comme dans 1.

Théorème 3.3 : Si l'opérateur A vérifie l'hypothèse (I) de l'exposé II.1 , si $u \in W_p^{2m}(\mathbb{R}^n)$ et si $u(P)$ est nulle pour $|P| \geq 1$ alors on a l'inégalité

$$(3.9) \quad \|u\|_{2m,p} \leq C \|Au\|_{0,p} ;$$

si de plus $Au \in W_p^k(\mathbb{R}^n)$, alors $u \in W_p^{2m+k}(\mathbb{R}^n)$ et l'on a l'inégalité

$$(3.10) \quad \|u\|_{2m+k,p} \leq C \|Au\|_{k,p} .$$

Démonstration : Il suffit évidemment de démontrer (3.9) pour $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ et même, grâce à la propriété du support de u , il suffit de vérifier les inégalités

$$(3.11) \quad \|D^\beta u\|_{0,p} \leq C \|Au\|_{0,p} \quad \text{pour } |\beta| = 2m .$$

Il suffit alors d'observer que $u = E * Au$ et d'appliquer le lemme 3.1 pour avoir (3.11).

Pour démontrer l'autre partie du théorème il suffit d'utiliser la méthode des quotients différentiels.

C.Q.F.D.

Soit à présent A un opérateur elliptique d'ordre $2m$ à coefficients $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ à valeurs complexes. A l'aide du raisonnement utilisé dans la démonstration du théorème 3.2 on peut

déduire du théorème 3.3 le théorème suivant.

Théorème 3.4 : Il existe $r'_1 < +\infty$ tel que pour $r \leq r'_1$ toute $u \in W_p^{2m}(\mathbb{R}^n)$ nulle pour $|P| \geq r$, avec $Au \in W_p^k(\mathbb{R}^n)$, soit un élément de $W_p^{2m+k}(\mathbb{R}^n)$, l'inégalité suivante ayant lieu :

$$(3.12) \quad \|u\|_{2m+k,p} \leq C \left\{ \|Au\|_{k,p} + \|u\|_{0,p} \right\}$$

où la constante C ne dépend pas de u .

4 - On peut établir les estimations a priori dans $L_p(\Omega)$ avec Ω ouvert borné et "très régulier" de $\mathbb{R}^n$; on note x le point générique de $\mathbb{R}^n$.

$$A = A(x, D) = \sum_{|\alpha| \leq 2m} a_\alpha(x) D^\alpha$$

est un opérateur elliptique d'ordre $2m$ à coefficients $C^\infty(\overline{\Omega})$

à valeurs complexes; on fait sur A l'hypothèse suivante :

(I) pour chaque $x \in \Gamma$, $A^0(x, D)$ est proprement elliptique,
c.à.d. $A^0(x, D)$ est elliptique dans $\overline{\Omega}$ et pour chaque $\xi \in \mathbb{R}^n - \{0\}$
parallèle à Γ dans x , et chaque $v \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ normal à Γ
dans x le polynôme $A^0(\tau) = A^0(x, \xi + \tau v)$ a m racines $\lambda_k^+(x, \xi, v)$
 $k=1, \dots, m$ avec parties imaginaires positives.

Si Γ est connexe l'ellipticité de A et la continuité des

coefficients entraînent que si la condition (I) est vérifiée en un point $x_0 \in \Gamma$ alors elle est vérifiée pour tout $x \in \Gamma$.

Si A vérifie la condition (I) on dit que A est proprement elliptique dans $\bar{\Omega}$; comme on l'a observé dans l'exposé II, Remarque 2.1, la condition (I) n'est une restriction seulement, que lorsque $n = 2$.

$$B_j = B_j(x, D) = \sum_{|\mu| \leq m_j} b_{j\mu}(x) D^\mu \quad j=1, \dots, m$$

sont m opérateurs à coefficients $C^\infty(\Gamma)$ à valeurs complexes d'ordre $m_j \leq 2m-1$, qui sont dits "opérateurs-frontière". On

fait sur le système $\{B_j\}_{j=1}^m$ l'hypothèse suivante :

(II) Les B_j , $j=1, \dots, m$, recouvrent A , i.e. pour chaque $x \in \Gamma$, le système $\{B_j^0(x, D)\}_{j=1}^m$ recouvre l'opérateur $A^0(x, D)$ c.à.d. pour chaque $\xi \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ parallèle à Γ dans x et chaque $v \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ normal à Γ dans x , les polynômes $B_j^0(x, \xi + \tau v) = B_j^0(\tau)$, $j=1, \dots, m$ sont linéairement indépendants modulo le polynôme

$$A^+(\tau) = \prod_{k=1}^m (\tau - \lambda_k^+(x_0; \xi, v)) .$$

Si l'on pose

$$A^-(\tau) = \prod_{k=1}^m (\tau - \lambda_k^-(x_i; \xi, v))$$

il est facile de vérifier que les polynômes $B_j^0(\tau)$, $j=1, \dots, m$ sont aussi linéairement indépendants modulo $A^-(\tau)$.

On démontre le théorème suivant :

Théorème 3.5 : Sous les hypothèses (I), (II), si $u \in W_p^{2m}(\Omega)$,

$Au \in W_p^k(\Omega)$ $B_j u \in W_p^{2m+k-m_j-1/p}(\Gamma)$, $j=1, \dots, m$, $k=0, 1, 2, \dots$,

alors $u \in W_p^{2m+k}(\Omega)$ et l'inégalité suivante a lieu :

$$\|u\|_{2m+k,p} \leq C \left\{ \|Au\|_{k,p} + \sum_{j=1}^m \|B_j u\|_{2m+k-m_j-1/p, \Gamma} + \|u\|_{0,p} \right\}$$

où la constante C ne dépend pas de u.

Démonstration : En utilisant les propositions 1.1, 1.2 et 1.5

on se ramène par cartes locales au cas du demi-espace et on ap-

plique le théorème 3.2, ou bien on se ramène au cas de R^n et

on applique le théorème 3.4.

IV - FORMULES DE GREEN .

La démonstration des formules de Green réduit le problème au cas d'une demi-boule fermée $\bar{\Sigma} \subset \overline{\mathbb{R}_+^n}$ où $\Sigma = \{P = (x, t) ; |P| < R, t > 0\}$. On va donc commencer par ce cas.

1 - Soient

$$\begin{aligned} B_j &= B_j(x, D) = \sum_{|\mu| \leq m_j} b_{j\mu}(x) D^\mu \\ (4.1) \quad &= \sum_{\substack{|\mu'| + \mu_n \leq m_j \\ \mu = (\mu', \mu_n)}} b_{j\mu}(x) D_x^{\mu'} D_t^{\mu_n} \quad j=1, \dots, m \end{aligned}$$

des opérateurs définis sur $\partial_1 \Sigma = \{P \in \bar{\Sigma} ; t = 0\}$; on fait les hypothèses suivantes :

- (i) les coefficients $b_{j\mu}(x) \in C^\infty(\partial_1 \Sigma)$ sont à valeurs complexes ;
- (ii) pour $j=1, \dots, m$ on a $m_j \leq 2m-1$.

Introduisons les définitions suivantes :

Définition 4.1 : On dit que le système d'opérateurs $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$ est un système normal dans $\partial_1 \Sigma$ si les opérateurs B_j vérifient les conditions (i), (ii) et

(iii) pour $i \neq j$ on a $m_i \neq m_j$;

(iv) si $\mu = (0, \dots, 0, m_j)$, alors on a $b_{j\mu}(x) \neq 0$.

Définition 4.2 : On dit que le système d'opérateurs $\{\phi_j\}_{j=1}^{2m}$ est un système de Dirichlet d'ordre $2m$ dans $\mathcal{D}_1[\]$ s'il est normal et si $m_j = j-1$, où m_j est l'ordre de ϕ_j , $j = 1, \dots, 2m$.

De la définition 4.2 il découle que les opérateurs ϕ_j peuvent être écrits de la manière suivante :

$$(4.2) \quad \phi_j = \oplus_{jj} D_t^{j-1} + \sum_{h=1}^{j-1} \oplus_{jh} D_t^{h-1} \quad j=1, \dots, 2m$$

avec $\oplus_{jj}$ fonctions $\neq 0$ de $C^\infty(\mathcal{D}_1[\])$ et $\oplus_{jh}$ opérateurs tangentiels⁽¹⁾ d'ordre $\leq j-h$ dans $\mathcal{D}_1[\]$ à coefficients $C^\infty(\mathcal{D}_1[\])$.

Proposition 4.1 : Si $\{B_j\}_{j=1}^m$ est un système normal dans $\mathcal{D}_1[\]$ il existe un système normal dans $\mathcal{D}_1[\], \{C_j\}_{j=1}^m$ tel que $\{B_j\}_{j=1}^m \cup \{C_j\}_{j=1}^m$ soit un système de Dirichlet d'ordre $2m$, si l'on numérote les opérateurs dans un ordre correct.

En effet il suffit de prendre

$$C_j = D_t^{\mu_j} \quad j=1, \dots, m$$

de façon que les $2m$ nombres $m_j, \mu_j, j=1, \dots, m$ parcourent l'intervalle $[0, 2m-1]$ de $\mathbb{Z}$.

Proposition 4.2 : Si $\{\phi_j\}_{j=1}^{2m}$ est un système de Dirichlet, alors pour chaque système $\{\phi_j\}_{j=1}^{2m}$ de fonctions de $C^\infty(\mathcal{D}_1[\])$ il existe

(1) Un opérateur qui contient seulement des dérivées en x est dit "opérateur tangentiel".

une fonction $v \in C^\infty(\bar{\Sigma})$ telle que

$$\mathcal{D}_j v = \phi_j \quad j=1, \dots, 2m .$$

En utilisant (4.3) on voit que les dérivées en t de v sont déterminées par les identités :

$$\begin{aligned} v &= \frac{\phi_1}{\Theta_{11}} = \psi_1 \\ D_t v &= (\phi_2 - \Theta_{21} \psi_1) \frac{1}{\Theta_{22}} = \psi_2 \\ (4.3) \quad &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$D_t^{2m-1} v = (\phi_{2m} - \sum_{h=1}^{2m-2} \Theta_{2m,h} \psi_h) \frac{1}{\Theta_{2m,2m}} = \psi_{2m} ;$$

il est alors facile de trouver une fonction $v \in C^\infty(\bar{\Sigma})$ qui vérifie les identités (4.3) et on voit aisément que $\mathcal{D}_j v = \phi_j$, $j=1, \dots, 2m$.

Proposition 4.3 : Si $\{\mathcal{D}_j\}_{j=1}^{2m}$ et $\{\mathcal{D}_j^\#\}_{j=1}^{2m}$ sont deux systèmes de Dirichlet, alors on a

$$(4.4) \quad \mathcal{D}_j^\# = \sum_{s=1}^j \Lambda_{js} \mathcal{D}_s \quad j=1, \dots, 2m$$

$$(4.5) \quad \mathcal{D}_j = \sum_{s=1}^j \Lambda_{js}^\# \mathcal{D}_s^\# \quad j=1, \dots, 2m$$

où Λ_{jj} et $\Lambda_{jj}^\#$ sont des fonctions $\neq 0$ de $C^\infty(\partial_1 \bar{\Sigma})$ et les Λ_{js} et $\Lambda_{js}^\#$ sont des opérateurs tangentiels d'ordre $\leq j-s$ à coefficients $C^\infty(\partial_1 \bar{\Sigma})$.

Démonstration : Il suffit de vérifier (4.4); il suffit même de

prendre $\mathcal{D}_j^\# = D_t^{j-1}$, $j=1, \dots, 2m$; en effet si l'on a

$$\mathcal{D}_j^\# = \sum_{h=1}^j \oplus_{jh}^\# D_t^{h-1} \quad j=1, \dots, 2m$$

et

$$(4.6) \quad D_t^{h-1} = \sum_{s=1}^h \Gamma_{hs} \mathcal{D}_s \quad h=1, \dots, 2m$$

alors on obtient

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_j^\# &= \sum_{h=1}^j \oplus_{jh}^\# D_t^{h-1} = \sum_{h=1}^j \oplus_{jh}^\# \sum_{s=1}^h \Gamma_{hs} \mathcal{D}_s \\ &= \sum_{s=1}^j \Lambda_{js} \mathcal{D}_s \quad j=1, \dots, 2m \end{aligned}$$

où $\Lambda_{jj} = \oplus_{jj}^\# \Gamma_{jj}$ est une fonction $\neq 0$ de $C^\infty(\partial_1 \mathbb{R})$ et

$\Lambda_{js} = \sum_{h=s}^j \oplus_{jh}^\# \Gamma_{hs}$ est un opérateur tangentiel d'ordre

$\leq (j-h) + (h-s) = j-s$ à coefficients $C^\infty(\partial_1 \mathbb{R})$.

On va donc montrer (4.6) par récurrence.

Pour $h = 1$ (4.6) est vraie.

Supposons que (4.6) soit vraie pour $h < k \leq 2m$ et démon-

trons (4.6) pour $h = k$. De (4.2) on déduit

$$\begin{aligned} \oplus_{kk} D_t^{k-1} &= \mathcal{D}_k - \sum_{h=1}^{k-1} \oplus_{kh} D_t^{h-1} \\ &= \mathcal{D}_k - \sum_{h=1}^{k-1} \oplus_{kh} \sum_{s=1}^h \Gamma_{hs} \mathcal{D}_s \\ &= \mathcal{D}_k - \sum_{s=1}^{k-1} \left(\sum_{h=s}^{k-1} \oplus_{kh} \Gamma_{hs} \right) \mathcal{D}_s \end{aligned}$$

et on a donc

$$D_t^{k-1} = \frac{1}{\oplus_{kk}} \mathcal{D}_k - \frac{1}{\oplus_{kk}} \sum_{s=1}^{k-1} \left(\sum_{h=s}^{k-1} \oplus_{kh} \Gamma_{hs} \right) \mathcal{D}_s .$$

C.Q.F.D.

2 - On va étudier certaines généralisations des formules bien connues de Green.

$$(4.7) \quad \begin{aligned} \text{Soit } A = A(P, D) &= \sum_{|\alpha| \leq 2m} a_\alpha(x, t) D^\alpha \\ &= \sum_{\substack{|\alpha| + \alpha_n \leq 2m \\ \alpha = (\alpha', \alpha_n)}} a_\alpha(x, t) D_x^{\alpha'} D_t^{\alpha_n} \end{aligned}$$

un opérateur différentiel défini dans $\bar{\Sigma}$; on fait les hypothèses suivantes :

(i) les coefficients $a_\alpha(x, t) \in C^\infty(\bar{\Sigma})$ et sont à valeurs complexes ;

(ii) A est elliptique dans $\bar{\Sigma}$.

Soient u et v deux fonctions de $C^\infty(\bar{\Sigma})$, nulles dans un voisinage de $\partial_2 \Sigma = \{ P ; |P| = R , t > 0 \}$; alors, grâce à

(i) , en intégrant par parties on obtient

$$(4.8) \quad \begin{aligned} \int_{\Sigma} A u \bar{v} \, dx \, dt &= \sum_{|\alpha| \leq 2m} \int_{\Sigma} a_\alpha(x, t) D^\alpha u(x, t) \overline{v(x, t)} \, dx \, dt \\ &= \sum_{|\alpha'| + \alpha_n \leq 2m} (-1)^{|\alpha'|} \int_{\Sigma} D_t^{\alpha_n} u(x, t) \overline{D_x^{\alpha'} (a_\alpha(x, t) v(x, t))} \, dx \, dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{\substack{|\alpha'| + \alpha_n \leq 2m \\ \alpha_n \geq 1}} (-1)^{|\alpha'|} \int_{\partial_1 \Sigma} \left[D_t^{\alpha_n - 1} u(x, t) \overline{D_x^{\alpha'} (a_\alpha(x, t) v(x, t))} \right]_{t=0} dx + \\
 &+ \sum_{\substack{|\alpha'| + \alpha_n \leq 2m \\ \alpha_n \geq 1}} (-1)^{|\alpha'| + 1} \int_{\Sigma} D_t^{\alpha_n - 1} u(x, t) \overline{D_t D_x^{\alpha'} (a_\alpha(x, t) v(x, t))} dx dt + \\
 &+ \sum_{|\alpha'| \leq 2m} (-1)^{|\alpha'|} \int_{\Sigma} u(x, t) \overline{D_x^{\alpha'} (a_\alpha(x, t) v(x, t))} dx dt = \\
 &= \sum_{|\alpha| \leq 2m} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Sigma} u(x, t) \overline{D^\alpha (a_\alpha(x, t) v(x, t))} dx dt + \\
 &+ \sum_{s=1}^{2m} \int_{\partial_1 \Sigma} \left[D_t^{s-1} u(x, t) \overline{N_{2m-s+1} v(x, t)} \right]_{t=0} dx
 \end{aligned}$$

où

$$(4.9) \quad N_{2m-s+1} v = \sum_{\substack{|\alpha| \leq 2m \\ \alpha_n \geq s}} (-1)^{|\alpha| - s} D_t^{\alpha_n - s} \overline{D_x^{\alpha'} (a_\alpha(x, t) v(x, t))}$$

Des hypothèses (i) et (ii) il découle que le système $\{N_{2m-s+1}\}_{s=1}^{2m}$

est un système de Dirichlet.

On pose

$$A' v = \sum_{|\alpha| \leq 2m} (-1)^{|\alpha|} \overline{D^\alpha (a_\alpha(x, t) v)}$$

et on dit que A' est l'adjoint formel de A car on a

$$\int_{\Sigma} Au \overline{v} dx dt = \int_{\Sigma} u \overline{A' v} dx dt \quad \text{pour } u, v \in C_0^\infty(\Sigma)$$

Si l'on se donne un système d'opérateurs $\{B_j\}_{j=1}^m$ vérifiant

les hypothèses (i) - (iv) de 1, et si $\{C_j\}_{j=1}^m$ est un système

normal dans $\partial_1 \Sigma$ tel que $\{B_j\}_{j=1}^m \cup \{C_j\}_{j=1}^m$ soit un système

de Dirichlet (si l'on numérote les opérateurs dans un ordre correct)

que l'on notera $\left\{ \mathcal{D}_j \right\}_{j=1}^{2m}$, alors, grâce à la prop.4.3., on a

$$D_t^{s-1} = \sum_{\rho=1}^s \Lambda_{s\rho} \mathcal{D}_\rho \quad s = 1, \dots, 2m.$$

En observant que $u(x,0)$ et $v(x,0)$ sont à support compact dans $\partial_1 \Sigma$ et en notant $\Lambda'_{s\rho}$ l'adjoint formel de $\Lambda_{s\rho}$ ⁽¹⁾, on obtient :

$$\begin{aligned} (4.10) \quad & \int_{\Sigma} Au \bar{v} \, dx \, dt - \int_{\Sigma} u \overline{A' v} \, dx \, dt = \\ & = \sum_{s=1}^{2m} \int_{\partial_1 \Sigma} \left[D_t^{s-1} u(x,t) \overline{N_{2m-s+1} v(x,t)} \right]_{t=0} dx \\ & = \sum_{\rho=1}^{2m} \int_{\partial_1 \Sigma} \left[\mathcal{D}_\rho u(x,t) \right]_{t=0} \sum_{s=\rho}^{2m} \Lambda'_{s\rho} \left[N_{2m-s+1} v(x,t) \right]_{t=0} dx \end{aligned}$$

On vérifie aisément que le système d'opérateurs

$$\begin{aligned} \mathcal{D}'_{2m-\rho+1} &= \sum_{s=\rho}^{2m} \Lambda'_{s\rho} N_{2m-s+1} \\ &= \bar{\Lambda}_{\rho\rho} N_{2m-\rho+1} + \sum_{s=\rho+1}^{2m} \Lambda'_{s\rho} N_{2m-s+1} \\ &= (-1)^{|\alpha|-\rho} \bar{\Lambda}_{\rho\rho}(x) a_{(0,\dots,0,2m)}(x,0) D_t^{2m-\rho} + \\ & \quad + \sum_{j=1}^{2m-\rho} \bigoplus_{2m-\rho+1,j} D_t^{j-1} \quad \rho = 1, \dots, 2m, \end{aligned}$$

avec $\Lambda_{\rho\rho}(x)$ fonction $\neq 0$ de $C^\infty(\partial_1 \Sigma)$, $a_{(0,\dots,0,2m)}(x,0)$

(1) $\Lambda'_{s\rho}$ est défini par l'identité

$$\int_{\partial_1 \Sigma} \Lambda_{s\rho} \phi \bar{\psi} \, dx = \int_{\partial_1 \Sigma} \phi \overline{\Lambda'_{s\rho} \psi} \, dx$$

pour $\phi, \psi \in C^\infty(\partial_1 \Sigma)$ nulles au bord.

fonction $\neq 0$ de $C^\infty(\partial_1 \Sigma)$ grâce à (i) et (ii), et $\mathcal{D}_{2m-\rho+1,j}$ opérateur tangentiel d'ordre $\leq 2m-\rho+1$ à coefficients $C^\infty(\partial_1 \Sigma)$, est un système de Dirichlet d'ordre $2m$.

Si l'on note B_j' les $\mathcal{D}'_{2m-\rho+1}$ qui correspondent aux $\mathcal{D}_\rho = C_j$ et C_j' les $-\mathcal{D}'_{2m-\rho+1}$ qui correspondent aux $\mathcal{D}_\rho = B_j$ on a la formule de Green suivante :

$$\begin{aligned}
 (4.11) \quad & \int_{\Sigma} A u \bar{v} \, dx \, dt - \int_{\Sigma} u \overline{A' v} \, dx \, dt = \\
 & = \sum_{j=1}^{2m} \int_{\partial_1 \Sigma} \left[\mathcal{D}_\rho u(x,t) \overline{\mathcal{D}'_{2m-\rho+1} v(x,t)} \right]_{t=0} dx \\
 & = \sum_{j=1}^m \int_{\partial_1 \Sigma} C_j u \overline{B_j' v} \, dx - \sum_{j=1}^m \int_{\partial_1 \Sigma} B_j u \overline{C_j' v} \, dx ;
 \end{aligned}$$

de la construction faite il découle que si C_j est d'ordre μ_j , alors B_j' est d'ordre $m_j' = 2m - \mu_j - 1$ et C_j' est d'ordre $2m - m_j - 1$, $j = 1, \dots, m$.

3 - On peut étendre les résultats précédents aux opérateurs A et $\{B_j\}_{j=1}^m$ considérés dans l'Introduction (v. exposé I, 2 et aussi exposé III, 4).

Définition 4.3 : On dit que le système d'opérateurs-frontières

$\{B_j\}_{j=1}^m$ est un système normal si :

(i) pour $j \neq k$ on a $m_j \neq m_k$;

(ii) Γ est partout "non caractéristique" pour chaque B_j , c.a.

d. pour chaque $j = 1, \dots, m$ et chaque $x \in \Gamma$ le polynôme caractéristique

$$B_j^o(x, v) = \sum_{|\mu|=m_j} b_{j\mu}(x) v^\mu$$

est $\neq 0$ pour $v \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ vecteur normal à Γ au point x .

Définition 4.4 : On dit que le système d'opérateurs-frontières

$\left\{ \mathcal{D}_j \right\}_{j=1}^{2m}$ est un système de Dirichlet d'ordre $2m$ si

(i) $\left\{ \mathcal{D}_j \right\}_{j=1}^{2m}$ est un système normal ;

(ii) $m_j = j-1$, $j = 1, \dots, 2m$.

On peut démontrer le théorème suivant.

Théorème 4.1.a) Si $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$ est un système normal il existe
un système normal $\left\{ C_j \right\}_{j=1}^m$ tel que $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m \cup \left\{ C_j \right\}_{j=1}^m$ soit un
système de Dirichlet si l'on numérote les opérateurs dans un or-
dre correct.

b) Si $\left\{ \mathcal{D}_j \right\}_{j=1}^{2m}$ est un système de Dirichlet, alors
pour chaque système $\left\{ \phi_j \right\}_{j=1}^{2m}$ de fonctions de $C^\infty(\Gamma)$ il existe
une fonction $v \in C^\infty(\Omega)$ telle que

$$\mathcal{D}_j v = \phi_j \quad j = 1, \dots, 2m.$$

c) Si $\left\{ \mathcal{D}_j \right\}_{j=1}^{2m}$ et $\left\{ \overset{\#}{\mathcal{D}}_j \right\}_{j=1}^{2m}$ sont deux systèmes de Dirichlet d'ordre $2m$, alors on a

$$\overset{\#}{\mathcal{D}}_j = \sum_{s=1}^j \Lambda_{js} \mathcal{D}_s \quad j = 1, \dots, 2m$$

$$\mathcal{D}_j = \sum_{s=1}^j \overset{\#}{\Lambda}_{js} \overset{\#}{\mathcal{D}}_s \quad j = 1, \dots, 2m$$

où Λ_{jj} et $\overset{\#}{\Lambda}_{jj}$ sont des fonctions $\neq 0$ de $C^\infty(\Gamma)$ et les $\overset{\#}{\Lambda}_{js}$ et Λ_{js} sont des opérateurs différentiels tangentiels à Γ (1) d'ordre $\leq j-s$.

d) Si $\left\{ \mathcal{D}_j \right\}_{j=1}^{2m}$ est un système de Dirichlet d'ordre $2m$, alors pour chaque système $\left\{ \phi_j \right\}_{j=1}^{2m} \in \prod_{j=1}^{2m} W_p^{2m+r-j+1-1/p}(\Gamma)$ il existe $v \in W_p^{2m+r}(\Omega)$ telle que

$$\mathcal{D}_j v = \phi_j \quad j = 1, \dots, 2m,$$

l'application $\left\{ \phi_j \right\}_{j=1}^{2m} \rightsquigarrow v$ étant continue de

$\prod_{j=1}^{2m} W_p^{2m+r-j+1-1/p}(\Gamma)$ dans $W_p^{2m+r}(\Omega)$, r réel ≥ 0 , $r - \frac{1}{p}$ non entier lorsque $p \neq 2$.

Pour démontrer les points a), b), c) il suffit de se ramener

(1) Un opérateur défini sur Γ et qui opère de $C^\infty(\Gamma)$ dans $C^\infty(\Gamma)$ est dit "opérateur tangential à Γ ".

par cartes locales à la demi-boule Σ et d'utiliser les propositions 4.1, 4.2, 4.3 ; pour démontrer d) grâce à c) il suffit de considérer le cas $\mathcal{D}_j = \gamma_{j-1}$, $j=1, \dots, 2m$; alors, du théorème 1.1, on déduit le résultat.

$$\text{Si } u, v \in C^\infty(\bar{\Omega}) \text{ posons } (u, v) = \int_{\Omega} u \bar{v} \, dx .$$

Définition 4.5.: Si A est l'opérateur défini dans $\bar{\Omega}$ par

$$A = \sum_{|\alpha| \leq 2m} a_\alpha(x) D^\alpha$$

alors on dit que l'opérateur défini dans $\bar{\Omega}$ par :

$$(4.12) \quad A' . = \sum_{|\alpha| \leq 2m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (\overline{a_\alpha(x)}) .$$

est l'adjoint formel de A .

Il est facile de vérifier que A est elliptique si et seulement si son adjoint formel A' est elliptique.

On a le théorème suivant :

Théorème 4.2 : Etant donné l'opérateur A et le système normal

$$\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m \quad \text{il existe un système normal} \quad \left\{ C_j \right\}_{j=1}^m, \text{ tel que le sys-}$$

tème $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m \cup \left\{ C_j \right\}_{j=1}^m$ soit un système de Dirichlet (si l'on

numérote les opérateurs dans un ordre correct), et deux systèmes

$$\text{normaux} \quad \left\{ B'_j \right\}_{j=1}^m \text{ et } \left\{ C'_j \right\}_{j=1}^m, \text{ tels que } \left\{ B'_j \right\}_{j=1}^m \cup \left\{ C'_j \right\}_{j=1}^m$$

soit un système de Dirichlet (si l'on numérote les opérateurs dans un ordre correct), de façon que pour chaque $u, v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ on ait la formule de Green suivante :

$$(4.13) \quad (A u, v) - (u, A' v) = \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} C_j u \overline{B_j' v} d\sigma - \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} B_j u \overline{C_j' v} d\sigma.$$

Par cartes locales on se ramène à la formule (4.11) dans Σ .

Définition 4.6 : On dit que le système normal d'opérateurs-frontière $\{B_j'\}_{j=1}^m$ est adjoint au système $\{B_j\}_{j=1}^m$ relativement à A [et à la formule de Green (4.13)] s'il existe deux systèmes normaux $\{C_j\}_{j=1}^m$ et $\{C_j'\}_{j=1}^m$ tels que pour chaque $u, v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ soit valable la formule de Green (4.13).

Corollaire 4.1. : Etant donnés A , le système normal $\{B_j\}_{j=1}^m$ et $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ on a $B_j u = 0$, $j = 1, \dots, m$ si et seulement si

$$(A u, v) = (u, A' v)$$

pour chaque $v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ vérifiant $B_j' v = 0$, $j = 1, \dots, m$, où

$\{B_j'\}_{j=1}^m$ est un système normal adjoint au système $\{B_j\}_{j=1}^m$ relativement à A et à la formule de Green (4.13) .

Démonstration : La condition nécessaire est triviale ; pour montrer

que la condition est suffisante on remarque que

$$\sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} B_j u \overline{C_j^! v} d\sigma = 0$$

pour toute v telle que $B_j^! v = 0$, $j = 1, \dots, m$; il suffit alors de prendre v telle que $C_j^! v = B_j u$, $j = 1, \dots, m$ et $B_j^! v = 0$ $j = 1, \dots, m$.

Remarque 4.1.: Un problème que l'on étudiera est la généralisation de la formule de Green à des fonctions u, v dans des espaces convenables de type Sobolev.

Il est immédiat de voir que l'on peut prolonger (4.13) par continuité à $u \in W_p^{2m}(\Omega)$ et $v \in W_{p'}^{2m}(\Omega)$, avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. En effet si l'ordre de C_j est μ_j , alors l'ordre de $B_j^!$ est $2m - \mu_j - 1$ et l'ordre de $C_j^!$ est $2m - m_j - 1$, $j = 1, \dots, m$; on a donc $B_j u \in W_p^{2m-m_j-1/p}(\Gamma)$ et $C_j^! v \in W_{p'}^{m_j+1/p}(\Gamma)$ et les intégrales $\int_{\Gamma} B_j u \overline{C_j^! v} d\sigma$, $j = 1, \dots, m$ sont bien définies et dépendent continûment de u et v ; d'une façon analogue on a $B_j^! v \in W_{p'}^{\mu_j+1/p}(\Gamma)$ et $C_j u \in W_p^{2m-\mu_j-1/p}(\Gamma)$ et les intégrales $\int_{\Gamma} C_j u \overline{B_j^! v} d\sigma$, $j = 1, \dots, m$, sont bien définies et dépendent continûment de u et v .

On verra d'autres prolongements dans l'exposé VIII.

Définition 4.7. : Le problème aux limites $\{A', B_j^!\}$ est dit
problème adjoint formel [relativement à la formule de Green (4.13)]
au problème aux limites $\{A, B_j\}$, si A' est l'adjoint formel
de A et si le système $\{B_j^!\}_{j=1}^m$ est adjoint au système $\{B_j\}_{j=1}^m$
relativement à A [et à la formule de Green (4.13)] .

On voit que le système $\{B_j^!\}_{j=1}^m$ dépend du choix du système
 $\{C_j\}_{j=1}^m$ et donc il y a une infinité de systèmes $\{B_j^!\}_{j=1}^m$ adjoints
 au système $\{B_j\}_{j=1}^m$.

Définition 4.8. : Deux systèmes normaux $\{N_j\}_{j=1}^m$ et $\{N_j^{\#}\}_{j=1}^m$ sont
dits équivalents si, pour chaque $v \in C^\infty(\bar{\Omega})$, $N_j v = 0$ ($j = 1, \dots, m$)
sur Γ entraîne $N_j^{\#} v = 0$, $j = 1, \dots, m$ et réciproquement.

Proposition 4.4. : Si deux systèmes normaux $\{N_j\}_{j=1}^m$ et $\{N_j^{\#}\}_{j=1}^m$
sont équivalents et si μ_j est l'ordre de N_j et $\mu_j^{\#}$ est l'or-
dre de $N_j^{\#}$, on a la représentation

$$(4.14) \quad N_j^{\#} = \sum_{s=1}^m \Lambda_{js} N_s \quad j = 1, \dots, m$$

où pour $\mu_j^{\#} > \mu_s$, Λ_{js} est un opérateur différentiel tangentiel
à Γ d'ordre $< \mu_j^{\#} - \mu_s$, pour $\mu_j^{\#} = \mu_s$, Λ_{js} est une fonction
 $\neq 0$ de $C^\infty(\Gamma)$, et pour $\mu_j^{\#} < \mu_s$ $\Lambda_{js} \equiv 0$.

Remarque 4.2. : Il est facile de vérifier qu'à chaque opérateur du premier système correspond un opérateur du même ordre dans l'autre système.

Démonstration. : On complète $\{N_j\}_{j=1}^m$ dans un système de Dirichlet

$\{\mathcal{D}_j\}_{j=1}^{2m}$; on a, grâce au théorème 4.1, c), la représentation

$$N_j^{\#} = \sum_{s=1}^{2m} \Lambda_{js} \mathcal{D}_s \quad j = 1, \dots, m.$$

On va démontrer que si $\mathcal{D}_s$ n'est pas un des $\{N_j\}_{j=1}^{2m}$ alors

$\Lambda_{js} = 0$; supposons que $\mathcal{D}_s$ ne soit pas un des $\{N_j\}_{j=1}^m$ et que

$\Lambda_{js} \neq 0$, alors il existe $g \in C^\infty(\Gamma)$ telle que $\Lambda_{js} g \neq 0$.

Grâce au théorème 4.1, b), il existe $v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ telle que

$$\mathcal{D}_j v = 0 \quad j \neq s$$

$$\mathcal{D}_s v = g \quad \text{et donc on a } N_j^{\#} v = \Lambda_{js} g \neq 0.$$

Mais comme $N_j v = 0$, $j = 1, \dots, m$, on doit avoir $N_j^{\#} v = 0$,

d'où la contradiction.

C.Q.F.D.

Proposition 4.5 : Tous les systèmes adjoints au système $\{B_j\}_{j=1}^m$ relativement à A [et à la formule de Green (4.13)] sont équivalents.

Démonstration. Soient $\{B_j^I\}_{j=1}^m$ et $\{B_j^{II}\}_{j=1}^m$ deux tels systèmes ;

Supposons que $v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ et $B_j^! v = 0$, $j = 1, \dots, m$, alors par le corollaire 4.1 on a

$$(A u, v) = (u, A' v)$$

pour chaque $u \in C(\bar{\Omega})$ telle que $B_j u = 0$ sur Γ , $j = 1, \dots, m$.

Mais il s'agit d'une condition nécessaire et suffisante pour que

$$B_j'' v = 0 \quad j = 1, \dots, m ;$$

donc les deux systèmes $\left\{ B_j^! \right\}_{j=1}^m$ et $\left\{ B_j'' \right\}_{j=1}^m$ sont équivalents.
C.Q.F.D.

4 - Soit A un opérateur proprement elliptique dans $\bar{\Omega}$ d'ordre $2m$ et soit $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$ un système d'opérateurs-frontière qui recouvre A (v. exposé III.4) ; si de plus $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$ est un système normal, alors on peut parler d'un problème adjoint formel $\left\{ A', B_j^! \right\}$.

Il est trivial de vérifier que A' est proprement elliptique dans $\bar{\Omega}$; il est naturel de se demander si un système $\left\{ B_j^! \right\}_{j=1}^m$ adjoint au système $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$ relativement à A [et à la formule de Green (4.13)] recouvre A' pour pouvoir appliquer au problème adjoint formel $\left\{ A', B_j^! \right\}$ les estimations a priori du théorème 3.5. On a le théorème suivant :

Théorème 4.3. Le système normal $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$ recouvre A si et seulement

si chaque système normal $\{B_j\}_{j=1}^m$ adjoint au système $\{B_j\}_{j=1}^m$ relativement à A [et à la formule de Green (4.13)], recouvre A' .

Avant de démontrer ce théorème il nous faut établir quelques résultats préliminaires et rappeler quelques notations.

Si $\xi \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ est un vecteur tangent à Γ au point x , si $v \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ est un vecteur normal à Γ au point x et si $\tau \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} \text{on pose} \quad A^{\circ}(\tau) &= A^{\circ}(x; \xi + \tau v) = \sum_{|\alpha|=2m} a_{\alpha}(x) (\xi + \tau v)^{\alpha} \\ &= \sum_{i=0}^{2m} C_{2m-i}(x; \xi, v) \tau^i \\ A^{+}(\tau) &= \prod_{k=1}^m (\tau - \lambda_k^{+}(x; \xi, v)) \\ A^{-}(\tau) &= \prod_{k=1}^m (\tau - \lambda_k^{-}(x; \xi, v)) \end{aligned}$$

$$B_j^{\circ}(\tau) = \sum_{|\mu|=m_j} b_{j\mu}(x) (\xi + \tau v)^{\mu} \quad j = 1, \dots, m$$

On a $A^{+}(\tau) = (-1)^m A^{-}(x; -\xi, v; -\tau)$ et donc, comme on l'a déjà observé dans l'exposé III.4, si les polynômes $B_j^{\circ}(\tau)$, $j = 1, \dots, m$ sont linéairement indépendants modulo $A^{+}(\tau)$ ils sont aussi linéairement indépendants modulo $A^{-}(\tau)$.

On pose

$$\overline{B_j} = \sum_{|\mu| \leq m_j} \overline{b_{j\mu}}(x) D^{\mu} \quad j = 1, \dots, m$$

et on a la proposition suivante :

Proposition 4.6. : Le système $\{B_j\}_{j=1}^m$ recouvre A si et seule-

ment si le système $\left\{ \overline{B_j} \right\}_{j=1}^m$ recouvre A' .

Il suffit d'observer que $A'^{\circ} = \overline{A}$.

Proposition 4.7.: Si le système normal $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$ recouvre A ,
alors chaque système normal équivalent recouvre A .

Démonstration : Si $\left\{ \overline{B_j} \right\}_{j=1}^m$ est un système normal équivalent au système normal $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$, on peut lui donner la représentation (4.14) . Soit Λ_{js}° la partie homogène de degré $m_j - m_s$ de l'opérateur Λ_{js} et $\Lambda_{js}^{\circ}(\xi)$ le polynôme correspondant (il s'agit d'un polynôme en ξ parceque Λ_{js} est un opérateur différentiel tangentiel à Γ !); on a alors les formules

$$B_j^{\# \circ}(\tau) = \sum_{s=1}^m \Lambda_{js}^{\circ}(\xi) B_s^{\circ}(\tau) \quad j = 1, \dots, m$$

où la matrice $\| \Lambda_{js}^{\circ}(\xi) \|_{j,s=1, \dots, m}$ est inversible car il s'agit d'une matrice triangulaire dont les éléments de la diagonale principale sont des fonctions $\neq 0$ de $C^{\infty}(\Gamma)$.

Puisque $\left\{ B_j \right\}_{j=1}^m$ recouvre A on a :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m \lambda_j B_j^{\# \circ}(\tau) &= \sum_{j=1}^m \lambda_j \sum_{s=1}^m \Lambda_{js}^{\circ}(\xi) B_s^{\circ}(\tau) \\ &= \sum_{s=1}^m B_s^{\circ}(\tau) \sum_{j=1}^m \lambda_j \Lambda_{js}^{\circ}(\xi) \\ &= 0 \quad \text{mod. } A^+(\tau) \end{aligned}$$

si et seulement si $\sum_{j=1}^m \lambda_j \wedge_{js}^{\circ}(\xi) = 0$, $s = 1, \dots, m$

mais alors $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$.

C.Q.F.D.

Démonstration du théorème 4.3.: Grâce aux propositions 4.5. et

4.7. il suffit de démontrer qu'un système $\{B_j\}_{j=1}^m$ adjoint au

système $\{B_j\}_{j=1}^m$ relativement à A [et à la formule de Green

(4.13.) recouvre A' ; et grâce à la proposition 4.6 il suffit

de démontrer que $\{\overline{B_j}\}_{j=1}^m$ recouvre A .

Le problème étant de caractère local on peut par cartes locales se réduire au cas de la demi-boule $\Sigma \subset \mathbb{R}_+^n$ et on peut alors se servir de la formule explicite (4.10).

Dans le cas de $P = (x, 0) \in \partial_1 \Sigma$ on a $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_{n-1}, 0)$ et $v = (0, \dots, 0, v_n)$; soit alors P fixé et soient aussi fixés ξ avec $|\xi| = 1$ et $v = (0, \dots, 0, -1)$.

Considérons les polynômes suivants (cf. (4.10)) :

$\mathcal{D}_\rho^{\circ}(\tau)$ = polynôme caractéristique de l'opérateur $\mathcal{D}_\rho$;

$\overline{\mathcal{D}}_{2m-\rho+1}^{\circ}(\tau)$ = polynôme caractéristique de l'opérateur $\overline{\mathcal{D}}_{2m-\rho+1}$;

$N_{2m-s+1}^{\circ}(\tau)$ = polynôme caractéristique de l'opérateur N_{2m-s+1} .

Rappelons aussi les formules (voir proposition 4.3)

$$D_t^{n-1} = \sum_{s=1}^h \Lambda_{hs} \mathcal{D}_s \quad (4.15)$$

$$\mathcal{D}_\rho = \sum_{n=1}^{\rho} \Lambda_{\rho n}^{\#} D_t^{n-1} \quad (4.16)$$

si l'on pose ensuite

$\Lambda_{hs}^{\circ}(\xi)$ = polynôme caractéristique de l'opérateur différentiel

tangentiel à $\Gamma \wedge_{hs}$;

$\Lambda_{\rho n}^{\# \circ}(\xi)$ = polynôme caractéristique de l'opérateur différentiel

tangentiel à $\Gamma \wedge_{\rho n}^{\#}$;

on a les formules suivantes :

$$(4.17) \quad \mathcal{D}_\rho^{\circ}(\tau) = \sum_{n=1}^{\rho} \Lambda_{\rho n}^{\# \circ}(\xi) (-1)^{n-1} \tau^{n-1} \quad \rho = 1, \dots, 2m$$

$$(4.18) \quad (-1)^{h-1} \tau^{h-1} = \sum_{s=1}^h \Lambda_{hs}^{\circ}(\xi) \mathcal{D}_s^{\circ}(\tau) \quad h = 1, \dots, 2m$$

$$(4.19) \quad \sum_{s=n}^{\rho} \Lambda_{\rho s}^{\# \circ}(\xi) \Lambda_{sn}^{\circ}(\xi) = \delta_{\rho n} \quad 1 \leq n \leq \rho \leq 2m ;$$

en observant que $\Lambda_{s\rho}^{\circ}(\xi) = (-1)^{s-\rho} \overline{\Lambda_{s\rho}^{\circ}}(\xi)$ on a aussi

$$(4.20) \quad \overline{\mathcal{D}_{2m-\rho+1}^{\circ}}(\tau) = \sum_{s=\rho}^{2m} (-1)^{s-\rho} \Lambda_{s\rho}^{\circ}(\xi) \overline{N_{2m-s+1}^{\circ}}(\tau), \rho = 1, \dots, 2m.$$

Il est évident que le système $\left\{ \overline{B_j} \right\}_{j=1}^{2m}$ recouvre A si et seule-
ment si l'hypothèse suivante

(α) Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_{2m}$ des nombres complexes, avec $\lambda_\rho = 0$ si

ρ est tel que $\mathcal{D}_\rho$ est un des B_j , $j=1, \dots, m$ et tels que

$$\sum_{\rho=1}^{2m} \lambda_{\rho} \overline{\mathcal{D}'_{2m-\rho+1}}^{\circ}(\tau) \equiv 0 \pmod{A^+(\tau)}$$

entraîne $\lambda_{\rho} = 0$, $\rho = 1, \dots, 2m$.

Si l'on pose

$$(4.21) \quad \omega_{n-1} = \sum_{s=1}^n \lambda_s (-1)^{n-s} \Lambda_{ns}^{\circ}(\xi) \quad n = 1, \dots, 2m$$

$$(4.22) \quad \mathcal{D}_{\rho}^{\circ}(\omega) = \sum_{n=1}^{\rho} \Lambda_{\rho n}^{\# \circ}(\xi) (-1)^{n-1} \omega_{n-1} \quad \rho = 1, \dots, 2m$$

alors on a grâce à (4.19)

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{\rho}^{\circ}(\omega) &= \sum_{n=1}^{\rho} \Lambda_{\rho n}^{\# \circ}(\xi) (-1)^{n-1} \sum_{s=1}^n \lambda_s (-1)^{n-s} \Lambda_{ns}^{\circ}(\xi) \\ &= \sum_{s=1}^{\rho} \lambda_s (-1)^{s-1} \sum_{n=s}^{\rho} \Lambda_{\rho n}^{\# \circ}(\xi) \Lambda_{ns}^{\circ}(\xi) \\ &= \lambda_{\rho} (-1)^{\rho-1} \quad \rho = 1, \dots, 2m \end{aligned}$$

et grâce à (4.20)

$$\begin{aligned} \sum_{\rho=1}^{2m} \lambda_{\rho} \overline{\mathcal{D}'_{2m-\rho+1}}^{\circ}(\tau) &= \sum_{\rho=1}^{2m} \lambda_{\rho} \sum_{s=\rho}^{2m} (-1)^{s-\rho} \Lambda_{s\rho}^{\circ}(\xi) . \\ \overline{N}_{2m-s+1}^{\circ}(\tau) &= \sum_{s=1}^{2m} \omega_{s-1} \overline{N}_{2m-s+1}^{\circ}(\tau) . \end{aligned}$$

Grâce au fait que $\Lambda_{ss}^{\circ}(\xi) = \Lambda_{ss}(x, 0)$ est une fonction $\neq 0$ de

$C^{\infty}(\partial_1 \Sigma)$, il découle que $\lambda_{\rho} = 0$, $\rho = 1, \dots, 2m$ si et seulement

si $\omega_{n-1} = 0$, $n = 1, \dots, 2m$.

On a donc démontré que l'hypothèse (α) entraîne $\lambda_{\rho} = 0$, $\rho = 1, \dots$

..., 2m, si et seulement si l'hypothèse suivante

(B) Soient $\omega_0, \dots, \omega_{2m-1}$ des nombres complexes, avec

$$\sum_{s=1}^{2m} \omega_{s-1} \overline{N_{2m-s+1}}(\tau) \equiv 0 \pmod{A^+(\tau)}$$

et si ρ est tel que $\mathcal{D}_\rho$ soit un des B_j , $j=1, \dots, m$; alors

$$\mathcal{D}_\rho^o(\omega) = \sum_{n=1}^0 \wedge_{\rho n}^{\#o}(\xi) (-1)^{n-1} \omega_{n-1} = 0$$

entraîne $\omega_{s-1} = 0$, $s=1, \dots, 2m$.

Rappelons la formule suivante, où $P = (x, 0) \in \mathcal{D}_1$, $\xi = (\xi', 0)$

$$\begin{aligned} A^o(\tau) &= \sum_{|\alpha|=2m} a_\alpha(P) \xi'^{\alpha'} (-1)^{\alpha_n} \tau^{\alpha_n} \\ &= \sum_{i=0}^{2m} C_{2m-i}(P; \xi', -1) \tau^i \end{aligned}$$

$$\text{où } C_{2m-i} = C_{2m-i}(P; \xi', -1) = \sum_{\substack{|\alpha'|=2m-i \\ \alpha=(\alpha', i)}} a_\alpha(P) \xi'^{\alpha'} (-1)^i, \quad i=0, \dots, 2m$$

Si l'on écrit d'une façon explicite, alors on a aussi (cf.(4.9)) :

$$\begin{aligned} \sum_{s=1}^{2m} \omega_{s-1} \overline{N_{2m-s+1}}(\tau) &= \\ &= \sum_{s=1}^{2m} \omega_{s-1} \sum_{\substack{|\alpha'|=2m-i \\ i \geq s}} a_\alpha(P) \xi'^{\alpha'} (-1)^i \tau^{i-s} \\ &= \sum_{s=1}^{2m} \omega_{s-1} \sum_{i=s}^{2m} C_{2m-i} \tau^{i-s} \\ &= \sum_{i=1}^{2m} C_{2m-i} \sum_{s=1}^i \omega_{s-1} \tau^{i-s} = R(\tau, \omega) \end{aligned}$$

Considérons maintenant le polynôme dans les variables complexes z
et τ :

$$R(\tau, z) = \sum_{i=1}^{2m} c_{2m-i} \sum_{s=1}^i \tau^{i-s} z^{s-1} = \frac{A^{\circ}(\tau) - A^{\circ}(z)}{\tau - z};$$

il est facile de démontrer par récurrence la formule de dérivation

$$(\tau - z) \frac{\partial^n R(\tau, z)}{\partial \tau^n} = \frac{d^n A^{\circ}(\tau)}{d \tau^n} - n \frac{\partial^{n-1} R(\tau, z)}{\partial \tau^{n-1}}; \quad (n \geq 1)$$

si $\tau(P; \xi', -1)$ est une racine de $A^{\circ}(\tau)$ avec multiplicité $> n$,

alors on a

$$\left. \frac{\partial^n R(\tau, z)}{\partial \tau^n} \right|_{\tau=\tau(P; \xi', -1)} = \frac{n! A^{\circ}(z)}{(z - \tau(P; \xi', -1))^{n+1}}$$

Soient $\tau_1^+, \dots, \tau_k^+$ les racines de $A^+(\tau)$ avec multiplicité $\theta_1, \dots, \theta_k$,

$1 \leq k \leq m$, $\theta_1 + \dots + \theta_k = m$; il découle alors que pour chaque

racine τ_i^+ avec multiplicité θ_i , $i = 1, \dots, k$, on a pour

$0 \leq n \leq \theta_i - 1$:

$$(4.23) \quad \left. \frac{\partial^n R(\tau, z)}{\partial \tau^n} \right|_{\tau=\tau_i^+} = n! C_0(z - \tau_i^+)^{\theta_i - n - 1} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k (z - \tau_j^+)^{\theta_j} A^-(z)$$

Si l'on a

$$\sum_{s=1}^{2m} \omega_{s-1} \overline{N}_{2m-s+1}(\tau) = R(\tau) \equiv 0 \pmod{A^+(\tau)}$$

c.à.d. si l'on a

$$R(\tau, \omega) = Q(\tau, \omega) A^+(\tau),$$

alors on obtient pour $0 \leq n \leq \theta_i - 1$, $i = 1, \dots, k$:

$$(4.24) \quad \left. \frac{\partial^n R(\tau, \omega)}{\partial \tau^n} \right|_{\tau=\tau_i^+} = \left. \frac{\partial^n}{\partial \tau^n} (A^+(\tau) Q(\tau, \omega)) \right|_{\tau=\tau_i^+} = 0$$

car $A^+(\tau)$ contient le terme $(\tau - \tau_i^+)^{\theta_i}$ avec $\theta_i > n$.

Considérons les polynômes suivants pour $0 \leq n \leq \theta_i - 1$,

$i = 1, \dots, k$:

$$(4.25) \quad P_{i n}(z) = C_0(z - \tau_i^+)^{\theta_i - n - 1} \prod_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^k (z - \tau_j^+)^{\theta_j} A^-(z) ;$$

il s'agit de m polynômes linéairement indépendants de degré $\geq m$

et $\leq 2m-1$.

Si l'on remplace z^{s-1} par ω_{s-1} dans les formules (4.23) et

(4.25), alors on a l'identité suivante :

$$\left. \frac{\partial^n R(\tau, \omega)}{\partial \tau^n} \right|_{\tau = \tau_i^+} = n! P_{i n}(\omega) \quad 0 \leq n \leq \theta_i - 1, \quad i = 1, \dots, k ;$$

on déduit donc de (4.24) que $R(\tau, \omega) \equiv 0 \pmod{A^+(\tau)}$ entraîne

$P_{i n}(\omega) = 0$, $0 \leq n \leq \theta_i - 1$, $i = 1, \dots, k$ et réciproquement

$P_{i n}(\omega) = 0$, $0 \leq n \leq \theta_i - 1$, $i = 1, \dots, k$, entraîne $R(\tau, \omega) = 0$,
mod. $A^+(\tau)$.

On a donc démontré que l'hypothèse (β) entraîne $\omega_{s-1} = 0$

$s = 1, \dots, 2m$ si et seulement si l'hypothèse suivante

(Y) Soient $\omega_0, \dots, \omega_{2m-1}$ des nombres complexes, avec

$$P_{i n}(\omega) = 0 \quad 0 \leq n \leq \theta_i - 1, \quad i = 1, \dots, k$$

$$B_j^0(\omega) = 0 \quad j = 1, \dots, m$$

entraîne $\omega_{s-1} = 0$, $s = 1, \dots, 2m$.

Les polynômes $P_{i n}(\tau)$ et $B_j^{\circ}(\tau)$ sont au nombre de $2m$ de degré $\leq 2m-1$ et donc ils sont linéairement indépendants si et seulement si le déterminant d'ordre $2m$ des coefficients est $\neq 0$, où, ce qui revient au même, si et seulement si l'hypothèse (γ) entraîne $\omega_{s-1} = 0$, $s = 1, \dots, 2m$.

Démontrons enfin que les polynômes $P_{i n}(\tau)$, $B_j^{\circ}(\tau)$, $i=1, \dots, k$, $n=0, \dots, \theta_{i-1}$, $j=1, \dots, m$ sont linéairement indépendants si et seulement si les polynômes $B_j^{\circ}(\tau)$ recouvrent $A^{\circ}(\tau)$.

Supposons que les polynômes $B_j^{\circ}(\tau)$, $j=1, \dots, m$, recouvrent $A^{\circ}(\tau)$, c.à.d. qu'ils soient linéairement indépendants modulo $A^-(\tau)$.

Si
$$\sum_{j=1}^m \eta_j B_j^{\circ}(\tau) + \sum_{i=1}^k \sum_{n=0}^{\theta_{i-1}} \lambda_{i n} P_{i n}(\tau) = 0$$
 alors on a

par la définition des $P_{i n}(\tau)$:

$$\sum_{j=1}^m \eta_j B_j^{\circ}(\tau) \equiv 0 \quad \text{mod. } A^-(\tau)$$

et donc $\eta_j = 0$, $j=1, \dots, m$; on a aussi

$$\sum_{i=1}^k \sum_{n=0}^{\theta_{i-1}} \lambda_{i n} P_{i n}(\tau) = 0,$$

mais les $P_{i n}(\tau)$ sont linéairement indépendants et donc $\lambda_{i n} = 0$,

$i=1, \dots, k$, $n=0, \dots, \theta_{i-1}$. Donc les polynômes $B_j^{\circ}(\tau)$, $P_{i n}(\tau)$

sont linéairement indépendants.

Supposons que les polynômes $B_j^{\circ}(\tau)$, $j = 1, \dots, m$, ne recouvrent pas $A^{\circ}(\tau)$, i.e. qu'ils soient linéairement dépendants modulo $A^{-}(\tau)$. Il existe alors un polynôme $H(\tau)$ et des constantes η_j , $j = 1, \dots, m$, non toutes $= 0$, telles que

$$\sum_{j=1}^m \eta_j B_j^{\circ}(\tau) + H(\tau) A^{-}(\tau) = 0 ;$$

le degré de $H(\tau)$ est évidemment $\leq m-1$ et donc puisque les polynômes $\frac{P_{i n}(\tau)}{A^{-}(\tau)}$, $i = 1, \dots, k$, $n = 0, \dots, \theta_i - 1$, sont linéairement indépendants, de degré $\leq m$ et au nombre de m , alors il existe des constantes $\lambda_{i n}$, $i = 1, \dots, k$, $n = 0, \dots, \theta_i - 1$ non toutes $= 0$ telles que

$$H(\tau) = \sum_{i=1}^k \sum_{n=0}^{\theta_i-1} \lambda_{i n} \frac{P_{i n}(\tau)}{A^{-}(\tau)} ;$$

on a donc

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m \eta_j B_j^{\circ}(\tau) + H(\tau) A^{-}(\tau) &= \\ &= \sum_{j=1}^m \eta_j B_j^{\circ}(\tau) + \sum_{i=1}^k \sum_{n=0}^{\theta_i-1} \lambda_{i n} P_{i n}(\tau) = 0 \end{aligned}$$

ce qui entraîne que les polynômes $P_{i n}(\tau)$, $B_j^{\circ}(\tau)$, $i = 1, \dots, k$, $n = 0, \dots, \theta_i - 1$, $j = 1, \dots, m$, ne sont pas linéairement indépendants.

C.Q.F.D.

5 - Voici pour terminer une variante des formules de Green. Po-

sons $A = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_{\alpha\beta}(x) D^\beta) ;$

à un tel opérateur elliptique dans $\bar{\Omega}$ on peut associer une forme sesquilinéaire

$$(u, v) \rightsquigarrow a(u, v) = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} \int_{\Omega} a_{\alpha\beta}(x) D^\beta u \overline{D^\alpha v} \, dx$$

de façon que si $u, v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ il existe un système normal $\{S_j\}_{j=1}^m$

tel que

$$(A u, v) - a(u, v) = \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} S_j u \overline{\gamma_j v} \, d\sigma$$

où l'ordre de l'opérateur S_j est $2m-j-1$.

En effet par cartes locales on peut se réduire au cas de la demi-boule Σ dans $\mathbb{R}_+^n$ et alors on a la formule suivante, obtenue par intégration par parties avec le même raisonnement qu'au n° 2, où $u, v \in C^\infty(\Sigma)$ et sont nulles dans un voisinage de $\partial_2 \Sigma$:

$$\begin{aligned} \int_{\Sigma} A u \overline{v} \, dx \, dt &= \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} \int_{\Sigma} a_{\alpha\beta}(x, t) D^\beta u \overline{D^\alpha v} \, dx \, dt + \\ &+ \sum_{j=1}^m \int_{\partial_1 \Sigma} \left[S_j u \right]_{t=0} \overline{\left[D_t^{j-1} v \right]_{t=0}} \, dx \end{aligned}$$

où

$$S_j u = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} (-1)^{|\alpha| - j - 1} D_x^{\alpha'} D_t^{\alpha_n - j - 1} (a_{\alpha\beta}(x, t) D^\beta u)$$

$\alpha_n \geq j+1$

V - REALISATIONS D'UN OPERATEUR ELLIPTIQUE DANS L_p .

1 - Soit Ω un ouvert borné de R^n , de frontière Γ variété indéfiniment différentiable de dimension $n-1$, Ω étant d'un seul côté de Γ . Nous considérons un opérateur A "proprement elliptique" (exposé III) d'ordre $2m$, à coefficients $C^\infty(\overline{\Omega})$, et un système d'"opérateurs frontières" $B_1, \dots, B_m$ d'ordre $\leq 2m-1$ à coefficients $C^\infty(\Gamma)$ qui recouvre A (exposé III).

Définition 5.1. : Dans $L_p(\Omega)$, A_p est l'opérateur linéaire de domaine

$$D(A_p) = \left\{ u \in W_p^{2m}(\Omega) ; B_j u = 0 \quad j = 1, 2, \dots, m \right\} \quad (1)$$

défini par $A_p u = A u$ pour $u \in D(A_p)$.

On appelle l'opérateur A_p réalisation de l'opérateur A dans $L_p(\Omega)$ sous les conditions aux limites homogènes $B_j u = 0$, $j = 1, 2, \dots, m$; c'est un opérateur non borné dans $L_p(\Omega)$.

On désigne par $N(A_p)$ le noyau de A_p et par $R(A_p)$ son image.

Nous développons pour commencer quelques conséquences des estimations a priori (exposé III) : nous pouvons les écrire

(1) Voir l'exposé I pour la signification de $B_j u$.

sous la forme suivante :

$$\|u\|_{2m,p} \leq C_0 (\|A_p u\|_{0,p} + \|u\|_{0,p}) \text{ pour } u \in D(A_p) \quad (5.1)$$

$$\|u\|_{2m+k,p} \leq C_k \|u\|_{0,p}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \text{ pour } u \in N(A_p) \quad (5.2)$$

De l'inégalité (5.1) résulte que sur $D(A_p)$ la norme du graphe de A_p et la norme induite par $W_p^{2m}(\Omega)$ sont équivalentes ;

Nous supposons toujours dans la suite que $D(A_p)$ est muni de la norme du graphe, alors, grâce aux hypothèses de régularité sur Ω , l'injection de $D(A_p)$ dans $L_p(\Omega)$ est compacte.

De l'inégalité (5.2) résulte l'inclusion $N(A_p) \subset C^\infty(\bar{\Omega})$.

Théorème 5.1 : (i) A_p est un opérateur fermé, à domaine dense dans $L_p(\Omega)$. (ii) $N(A_p)$ ne dépend pas de p ; c'est le sous-espace

$$N = \{ u \in C^\infty(\bar{\Omega}) ; A u = 0, B_j u = 0 \quad j = 1, 2, \dots, m \}$$

(iii) N est de dimension finie (iv) $R(A_p)$ est fermé dans $L_p(\Omega)$.

Démonstration :

(i) A_p est fermé : cela résulte de l'inégalité (5.1) et de la continuité de l'application :

$$W_p^{2m}(\Omega) \longrightarrow L_p(\Gamma)$$

$$u \rightsquigarrow B_j u$$

L'inclusion $\mathcal{D}(\Omega) \subset D(A_p)$ prouve la densité de $D(A_p)$.

(ii) L'inclusion $N \subset N(A_p)$ est évidente, l'inclusion réciproque est conséquence de la suivante $N(A_p) \subset C^\infty(\overline{\Omega})$.

Les points (iii) et (iv) résultent d'un lemme de caractère général :
Soit E un espace de Banach et H un opérateur non borné dans E , à domaine $D(H)$ dense, et fermé.

Lemme 5.1 : On suppose que l'injection de $D(H)$ (muni de la norme du graphe de H) dans E est compacte, alors le noyau $N(H)$ est de dimension finie et l'image $R(H)$ est fermée dans E .

Démonstration : Dans $N(H)$ la norme du graphe de H et la norme de E coïncident ; par conséquent $N(H)$ est pour l'une de ces normes, un espace de Banach localement compact, donc est de dimension finie.

Soit Φ un supplémentaire topologique de $N(H)$ dans $D(H)$:

$$D(H) = N(H) \dot{\oplus} \Phi$$

Alors, il existe une constante C telle que :

$$\|H\Phi\| \geq C \|\Phi\| \quad (5.3)$$

pour toute $\phi \in \Phi$ ($\| \cdot \|$ désigne la norme de E). En effet,

dans le cas contraire, il existerait une suite $\{\phi_k\}_{k=1,2,\dots} \subset \Phi$,

telle que

$$\begin{cases} \|\phi_k\| = 1 \\ H\phi_k \longrightarrow 0 \text{ dans } E \text{ pour } k \longrightarrow +\infty. \end{cases}$$

La suite $\{\phi_k\}_{k=1,2,\dots}$ étant bornée dans $D(H)$, on peut en extraire une suite encore notée $\{\phi_k\}_{k=1,2,\dots}$ qui converge dans

E vers une limite ϕ :

$$\begin{cases} \phi_k \longrightarrow \phi \\ H\phi_k \longrightarrow 0 \text{ dans } E \text{ pour } k \longrightarrow +\infty. \end{cases}$$

Comme H est un opérateur fermé, on a $\phi \in D(H)$ et $H\phi = 0$,

i.e. $\phi \in N(H)$, puis :

$$\phi_k \longrightarrow \phi \text{ dans } D(H) \text{ pour } k \longrightarrow +\infty.$$

ϕ étant fermé dans $D(H)$, on a $\phi \in \Phi$, et comme

$$\|\phi\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\phi_k\| = 1, \text{ i.e. } \phi \neq 0. \text{ Nous avons ainsi construit}$$

un élément $\phi \neq 0$, appartenant à $N(H) \cap \Phi$, ce qui est impossible.

L'inégalité (5.3) est donc prouvée, nous allons en déduire

que $R(H)$ est fermé = Soit $\{u_k\}_{k=1,2,\dots}$ une suite dans $D(H)$

telle que

$$H u_k \longrightarrow f \text{ dans } E \text{ pour } k \longrightarrow +\infty$$

Il nous faut montrer que $f \in R(H)$. Pour cela, soit

$$u_k = n_k + \phi_k$$

la décomposition de u_k dans la somme directe

$$D(H) = N(H) \dot{\oplus} \phi$$

alors $H u_k = H \phi_k \longrightarrow f$ dans E ; l'inégalité (5.3) montre

que ϕ_k est une suite de Cauchy pour la norme de E , soit ϕ

sa limite : $\phi_k \longrightarrow \phi$

$$H \phi_k \longrightarrow f \text{ dans } E \text{ pour } k \longrightarrow +\infty.$$

H étant fermé, on en déduit que $\phi \in D(H)$, $H\phi = f$.

C.Q.F.D.

2 - Le problème de l'existence est de déterminer $R(A_p)$. Nous commençons par une réduction de ce problème.

Le domaine de A_p est dense, et par conséquent A_p possède un adjoint A_p^* , opérateur non borné dans $L_{p',(\Omega)}$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$),

de domaine $D(A_p^*)$;

$D(A_p^*)$ est le sous-espace de $L_{p',(\Omega)}$ formé des v tels que

$$D(A_p) \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$u \rightsquigarrow (A_p u, v)$$

se prolonge à $L_p(\Omega)$ en une forme linéaire continue; A_p^* est

défini par $(A_p u, v) = (u, A_p^* v)$

pour $u \in D(A_p)$, $v \in D(A_p^*)$.

A_p^* est un opérateur fermé, à domaine dense

$$A_p^{**} = A_p$$

et si $N(A_p^*)$ désigne le noyau de A_p^* , on a

$$R(A_p) = \{ f \in L_p(\Omega) ; (f, v) = 0 \quad \forall v \in N(A_p^*) \}$$

(voir en appendice)

A présent nous supposons que en plus des hypothèses faites au début de cet exposé, le système $B_1, \dots, B_m$ est normal (exposé IV).

Soit A' l'adjoint formel de A et $B'_1, \dots, B'_m$ un système d'opérateurs-frontières adjoint au système $B_1, \dots, B_m$, relativement à

A (exposé IV) . Tout ce qui a été dit à propos du problème aux

limites $\{A ; B_1, \dots, B_m\}$, reste vrai pour $\{A' ; B'_1, \dots, B'_m\}$.

Nous noterons

$$N' = \{ v \in C^\infty(\overline{\Omega}) ; A'v = 0 , B'_j v = 0 , j=1,2,\dots,m \}$$

Il est naturel de chercher les relations entre les opérateurs

A_p^* et A'_p .

Nous montrerons que $A_p^* = A'_p$; la démonstration de cette iden-

tité, dans le cas $p = 2$, fera l'objet de l'exposé VI , le cas

général $p \neq 2$ sera démontré dans l'exposé VII .

Cette identité fournit une réponse au problème de la caractérisation de $R(A_p)$:

$$R(A_p) = \left\{ L_p(\Omega) ; N' \right\} \quad (1)$$

Un premier résultat est presque évident :

Lemme 5.2 : Pour tout p , on a $A'_p \subseteq A_p^*$

En effet soit $v \in D(A'_p)$, il est évident grâce aux formules de Green (exposé IV) que

$$D(A_p) \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$u \rightsquigarrow (A_p u, v) = (u, A'_p v)$$

est linéaire continue sur $D(A_p)$ pour la norme induite par

$L_p(\Omega)$, donc $v \in D(A_p^*)$ et $A_p^* v = A'_p v$.

En particulier on en déduit $N' \subseteq N(A_p^*)$ et

$$R(A_p) = \left\{ L_p(\Omega) ; N(A_p^*) \right\} \subseteq \left\{ L_p(\Omega) ; N' \right\}$$

Pour terminer cet exposé, nous démontrons le :

Lemme 5.3 : $\left\{ C^\infty(\overline{\Omega}) ; N' \right\}$ est dense dans $\left\{ L_p(\Omega) ; N' \right\}$

Démonstration: Soit $u_1, \dots, u_\ell$ une base orthonormée de N' :

(1) Ici nous utilisons la notation suivante : Soit E un espace de Banach et E^* son antidual, pour la forme sesquilinéaire $u, v \rightsquigarrow (u, v)$; pour F sous-espace vectoriel de E , on pose $\{E^*, F\} = \{v \in E^* ; (u, v) = 0 \quad \forall u \in F\}$ c'est "l'antipolaire" de F dans l'antidualité entre E et E^* .

$(v_i, v_j) = \delta_{i,j} \quad i, j = 1, 2, \dots, \ell$; les v_i sont des

fonctions de $C^\infty(\overline{\Omega})$. Nous posons

$$P u = u - \sum_{j=1}^{\ell} (u, v_j) v_j$$

pour $u \in L_p(\Omega)$; P est linéaire continu dans $L_p(\Omega)$ et prend ses valeurs dans $\{L_p(\Omega) ; N'\}$.

Soit alors $f \in \{L_p(\Omega) ; N'\}$ et f_k une suite de fonctions $C^\infty(\overline{\Omega})$ telles que $f_k \longrightarrow f$ dans $L_p(\Omega)$ pour $k \longrightarrow +\infty$.

$$P f_k = f_k - \sum_{j=1}^{\ell} (f_k, v_j) v_j \in C^\infty(\overline{\Omega}) \cap \{L_p(\Omega) ; N'\} \quad \text{donc}$$

$P f_k \in \{C^\infty(\overline{\Omega}) ; N'\}$; pour terminer on remarque que $P f_k \longrightarrow P f = f$ dans $L_p(\Omega)$ pour $k \longrightarrow +\infty$, car $(f, v_j) = 0 \quad j=1, 2, \dots, \ell$, f est donc limite dans $L_p(\Omega)$ de fonctions de $\{C^\infty(\overline{\Omega}) ; N'\}$

C.Q.F.D.

3 - Appendice : Opérateurs adjoints

Nous démontrons deux propriétés des opérateurs adjoints (non bornés), qui sont bien connues au moins dans l'espace de Hilbert.

Rappelons tout d'abord la définition de l'adjoint ; Soient E et F deux espaces de Banach (duals E^* et F^* respectivement) et soit H un opérateur linéaire défini dans $D(H)$ (le domaine de H) sous-espace dense de E , et prenant ses valeurs

dans F ; nous noterons $R(H)$ son image.

H^* est l'opérateur linéaire de domaine $D(H^*)$ sous-espace de F^* formé des éléments v tels que la forme antilinéaire

$$D(H) \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$u \longmapsto (H u, v)$$

soit continue pour la norme induite par E dans $D(H)$; pour

$v \in D(H^*)$, H^*v est défini par l'identité

$$(H u, v) = (u, H^*v)$$

pour tout $u \in D(H)$; H^* prend ses valeurs dans E^* .

Soit H un opérateur non continu ou non borné opérant de E dans F . On dit que H est fermé si pour toute suite

$$\{u_k\}_{k=1,2,\dots} \subset D(H) \text{ telle que :}$$

$$\begin{cases} u_k \longrightarrow u & \text{dans } E \text{ pour } k \longrightarrow +\infty \\ H u_k \longrightarrow v & \text{dans } F \text{ pour } k \longrightarrow +\infty \end{cases}$$

on a $u \in D(H)$ et $Hu = v$; dans ce cas $D(H)$ est un espace de

Banach pour la "norme du graphe" $u \longmapsto \|u\|_E + \|H u\|_F$

Théorème : On suppose que H est un opérateur non borné opérant de E dans F , espaces de Banach réflexifs et que H est fermé et à domaine dense; alors H^* est fermé à domaine dense dans E^*

et $H^{**} = H$.

Démonstration : Il est commode d'utiliser le graphe $G(H)$ de H :

$$G(H) = \left\{ \{u_1, u_2\} \in E \times F ; u_1 \in D(H), u_2 = H u_1 \right\}$$

Si nous mettons $E \times F$ et $F^* \times E^*$ en antidualité, relativement à la forme sesquilinéaire

$$\{u_1, u_2\}, \{v_1, v_2\} \rightsquigarrow (u_2, v_1) - (u_1, v_2)$$

nous avons alors

$$G(H^*) = \left\{ F^* \times E^* ; G(H) \right\}$$

Il est facile de voir que le graphe d'un opérateur est fermé si et seulement si l'opérateur est fermé; par conséquent H^* est un opérateur fermé.

Pour montrer que $D(H^*)$ est dense, il suffit de vérifier que si un élément $v \in F$ est tel que $(v, w) = 0$ pour tout $w \in D(H^*)$ alors $v = 0$ (F est réflexif). On a évidemment

$$(v, w) = (0, H^* w) = 0$$

pour $w \in D(H^*)$, donc $\{0, v\} \in \{E \times F ; G(H^*)\}$ i.e.

$\{0, v\} \in G(H)$ car $G(H)$ est fermé (on utilise le théorème des

"bipolaires", ou plutôt son analogue dans le cas des "antipolaires");

donc $v = H 0 = 0$

H^{**} est alors bien défini et

$$G(H^{**}) = \{E \times F ; G(H^*)\} = G(H)$$

donc $H^{**} = H$.

C.Q.F.D.

Théorème On fait les mêmes hypothèses que dans le théorème précédent ; alors $R(H)$ est fermé si et seulement si $R(H^*)$ est fermé.

Démonstration : Nous montrons que lorsque $R(H)$ est fermé, alors $R(H^*)$ l'est aussi; l'implication réciproque résultera de l'identité $H = H^{**}$.

$F_1 = R(H)$ est un espace de Banach; on peut considérer H comme composition $j \circ H_1$ d'un opérateur non borné H_1 opérant de E sur F_1 et de l'injection canonique j de F_1 dans F ; alors $H^* = H_1^* \circ j^*$ et j^* est surjective, donc $R(H^*) = R(H_1^*)$; on s'est ainsi ramené à montrer que $R(H_1^*)$ est fermé avec H_1 surjective.

Nous supposons maintenant que $R(H) = F$. H étant fermé, c'est un homomorphisme de $D(H)$ dans F (qui sont deux espaces de Banach); par conséquent il existe une constante C telle

que pour tout $v \in F$, il existe $u \in D(H)$ avec $H u = v$ et

$$\|u\| \leq c \|v\|.$$

alors pour tout $w \in D(H^*)$ on a

$$\begin{aligned} |(v, w)| &= |(Hu, w)| = |(u, H^* w)| \\ &\leq \|u\| \|H^* w\| \leq c \|v\| \|H^* w\| \end{aligned}$$

d'où $\|w\| \leq c \|H^* w\|$

pour tout $w \in D(H^*)$; ceci montre que H^* est un isomorphisme (topologique) de $D(H^*)$ sur $R(H^*)$ et par conséquent $R(H^*)$ est fermé.

C.Q.F.D.

Corollaire : Sous les mêmes hypothèses on a

$$R(H) = \{F; N(H^*)\}$$

$$R(H^*) = \{E^*; N(H)\}$$

Démonstration : Vérifions la première identité : comme $R(H)$ est fermé et F est réflexif, il suffit grâce au théorème des "bi-polaires" de vérifier l'identité $N(H^*) = \{F^*; R(H)\}$ qui est évidente.

VI - EXISTENCE DANS L_2

1 - Les notations sont celles de l'exposé précédent. Cet exposé est consacré à la démonstration du :

Théorème 6.1 : $R(A_2) = \{L_2(\Omega) ; N'\}$

Nous savons déjà que $R(A_2)$ est un sous-espace fermé de

$$\{L_2(\Omega) ; N'\} .$$

Pour $u, v \in H^{2m}(\Omega)$, nous notons :

$$[u, v] = (A' u, A' v) + \sum_{j=1}^m ((B'_j u, B'_j v))_j$$

$((,))_j$ désignant le produit scalaire dans $H^{2m-m'_j-1/2}(\Gamma)$,

m'_j ordre de B'_j .

$u, v \rightsquigarrow [u, v]$ est évidemment une forme sesquilinéaire hermitienne continue sur $H^{2m}(\Omega)$; elle donne donc lieu à une inégalité du type Cauchy-Schwarz :

$$| [u, v] |^2 \leq [u, u] \cdot [v, v] \quad (6.1)$$

Enfin nous avons l'inégalité de coercivité (exposé III) :

$$c^{-1} \|u\|_{2m}^2 \leq [u, u] + \|u\|_0^2 \quad (6.2)$$

Cette inégalité montre que le produit scalaire $((,)) = , [+] +$
 $+ (,)$ peut être substitué au produit scalaire habituel de

$H^{2m}(\Omega)$. Dans la suite nous supposons $H^{2m}(\Omega)$ muni de ce nouveau produit scalaire.

Lemme 6.1 : $H^{2m}(\Omega) = \{H^{2m}(\Omega) ; N'\} \oplus N'$

Démonstration : $\{H^{2m}(\Omega) ; N'\}$ est l'orthogonal de N' dans $H^{2m}(\Omega)$, car pour $u \in H^{2m}(\Omega)$ et $v \in N'$ on a :

$$((u, v)) = (u, v) .$$

Lemme 6.2 : Il existe une constante $C > 0$ telle que

$$C^{-1} \|v\|_{2m}^2 \leq [v, v] \leq C \|v\|_{2m}^2$$

pour tout $v \in \{H^{2m}(\Omega) ; N'\}$.

Démonstration : Seule la première inégalité est à démontrer. Si elle n'avait pas lieu, il existerait une suite

$$\{v_k\}_{k=1,2,\dots} \subset \{H^{2m}(\Omega) ; N'\} , \text{ avec } \|v_k\|_{2m} = 1 \text{ et}$$

$$[v_k, v_k] \longrightarrow 0 \text{ pour } k \longrightarrow +\infty .$$

La complète continuité de l'injection de $H^{2m}(\Omega)$ dans $L_2(\Omega)$, montre qu'il existe une suite partielle, que nous noterons encore

$$\{v_k\}_{k=1,2,\dots} , \text{ et qui a les propriétés suivantes :}$$

$$\|v_k\|_{2m} = 1$$

$$v_k \longrightarrow v \text{ dans } L_2(\Omega) \text{ pour } k \longrightarrow +\infty$$

$$[v_k, v_k] \longrightarrow 0 \text{ pour } k \longrightarrow +\infty$$

avec $v \in L_2(\Omega)$.

L'inégalité (6.2) appliquée à $v_k - v_\ell$:

$$C^{-1} \|v_k - v_\ell\|_{2m}^2 \leq [v_k - v_\ell, v_k - v_\ell] + \|v_k - v_\ell\|_0^2$$

et l'inégalité (6.1) montrent que $\{v_k\}$ est une suite de Cauchy

dans $H^{2m}(\Omega)$; on en déduit que $v \in H^{2m}(\Omega)$, $v_k \longrightarrow v$ dans

$H^{2m}(\Omega)$ pour $k \longrightarrow +\infty$, donc $v \in \{H^{2m}(\Omega) ; N'\}$, $\|v\|_{2m} = 1$

et $[v, v] = \lim_{k \rightarrow \infty} [v_k, v_k] = 0$, i.e. $v \in N'$, ce qui est en

contradiction avec le lemme 6.1

C.Q.F.D.

Passons à la démonstration du théorème 6.1 . Soit f fixée

dans $\{L_2(\Omega) ; N'\}$. Le lemme 6.2 montre que le produit scalaire

$u, v \rightsquigarrow [u, v]$ peut être substitué au produit scalaire

$u, v \rightsquigarrow ((u, v))$ sur $\{H^{2m}(\Omega) ; N'\}$. Comme $v \rightsquigarrow (f, v)$

est une forme antilinéaire continue sur $\{H^{2m}(\Omega) ; N'\}$ nous en

déduisons qu'il existe $g \in \{H^{2m}(\Omega) ; N'\}$ (unique) tel que

$[g, v] = (f, v)$ pour toute $v \in \{H^{2m}(\Omega) ; N'\}$.

Nous allons vérifier que l'identité

$$[g, v] = (f, v) \tag{6.3}$$

est vraie pour toute $v \in H^{2m}(\Omega)$; en effet, d'après le lemme 6.1

on peut écrire $v = v_1 + v_2$ avec $v_1 \in N'$ et $v_2 \in \{H^{2m}(\Omega); N'\}$.

Il vient :

$$[g, v] = [g, v_2] = (f, v_2) = (f, v)$$

car $[g, v_1] = 0$ ($v_1 \in N'$) et $(f, v_1) = 0$

($f \in \{H^{2m}(\Omega); N'\}$) .

Admettons provisoirement le :

Théorème 6.2 : Soit $f \in L_2(\Omega)$ et u une solution du problème

variationnel : $u \in H^{2m}(\Omega)$ et $[u, v] = (f, v)$ pour toute

$v \in H^{2m}(\Omega)$, alors $u \in H^{4m}(\Omega)$.

Ce théorème s'applique à g , nous avons donc :

$$g \in H^{4m}(\Omega)$$

La relation (6.3) écrite pour $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ est

$$(A'g, A'v) = (f, v)$$

nous avons donc $AA'g = f$. Posons $u = A'g$:

$$\begin{cases} u \in H^{2m}(\Omega) \\ Au = f \end{cases}$$

et $(u, A'v) + \sum_{j=1}^m ((B_j'g, B_j'v))_j = (Au, v)$ pour toute $v \in H^{2m}(\Omega)$

En particulier lorsque $v \in D(A_2')$ on a

$$(u, A'v) = (Au, v)$$

mais l'application de la formule de Green (exposé IV) montre que

$$(A u, v) - (u, A' v) = \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} B_j u \overline{C_j' v} d\sigma$$

donc on a $\sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} B_j u \overline{C_j' v} d\sigma = 0$, pour toute $v \in H^{2m}(\Omega)$
avec $B_j' v = 0$, $j=1, 2, \dots, m$.

Lorsque la fonction v varie en étant assujettie à ces conditions

$\{C_j' v\}_{j=1}^m$ parcourt un sous-espace dense de $(L_2(\Gamma))^m$, donc

nous avons

$$\sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} B_j u \overline{h_j} d\sigma = 0$$

pour toute famille $\{h_j\}_{j=1}^m \in (L_2(\Gamma))^m$, i.e. $B_j u = 0$ pour
 $j=1, 2, \dots, m$.

En résumé nous avons $u \in D(A_2)$ avec $A_2 u = f$ ce qui montre
que $R(A_2) \supset \{L_2(\Omega); N'\}$ - sous réserve de vérifier le Théorème

6.2. Avant de faire cette vérification, nous démontrons le :

Corollaire 6.1 : $A_2' = A_2^*$ et $A_2'^* = A_2$

Ces deux identités sont équivalentes. Vérifions la première :

Nous avons établi l'identité : $R(A_2) = \{L_2(\Omega); N'\}$. Echangeant

les rôles de $\{A; B_1, \dots, B_m\}$ et $\{A'; B_1', \dots, B_m'\}$ nous avons aussi

$R(A_2') = \{L_2(\Omega); N\}$. $R(A_2)$ étant fermé, nous avons aussi

$$R(A_2) = \{L_2(\Omega); N(A_2^*)\}$$

et
$$R(A_2^*) = \{L_2(\Omega); N\}$$

Nous en déduisons que $N(A_2^*) = N'$ et $R(A_2^*) = R(A_2')$.

Grâce au lemme 5.2 il suffit de vérifier que $D(A_2^*) \subseteq D(A_2')$.

Pour cela soit $u \in D(A_2^*)$ alors

$$A_2^* u = f \in R(A_2^*) = R(A_2')$$

il existe donc $u_0 \in D(A_2')$ tel que $A_2' u_0 = f$ et

$u - u_0 \in N(A_2^*) = N' \subset D(A_2')$, donc écrivant $u = (u - u_0) + u_0$

nous voyons que $u \in D(A_2')$.

C.Q.F.D.

2 - La fin de cet exposé est consacrée à la vérification du théorème 6.2, qui résulte de plusieurs lemmes.

Lemme 6.3 : Sous les hypothèses du théorème 6.2 on a $u \in H_{loc}^{4m}(\Omega)$

On remarque que u est solution dans Ω de l'équation elliptique d'ordre $4m$: $AA'u = f$ avec $f \in L_2(\Omega)$; le lemme exprime un résultat de régularité à l'intérieur, qui est classique.

Lemme 6.4 : Si une fonction $v \in H^s(R_+^n)$ (s entier ≥ 0) a toutes ses dérivées d'ordre k ($k > s$) dans $H^{s-k+1}(R_+^n)$ alors $v \in H^{s+1}(R_+^n)$.

Démonstration : De manière générale, nous posons :

$$X_{s,k}(\Omega) = \left\{ v \in H^s(\Omega) ; D^\alpha v \in H^{s-k+1}(\Omega) \text{ pour } |\alpha| = k \right\}$$

Nous montrerons que :

$$(i) \quad X_{s,k}(\mathbb{R}^n) \subset H^{s+1}(\mathbb{R}^n)$$

(ii) il existe un opérateur de "prolongement" P de $X_{s,k}(\mathbb{R}_+^n)$

dans $X_{s,k}(\mathbb{R}^n)$ linéaire continu, tel que $Pv|_{\mathbb{R}_+^n} = v$ pour toute

$$v \in X_{s,k}(\mathbb{R}_+^n) .$$

Le point (i) est évident par transformation de Fourier; vérifions

(ii) : en régularisant les fonctions de $X_{s,k}(\mathbb{R}_+^n)$ à l'aide de

fonctions de $\mathcal{D}(\mathbb{R}_-^n)$, on vérifie que $C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n}) \cap X_{s,k}(\mathbb{R}_+^n)$ est dense

dans $X_{s,k}(\mathbb{R}_+^n)$, il suffit donc de définir Pv pour v indéfini-

ment dérivable dans $\overline{\mathbb{R}_+^n}$. On peut (par exemple) poser :

$$(Pv)(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} v(x_1, \dots, x_n) & x_n \geq 0 \\ \sum_{j=1}^{\ell} \lambda_j v(x_1, \dots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{j}) & x_n < 0 \end{cases}$$

$$\text{avec } \sum_{j=1}^{\ell} \lambda_j \left(-\frac{1}{j}\right)^r = 1 \quad \text{pour } r = s-k, s-k+1, \dots, k-1$$

Il est élémentaire de vérifier que l'opérateur P ainsi défini remplit les conditions requises.

Introduisons quelques notations :

$$\tau_{i,h} v(x) = v(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i+h, x_{i+1}, \dots, x_n) \quad , \quad i=1,2,\dots,n$$

$$\Delta_{i,h} v = \tau_{i,h} v - v, \quad \rho_{i,h} v = \frac{1}{h} \Delta_{i,h} v$$

$$\Sigma_R = \{x \in \mathbb{R}^n ; |x| < R, \quad x_n \geq 0\}$$

$$H^s(\Sigma_R) = H^s(\overset{o}{\Sigma_R}) \quad \text{pour tout } s.$$

$H_K^s(\Sigma_R)$ est le sous-espace de $H^s(\Sigma_R)$ formé des fonctions à support compact dans Σ_R , i.e. des fonctions nulles dans un voisinage de la partie courbée de $\partial \Sigma_R$.

Les lemmes qui suivent, sont relatifs à une forme sesquilinéaire sur le domaine Σ_R :

$$H_K^{2m}(\Sigma_R) \times H_K^{2m}(\Sigma_R) \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$u, v \rightsquigarrow \{u, v\}$$

$$\{u, v\} = (\mathcal{A}' u, \mathcal{A}' v) + \sum_{j=1}^m ((\mathcal{B}_j' u, \mathcal{B}_j' v))_j$$

avec $\mathcal{A}'$ opérateur elliptique d'ordre $2m$, à coefficients $C^\infty(\Sigma_R)$,

et $\mathcal{B}_j'$ opérateur-frontière d'ordre m_j' à coefficients

$C^\infty(\Sigma_R \cap \mathbb{R}^{n-1})$, $((\ , \))_j$ désignant le produit scalaire de $H^{2m-m'_j-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})$.

On suppose aussi que l'inégalité de coercivité (analogue à (6.2)) a lieu :

$$C^{-1} \|u\|_{2m}^2 \leq \{u, u\} + \|u\|_0^2 \quad (6.2)'$$

pour $u \in H_K^{2m}(\Sigma_R)$.

Lemme 6.5 : Soit $u \in H_K^{2m}(\Sigma_R)$, on suppose qu'il existe une cons-
tante C telle que :

$$|\{\rho_{i,h} u, v\}| \leq C \|v\|_{2m}$$

pour toute $v \in H_K^{2m}(\Sigma_R)$; alors $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in H_K^{2m}(\Sigma_R)$.

démonstration : Posant $v = \rho_{i,h} u$ et utilisant l'inégalité

(6.2)' nous obtenons (pour h assez petit)

$$\begin{aligned} C^{-1} \|\rho_{i,h} u\|_{2m}^2 &\leq \{\rho_{i,h} u, \rho_{i,h} u\} + \|\rho_{i,h} u\|_0^2 \\ &\leq C' \|\rho_{i,h} u\|_{2m} + \|\rho_{i,h} u\|_0^2 \end{aligned}$$

Nous en déduisons l'existence de constantes K_1 et K_2 indépen-
dantes de h telles que :

$$\|\rho_{i,h} u\|_{2m}^2 \leq K_1 + K_2 \|u\|_1^2$$

d'où

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} \in H^{2m}(\Sigma_R)$$

C.Q.F.D.

Lemme 6.6 : On considère v telle que :

(i) $D_\tau^k v \in H_K^s(\Sigma_R)$ pour $k \leq t$ (s entier > 0)

(ii) $D_n^\ell v = g + \sum_{|\alpha| < \ell-s} D^\alpha f_\alpha$

avec $\ell \geq s + t$, $g \in H_K^0(\sum_R)$, $f_\alpha \in \mathcal{D}'(\sum_R^0)$ et $D_\tau^k f_\alpha \in H_K^0(\sum_R)$

pour $k \leq t-1$.

Alors $D_\tau^k v \in H_K^{s+1}(\sum_R)$ pour $k \leq t-1$.

Ici et dans la suite de cet exposé, D_n désigne une dérivation

par rapport à x_n et D_τ^k n'importe quelle dérivation "tangentielle"

c.à.d. une dérivation d'ordre k par rapport aux seules variables

$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$.

Démonstration : Fixons $k \leq t-1$; pour montrer que

$D_\tau^k v \in H_K^{s+1}(\sum_R)$, il suffit grâce à l'hypothèse (i) et au lemme

6.4 de vérifier que toutes les dérivées d'ordre ℓ de $D_\tau^k v$ sont

dans $H^{s+1-\ell}(\sum_R)$.

Soit D^ℓ une dérivation quelconque d'ordre ℓ ; deux cas se présentent :

a) D^ℓ contient une dérivation tangentielle : $D^\ell = D^{\ell-1} D_\tau$

alors $D^\ell(D_\tau^k v) = D^{\ell-1}(D_\tau^{k+1} v)$ et comme $k+1 \leq t$, on a

$D_\tau^{k+1} v \in H^s(\sum_R)$, d'où $D^\ell(D_\tau^k v) \in H^{s+1-\ell}(\sum_R)$

b) D^ℓ ne contient aucune dérivation tangentielle et s'écrit

D_n^ℓ , alors

$$D_n^\ell(D_\tau^k v) = D_\tau^k(D_n^\ell v) = D_\tau^k g + \sum_{|\alpha| < \ell-s} D^\alpha(D_\tau^k f_\alpha)$$

On a $D_{\tau}^k g \in H^{-k}(\sum_R) \subseteq H^{1-t}(\sum_R) \subseteq H^{s+1-\ell}(\sum_R)$ car $k \leq t-1$ et

$s+t \leq \ell$, et on a par hypothèse $D_{\tau}^k f_{\alpha} \in H^0(\sum_R)$, donc

$D^{\alpha}(D_{\tau}^k f_{\alpha}) \in H^{s+1-\ell}(\sum_R)$ pour $|\alpha| \leq \ell-s-1$; en conséquence on a

$$D_n^{\ell}(D_{\tau}^k v) \in H^{s+1-\ell}(\sum_R).$$

Le lemme est démontré.

Lemme 6.7 : Si u et $v \in H^{2m+s}(\sum_R)$, s entier 0 et $\zeta \in C^{\infty}(\sum_R)$.

alors

$$\begin{aligned} & \left| \left\{ \rho_{i,h} D_{\tau}^s(\zeta u), v \right\} + \left\{ u, D_{\tau}^s \zeta \rho_{i,-h} v \right\} \right| \\ & \leq C \|v\|_{2m} \sum_{t \leq s} \|D_{\tau}^t u\|_{2m} \end{aligned} \quad (6.4)$$

où la constante ne dépend pas de u, v et h .

Nous admettons provisoirement ce dernier lemme et nous démontrons

le Théorème 6.2 : Par application du lemme 6.3, nous avons $u \in$

$\in H_{loc}^{4m}(\Omega)$, il nous reste donc à montrer que u est de classe

H^{4m} au voisinage de chaque point de Γ . Par cartes locales, on

est ramené au cas $\Omega = \sum_R$, $[,]$ étant remplacée par $\{ , \}$:

Soit $x_0 \in \Gamma$, et soit U un voisinage de x_0 dans $\bar{\Omega}$, qui

soit difféomorphe à $\sum_R$, l'image de $\partial U \cap \Gamma$ par difféomorphisme

étant $\partial \sum_R \cap R^{n-1}$ et l'image de x_0 étant 0 ; on applique l'i-

dentité $[u, v] = (f, v)$

avec $v \in H^{2m}(\Omega)$, v ayant son support dans U , et on effectue le changement de variables; alors dans les nouvelles coordonnées $u|_u$ est solution de

$$\{u, v\} = (f, v)$$

pour toute $v \in H_K^{2m}(\Sigma_R)$, avec $f \in H^0(\Sigma_R)$ (1)

Il faut montrer que $u \in H_{loc}^{4m}(\Sigma_R)$ c'est-à-dire que $\zeta u \in H^{4m}(\Sigma_R)$ pour toute $\zeta \in C_K^\infty(\Sigma_R)$.

a) Dans une première étape, nous montrerons par récurrence sur s , que $D_\tau^s(\zeta u) \in H^{2m}(\Sigma_R)$ toute pour $\zeta \in C_K^\infty(\Sigma_R)$, $s=1,2,\dots,2m$. Nous supposons donc que $D_\tau^t(\zeta u) \in H^{2m}(\Sigma_R)$ pour $t=1,2,\dots,s-1$ et pour toute $\zeta \in C_K^\infty(\Sigma_R)$ nous montrons que $D_\tau^s(\zeta u) \in H^{2m}(\Sigma_R)$:

Par hypothèse nous avons $\sum_{t \leq s-1} \|D_\tau^t(\zeta u)\|_{2m} < +\infty$; l'application

du lemme 6.7 donne :

$$|\{\rho_{i,h} D_\tau^{s-1}(\zeta u), v\}| \leq |(f, D_\tau^{s-1} \zeta(\rho_{i,-h} v))| + C \|v\|_{2m}$$

$$\text{d'où } |\{\rho_{i,h} D_\tau^{s-1}(\zeta u), v\}| \leq C_1 \|v\|_{2m}$$

pour toute $v \in H_K^{2m}(\Sigma_R)$.

La dernière inégalité, jointe au lemme 6.5 donne

$$\frac{\partial}{\partial x_i} D_\tau^{s-1}(\zeta u) \in H^{2m}(\Sigma_R).$$

(1) On note encore u et f les images par le changement de variables de $u|_u$ et $f|_u$.

Ce raisonnement vaut pour $i=1,2,\dots,n-1$ et montre que

$$D_{\tau}^s(\zeta u) \in H^{2m}(\sum_R)$$

pour toute $\zeta \in C_K^{\infty}(\sum_R)$; la récurrence se propage et nous avons

$$D_{\tau}^s(\zeta u) \in H^{2m}(\sum_R)$$

pour $s \leq 2m$, $\zeta \in C_K^{\infty}(\sum_R)$ (c'est la "régularisation tangentielle")

b) La seconde étape consiste à démontrer par une nouvelle récurrence sur s que :

$$\begin{aligned} D_{\tau}^k(\zeta u) &\in H^{2m+s}(\sum_R) \quad \text{pour } k \leq 2m-s \\ &\text{et } \zeta \in C_K^{\infty}(\sum_R) \end{aligned} \quad (6.5)$$

avec $s=1,2,\dots,2m$.

Nous supposons donc que (6.5) est démontré pour un s avec $0 \leq s \leq 2m-1$, et nous montrons que (6.5) est encore vrai avec s remplacé par $s+1$:

Pour commencer nous remarquons que u est solution de l'équation elliptique d'ordre $4m$ dans $\sum_R$: $\mathcal{A}\mathcal{A}' u = f \quad (1)$

Nous avons donc $\mathcal{A}\mathcal{A}'(\zeta u) = \zeta f + \xi u$, où ξ est un opérateur d'ordre $4m-1$, dont les coefficients ont leurs supports dans un même compact de $\sum_R$ (plus précisément dans le support de ζ) .

Il existe donc $\zeta_1 \in C_K^{\infty}(\sum_R)$ tel que $\xi u = \xi(\zeta_1 u)$. Soit a le

(1) $\mathcal{A}$ est l'adjoint formel de $\mathcal{A}'$.

coefficient de D_n^{4m} dans $\mathcal{A}\mathcal{A}'$, l'ellipticité de $\mathcal{A}\mathcal{A}'$ nous assure de ce que a ne s'annule pas dans $\sum_R$, et on a

$$a D_n^{4m}(\zeta u) = \mathcal{A}\mathcal{A}(\zeta u) + g(\zeta u)$$

où g est un opérateur d'ordre $4m$ sans terme en D_n^{4m} . Nous avons donc

$$a D_n^{4m}(\zeta u) = \zeta f + \mathcal{E}(\zeta_1 u) + g(\zeta u) \quad (6.6)$$

Pour pouvoir appliquer le lemme 6.6, nous allons montrer que

$$a D_n^{4m}(\zeta u) = g + \sum_{|\alpha| < 2m-s} D^\alpha f_\alpha \quad (6.7)$$

avec $g \in H^0(\sum_R)$ et $D_\tau^k f_\alpha \in H^0(\sum_R)$ pour $k \leq 2m-s-1$

Considérons successivement tous les termes composant la somme de droite dans (6.6), et montrons qu'ils admettent une décomposition du type (6.7) :

$$(i) \quad \zeta f \in H^0(\sum_R)$$

(ii) $\mathcal{E}(\zeta_1 u)$ est combinaison linéaire (à coefficients dans $C^\infty(\sum_R)$) de dérivées $D_n^\alpha D_\tau^\beta(\zeta_1 u)$ avec $\alpha + \beta \leq 4m-1$.

Lorsque $\alpha \leq 2m+s$, on a par hypothèse de récurrence

$$D_n^\alpha D_\tau^\beta(\zeta_1 u) \in H^0(\sum_R)$$

et lorsque $\alpha > 2m+s$ on écrit

$$D_n^\alpha D_\tau^\beta(\zeta_1 u) = D_n^{\alpha-2m-s} D_\tau^\beta(D_n^{2m+s}(\zeta_1 u))$$

c'est une dérivée d'ordre $\leq 2m-s-1$ de $(D_n^{2m+s}(\zeta_1 u))$ qui est telle que $D_\tau^k(D_n^{2m+s}(\zeta_1 u)) \in H^0(\sum_R)$ pour $k \leq 2m-s-1$.

(iii) $\mathcal{G}(\zeta u)$ est combinaison linéaire (à coefficients dans $C^\infty(\sum_R)$) de dérivées $D_n^\alpha D_\tau^\beta(\zeta u)$ avec $\alpha + \beta \leq 4m$ et $\alpha \leq 4m-1$.

Lorsque $\alpha \leq 2m+s$ on a $D_n^\alpha D_\tau^\beta(\zeta u) \in H^0(\sum_R)$; ensuite lorsque

$\alpha > 2m+s$ et $\beta \geq 1$ on écrit :

$$D_n^\alpha D_\tau^\beta(\zeta u) = D_n^{\alpha-2m-s} D_\tau^{\beta-1} (D_\tau D_n^{2m+s}(\zeta u))$$

c'est une dérivée d'ordre $\leq 2m-s-1$ de la fonction $(D_\tau D_n^{2m+s}(\zeta u))$ qui est telle que

$$D_\tau^k (D_\tau D_n^{2m+s}(\zeta u)) \in H^0(\sum_R)$$

pour $k \leq 2m-s-1$; enfin lorsque $\alpha > 2m+s$ et $\beta = 0$ on a

$$D_n^\alpha D_\tau^\beta(\zeta u) = D_n^\alpha(\zeta u) \text{ et } 2m+s < 4m-1 \text{ donc } D_n^\alpha D_\tau^\beta(\zeta u) = D_n^{\alpha-2m-s}$$

$(D_n^{2m+s}(\zeta u))$ dérivée d'ordre $\leq 2m-s-1$ de la fonction

$(D_n^{2m+s}(\zeta u))$ qui est telle que $D_\tau^k(D_n^{2m+s} \zeta u) \in H^0(\sum_R)$ pour

$k \leq 2m-s-1$.

Nous avons donc vérifié que l'identité (6.7) a lieu, et comme $a^{-1} \in C^\infty(\sum_R)$ il est facile de vérifier qu'une identité analogue a lieu pour $D_n^{4m}(\zeta u)$.

Nous pouvons donc appliquer le lemme 6.6 avec t, s, ℓ

remplacés par $2m-s$, $2m+s$ et $4m$ respectivement (on a bien alors $s+t \leq \ell$) ; et nous obtenons $D_{\tau}^k(\zeta u) \in H^{2m+s+1}(\sum_R)$ pour $k \leq 2m-s-1$ et $\zeta \in C_K^{\infty}(\sum_R)$.

La récurrence se propage, ce qui prouve (6.5) et le théorème 6.2.

Il nous reste à vérifier le lemme 6.7 : il nous faut majorer entre autres la somme :

$$(\mathcal{A}' \rho_{i,h} D_{\tau}^s(\zeta u), \mathcal{A}' v) + (\mathcal{A}' u, \mathcal{A}' D_{\tau}^s \zeta \rho_{i,-h} v)$$

c'est une somme de termes de la forme :

$$(a_{\alpha} D^{\alpha} \rho_{i,h} D_{\tau}^s(\zeta u), a_{\beta} D^{\beta} v) + (a_{\alpha} D^{\alpha} u, a_{\beta} D^{\beta} D_{\tau}^s(\zeta \rho_{i,-h} v))$$

avec $a_{\alpha}, a_{\beta} \in C^{\infty}(\overline{\sum_R})$ et $|\alpha|, |\beta| \leq 2m$.

Vu les propriétés des fonctions $a_{\alpha}, a_{\beta}, \zeta$ et du support de ζ , on voit par application de la formule de Leibnitz qu'il suffit de vérifier que

$$|(D^{\alpha}(\rho_{i,h} D_{\tau}^s u), D^{\beta} v) + (D^{\alpha} u, D^{\beta} D_{\tau}^s(\rho_{i,-h} v))|$$

$$\leq C \|v\|_{2m} \sum_{t \leq s} \|D_{\tau}^t u\|_{2m}$$

pour $v \in H_K^{2m}(\sum_R)$, et u telle que $D_{\tau}^t u \in H_K^{2m}(\sum_R)$ pour $t \leq s$.

Ceci résulte de l'identité évidente :

$$|(\rho_{i,h} f, g) + (f, \rho_{i,-h} g)| = 0$$

pour $f, g \in H_K^0(\sum_R)$.

La majoration des autres termes intervenant dans

$$\{\rho_{i,h} D_{\tau}^S(\zeta u), v\} + \{u, D_{\tau}^S(\zeta \rho_{i,-h} v)\} \text{ étant analogue,}$$

nous ne la détaillons pas.

VII - EXISTENCE DANS L_p

1 - Nous utilisons les notations des deux exposés précédents ;

Théorème 7.1 : $R(A_p) = \{L_p(\Omega) ; N'\}$

Démonstration : Nous savons déjà que $R(A_p)$ est un sous-espace fermé de $\{L_p(\Omega) ; N'\}$ (exposé V) et que $\{C^\infty(\bar{\Omega}) ; N'\}$ est dense dans $\{L_p(\Omega) ; N'\}$ (exposé V). Il nous suffit de voir que

$$R(A_p) \supset \{C^\infty(\bar{\Omega}) ; N'\} .$$

Soit $f \in \{C^\infty(\bar{\Omega}) ; N'\} \subset R(A_2)$ (exposé VI) alors il existe $u \in D(A_2)$ tel que $A u = f$; les résultats de régularité (exposé III) montrent que

$$u \in C^\infty(\bar{\Omega}) \subset W_p^{2m}(\Omega)$$

Comme $u \in D(A_2)$ on a $B_j u = 0$, $j=1,2,\dots,m$, d'où $u \in D(A_p)$

et $f = A_p u \in R(A_p)$

Corollaire 7.1 : A_p est un opérateur à indice ⁽¹⁾ C.Q.F.D. ; son indice est

$\dim N - \dim N'$, ne dépend pas de p ; nous le noterons $\chi(A; B_1, \dots, B_m)$.

(1) Un opérateur linéaire Λ opérant de l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel F est dit "opérateur à indice" si son noyau $\Lambda^{-1}(0)$ est de dimension finie et son image $\Lambda(E)$ est de codimension (dans F) finie. On sait que si E et F sont deux espaces de Fréchet et si Λ est continu, alors, s'il a un indice c'est un homomorphisme (strict) ; l'indice est

$$\chi(\Lambda) = \dim \bar{\Lambda}^{-1}(0) - \text{codim } \Lambda(E) .$$

Théorème 7.2 : Si $u \in D(A_p)$ et $A_p u \in L_q(\Omega)$ alors $u \in D(A_q)$.

Démonstration : $A_p u = f \in L_q(\Omega) \cap R(A_p)$

i.e. $f \in L_q(\Omega) \cap \{L_p(\Omega); N'\} \subset \{L_q(\Omega); N'\} = R(A_q)$

donc il existe $u_0 \in D(A_q)$ avec $A_q u_0 = f$. Soit $r = \inf(p, q)$,

Ω étant borné nous avons les inclusions

$$L_p(\Omega), L_q(\Omega) \subset L_r(\Omega)$$

d'où $W_p^{2m}(\Omega), W_q^{2m}(\Omega) \subset W_r^{2m}(\Omega)$

et $D(A_p), D(A_q) \subset D(A_r)$

et $u - u_0 \in D(A_r)$ avec $A_r(u - u_0) = 0$.

Nous avons donc $u - u_0 \in N \subset D(A_q)$ et $u = (u - u_0) + u_0 \in D(A_q)$

C.Q.F.D.

Remarque 7.1 : Ces théorèmes sont vrais, avec les modifications

évidentes, lorsqu'on remplace A par A'

Théorème 7.3 : $A_p^* = A_{p'}'$ et $A_{p'}'^* = A_p$

Démonstration : Pour tout p les deux identités sont équivalentes,

car $A_p^{**} = A_p$; il suffit donc de démontrer la première pour

$1 < p < 2$ et la seconde pour $2 < p < +\infty$. (i.e. $1 < p' < 2$).

Les deux problèmes aux limites $\{A; B_1, \dots, B_m\}$ et $\{A'; B_1', \dots, B_m'\}$

ayant des propriétés analogues, il suffit en fait de vérifier que

$A'_{p'} = A_p^*$ pour $1 < p < 2$, la démonstration de l'autre identité pour $1 < p' < 2$ étant analogue.

Grâce au lemme 5.2, il reste à vérifier que

$$D(A_p^*) \subset D(A'_{p'}) \quad 1 < p < 2 .$$

Soit $v \in D(A_p^*)$, alors

$$u \rightsquigarrow (A_p u, v) = (u, A_p^* v)$$

est linéaire continue sur $D(A_p)$ pour la norme induite par $L_p(\Omega)$,

donc aussi sur $D(A_2)$ pour la norme induite par $L_2(\Omega)$ (car

$D(A_2) \subset D(A_p)$ et $A_p^* v \in L_{p'}(\Omega) \subset L_2(\Omega)$) . En conséquence

$$v \in D(A_2^*) = D(A'_2)$$

et $A_2^* v = A'_2 v = A_p^* v \in L_{p'}(\Omega)$, donc (Théorème 7.2) $v \in D(A'_{p'})$

C.Q.F.D.

2 - Combinant ces derniers théorèmes avec les résultats de régularité de l'exposé III nous obtenons le :

Théorème 7.4 : Le problème

$$\left\{ \begin{array}{l} u \in W_p^{2m+k}(\Omega) \\ A u = f \quad \text{dans} \quad \Omega \\ B_j u = 0 \quad \text{sur} \quad \Gamma \end{array} \right.$$

avec $f \in W_p^k(\Omega)$ ($k=0,1,\dots$) possède une solution si et seulement

si f est orthogonale à N' ; la solution u est unique à un

élément de N près.

Ceci résoud un problème aux limites homogène, c'est-à-dire avec conditions aux limites homogènes.

On pourrait considérer A comme opérateur $A_{p,k}$ non borné dans $W_p^k(\Omega)$ de domaine $\left\{ u \in W_p^{2m+k}(\Omega) ; B_j u = 0, j=1, \dots, m \right\}$; l'opérateur ainsi obtenu est un opérateur à indice lequel indice est égal à $\chi(A; B_1, \dots, B_m)$ et ne dépend donc ni de p ni de k .

Considérons à présent un problème aux limites non homogènes:

On donne $f \in W_p^k(\Omega)$ et $g_j \in W_p^{2m+k-mj-1/p}(\Gamma)$, $j=1, 2, \dots, m$, et on cherche

$$\begin{cases} u \in W_p^{2m+k}(\Omega) \\ A u = f \quad \text{dans } \Omega \\ B_j u = g_j \quad \text{sur } \Gamma \end{cases}$$

Il existe (exposé IV) $w \in W_p^{2m+k}(\Omega)$ avec $B_j w = g_j$, $j=1, 2, \dots, m$.

Nous allons chercher u sous la forme $v + w$; alors v est solution du problème :

$$\begin{cases} v \in W_p^{2m+k}(\Omega) \\ A v = f - A w \quad \text{dans } \Omega \\ B_j v = 0 \quad \text{sur } \Gamma \end{cases}$$

Ce problème possède une solution si et seulement si $(f - Aw, v) = 0$

$$\begin{aligned} \text{pour toute } v \in N' ; \quad (f - Aw, v) &= (f, v) + \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} B_j w \overline{C_j' v} \, d\sigma \\ &= (f, v) + \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} g_j \overline{C_j' v} \, d\sigma \end{aligned}$$

et nous avons le

Théorème 7.5 : Le problème :

$$u \in W_p^{2m+k}(\Omega)$$

$$A u = f \quad \text{dans } \Omega$$

$$B_j u = g_j \quad \text{sur } \Gamma \quad j=1, 2, \dots, m$$

possède une solution pour $f \in W_p^k(\Omega)$ et $g_j \in W_p^{2m+k-mj-1/p}(\Gamma)$

$j=1, 2, \dots, m$ si et seulement si

$$(f, v) + \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} g_j \overline{C_j' v} \, d\sigma = 0$$

pour tout $v \in N'$. La solution est unique à un élément de N près.

3 - Plusieurs questions naturelles se posent à présent :

(i) Quand avons-nous $N = \{0\}$? Dans ce cas il y a unicité de la solution donnée dans le Théorème 7.5.

(ii) Quand avons-nous $N' = \{0\}$? Dans ce cas il y a existence de la solution du problème non homogène considéré au Théorème 7.5 ,

pour tout $f \in W_p^k(\Omega)$ et $g_j \in W_p^{2m+k-1/p}(\Gamma)$, $j=1, 2, \dots, m$.

(iii) Quand avons-nous $\dim N = \dim N'$? Dans ce cas A_p est un opérateur de "Riesz-Fredholm".

Nous allons répondre partiellement à ces questions.

(i) Nous pouvons écrire l'opérateur A sous la forme :

$$A = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (e_{\alpha\beta}(x) D^\beta)$$

et soit

$$u, v \rightsquigarrow a(u, v) = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} (a_{\alpha\beta} D^\beta u, D^\alpha v)$$

la forme sesquilinéaire (forme de Dirichlet) associée à l'opérateur A , définie sur $H^m(\Omega) \times H^m(\Omega)$.

Pour $u, v \in C^\infty(\bar{\Omega})$ nous avons les formules de Green suivantes⁽¹⁾ :

$$(Au, v) - a(u, v) = \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} S_j u \gamma_{j-1} v \, d\sigma \quad (2)$$

où les S_j sont des "opérateurs-frontières" à coefficients $C^\infty(\Gamma)$, d'ordre $2m-j$.

Soit $\{1, \dots, m\} = \{j_1, \dots, j_k\} \cup \{j_{k+1}, \dots, j_m\}$ une partition de l'ensemble $\{1, \dots, m\}$ nous allons donner une condition suffisante pour qu'il y ait unicité (i.e. $N = 0$) pour le problème aux limites

$$\{A; \gamma_{j_1-1}, \dots, \gamma_{j_k-1}, S_{j_{k+1}} \dots S_{j_m}\} \quad (3)$$

(1) Voir exposé IV, 5.

(2) Rappelons que $\gamma_j v = \frac{\partial^j v}{\partial n^j}$, n normale à Γ , intérieure à Ω .

(3) Les résultats seront valables pour tout système $\{B_j\}_{j=1}^m$ équivalent (exp.IV) à $\{\gamma_{j_1-1}, \dots, S_{j_m}\}$.

Lorsque $k = m$ ce problème est le "problème de Dirichlet" relatif à A , lorsque $k = 0$, c'est le "problème de Neumann".

Soit $V = \{v \in H^m(\Omega); \gamma_{j_1-1} v = 0, \dots, \gamma_{j_k-1} v = 0\}$,

c'est un sous-espace fermé de $H^m(\Omega)$;

$V = H_0^m(\Omega)$ dans le cas du problème de Dirichlet

$V = H^m(\Omega)$ dans le cas du problème de Neumann.

Proposition 7.1 : On suppose que la forme $a(u,v)$ est "V-elliptique" c'est-à-dire qu'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$|a(v,v)| \geq C \|v\|_m^2 \quad \text{pour } v \in V ;$$

alors la seule solution du problème :

$$\begin{cases} u \in C^\infty(\bar{\Omega}) \\ Au = 0 \\ \gamma_{j_i-1} u = 0 & i=1,2,\dots,k \\ S_{j_i} u = 0 & i=k+1,\dots,m \end{cases}$$

est $u \equiv 0$.

En d'autres termes, lorsque a est V-elliptique, on a $N = \{0\}$ pour le problème aux limites $\{A; \gamma_{j_1-1}, \dots, \gamma_{j_k-1}, S_{j_k}, \dots, S_{j_m}\}$

Démonstration : Soit $u \in N$, calculons $a(u,u)$ à l'aide de la formule de Green : il vient

$$a(u,u) = (Au,u) - \sum_{i=1}^k \int_{\Gamma} S_{ji} u \overline{\gamma_{ji-1} u} d\sigma - \sum_{i=k+1}^m \int_{\Gamma} S_{ji} u \overline{\gamma_{ji-1} u} d\sigma = 0$$

La V-ellipticité, implique que $u = 0$

C.Q.F.D.

Remarque 7.2 : Ce résultat est du type variationnel; la méthode s'applique à tous les problèmes aux limites que l'on peut résoudre par une méthode variationnelle, c'est pourquoi nous n'insistons pas sur ce point de vue (voir l'Introduction) .

Remarque 7.3 : On sait que si A est fortement-elliptique" i.e.

$$\operatorname{Re} \sum_{|\alpha|, |\beta|=m} a_{\alpha\beta}(x) \xi^{\alpha+\beta} \geq C |\xi|^{2m} \quad (C>0, \xi \in \mathbb{R}^n, x \in \Omega)$$

alors la forme $a(u,v) + \lambda(u,v)$ est $H_0^m(\Omega)$ elliptique pour λ assez grand (inégalité de Gårding).

(ii) La question ii) pose un problème de même nature que la question i); une réponse partielle est donc fournie par la proposition 7.1.

(iii) Voici un critère très simple qui permet d'affirmer que $\chi(A; B_1, \dots, B_m) = 0$

Proposition 7.2 : On suppose que $D(A_2) = C(D(A_2'))^{(1)}$ alors $\chi(A, B_1, \dots, B_m) = 0$

Démonstration : A' est l'adjoint formel de A ; on note $\overline{A'}$ l'opérateur A' où l'on a remplacé les coefficients par leurs conjugués

(1) $C(D(A_2'))$ désigne l'ensemble des conjugués complexes des fonctions de $D(A_2')^2$.

complexes. De même on note $\overline{B_j'}$ les opérateurs B_j' où l'on a remplacé les coefficients par leurs conjugués complexes.

Soit $\overline{A_2'}$ la réalisation de $\overline{A'}$ dans $L_2(\Omega)$ sous les conditions aux limites $\overline{B_j'}u = 0$, $j=1,2,\dots,m$; il est facile de voir que $D(\overline{A_2'}) = C(D(A_2'))$ et par conséquent, on a $D(A_2) = D(\overline{A_2'})$. Comme $A - \overline{A'}$ est un opérateur d'ordre $\leq 2m-1$, $A_2 - \overline{A_2'}$ est un opérateur compact de $D(A_2)$ dans $L_2(\Omega)$; on en déduit

$$\chi(A_2) = \chi(\overline{A_2'})$$

Il est facile de voir que $\chi(\overline{A_2'}) = \chi(A_2')$ et par conséquent on a :

$$\chi(A_2) = \chi(A_2')$$

mais comme $A_2' = A_2^*$, on a $\chi(A_2) = -\chi(A_2')$

d'où $\chi(A_2) = 0$

C.Q.F.D.

Remarque 7.4 : Comme $D(A_2)$ ne dépend que de $2m$ et des conditions aux limites, la condition $D(A_2) = C(D(A_2'))$ ne dépend que des conditions aux limites et pas de A . En particulier dans le cas du problème de Dirichlet on a

$$D(A_2) = C(D(A_2')) = H^{2m}(\Omega) \cap \overset{\circ}{H}^m(\Omega)$$

et l'indice du problème de Dirichlet est nul quel que soit l'opérateur A ; l'unicité du problème de Dirichlet pour A ($\dim N = \{0\}$)

implique qu'il y a unicité pour le problème de Dirichlet pour A' ($\dim N' = \{0\}$), donc aussi qu'il y a existence et unicité pour ces deux problèmes. Lorsque A est fortement elliptique, $A_p + \lambda$ est un isomorphisme de $W_p^{2m}(\Omega) \cap W_p^m(\Omega)$ sur $L_p(\Omega)$ pour λ assez grand.

Remarque 7.5 : Lorsque le problème aux limites $\{A; B_1, \dots, B_m\}$ est formellement autoadjoint, i.e. $A = A'$ et $\{B_j\}_{j=1}^m$ peut être pris comme système d'opérateurs-frontières adjoint à lui-même relativement à A , alors on a évidemment $\dim N = \dim N'$ puisque $N = N'$. C'est toujours le cas pour les problèmes considérés plus haut :

$$\{A; -\gamma_{j_1-1}, \dots, -\gamma_{j_k-1}; S_{j_{k+1}}, \dots, S_{j_m}\}$$

relatifs à un opérateur A formellement autoadjoint.

Remarque 7.6 : On sait que l'indice d'un opérateur n'est pas modifié lorsqu'on ajoute un opérateur compact; par conséquent nous ne modifions pas l'indice de la "réalisation dans L_p " de l'opérateur A , par addition d'un opérateur C d'ordre $\leq 2m-1$; en particulier $\chi(A_p + \lambda I) = \chi(A_p)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$.

VIII APPLICATION DE LA TRANSPOSITION ET DE L'INTERPOLATION.

Dans ce numéro on déduit des résultats d'existence obtenus précédemment, de nouveaux résultats d'existence pour des données (aux limites) g_j plus générales. Les raisonnements d'analyse fonctionnelle que nous ferons, utiliseront en particulier la théorie de l'interpolation dont nous rappelons pour commencer quelques résultats.

1 - L'interpolation: Nous désignerons par $\mathcal{B}$ la catégorie dont les objets sont les espaces de Banach (complexes) et les morphismes sont les applications linéaires continues.

Nous appellerons "Couple d'interpolation" un couple (A_0, A_1) d'espaces de Banach, tel qu'il existe un espace vectoriel topologique localement convexe séparé $\mathcal{A}$ avec $A_i \subset \mathcal{A}$ $i=0,1$ (algébriquement et topologiquement); on peut alors définir $A_0 \cap A_1$ et $A_0 + A_1$, et munir ces espaces des normes

$$a \rightsquigarrow \|a\|_{A_0} + \|a\|_{A_1}$$

et

$$a \rightsquigarrow \inf_{\substack{a_0 \in A_0, a_1 \in A_1 \\ a_0 + a_1 = a}} \{ \|a_0\|_{A_0} + \|a_1\|_{A_1} \}$$

respectivement : $A_0 \cap A_1$ et $A_0 + A_1$ sont deux espaces de Banach.

Soit $\mathcal{C}$ la catégorie dont les objets sont les couples d'interpolation et dont les morphismes sont définis ainsi : soient (A_0, A_1) et (B_0, B_1) deux couples d'interpolation, on appelle morphisme de (A_0, A_1) dans (B_0, B_1) , une $u \in \text{Hom}(A_0 + A_1; B_0 + B_1)$ telle que la restriction de u à A_i soit linéaire continue de A_i dans B_i , $i=0,1$. Par restriction à $A_0 \cap A_1$, u définit une application linéaire continue de $A_0 \cap A_1$ dans $B_0 \cap B_1$.

$$(A_0, A_1) \rightsquigarrow A_0 \cap A_1 \quad \text{et} \quad (A_0, A_1) \rightsquigarrow A_0 + A_1$$

sont deux foncteurs covariants particuliers de la catégorie $\mathcal{C}$ dans la catégorie $\mathcal{B}$.

Une méthode d'interpolation est la donnée d'un foncteur d'interpolation covariant ϕ de la catégorie $\mathcal{C}$ dans la catégorie $\mathcal{B}$, plus fin que le foncteur $(A_0, A_1) \rightsquigarrow A_0 + A_1$ et moins fin que le foncteur $(A_0, A_1) \rightsquigarrow A_0 \cap A_1$.

Exemples :

1) Pour tout σ avec $0 < \sigma < 1$ et tout p avec $1 < p < \infty$,

il existe un "foncteur d'interpolation" noté $\phi_{p,\sigma}$ avec ⁽¹⁾

(1) C'est la "méthode d'interpolation réelle", habituellement notée $(A_0, A_1) \rightsquigarrow S(p, \theta; A_0, A_1) = T(p, \alpha; A_0, A_1)$ avec $\sigma = 1 - \theta$, $\alpha + 1/p = \theta$

$$\phi_{p,\sigma} (W_p^{s+1}(\Omega) , W_p^s(\Omega)) = W_p^{s+\sigma}(\Omega) \quad (8.2)$$

$$\phi_{p,\sigma} (W_p^{s+1}(\Gamma) , W_p^s(\Gamma)) = W_p^{s+\sigma}(\Gamma) \quad (8.2)'$$

pour tout s réel (de signe quelconque et tel que $s+\sigma$ ne soit pas entier, pour $p \neq 2$)

2) Pour tout couple d'entiers ℓ, m avec $0 < \ell < m$ il existe

$\phi_{\ell,m}$ tel que (2)

$$\phi_{\ell,m} (W_p^{s+m}(\Omega) , W_p^s(\Omega)) = W_p^{s+\ell}(\Omega) \quad (8.3)$$

$$\phi_{\ell,m} (W_p^{s+m}(\Gamma) , W_p^s(\Gamma)) = W_p^{s+\ell}(\Gamma) \quad (8.3)'$$

pour tout s réel (de signe quelconque) et $1 < p < \infty$.

Remarque 8.1 : Il existe bien d'autres exemples de foncteurs ϕ .

Remarque 8.2 : Une conséquence importante de l'identité (8.2) est

la propriété d'interpolation suivante : si $u \in \text{Hom}(W_p^k(\Omega); W_p^\ell(\Omega))$ et

si la restriction de u à $W_p^{k+1}(\Omega)$ est un élément de

$\text{Hom}(W_p^{k+1}(\Omega); W_p^{\ell+1}(\Omega))$ alors la restriction de u à $W_p^{k+\sigma}(\Omega)$ est

un élément de $\text{Hom}(W_p^{k+\sigma}(\Omega); W_p^{\ell+\sigma}(\Omega))$ pour tout $\sigma \in]0,1[$; cette

remarque réduit la démonstration de la plupart des propriétés des

espaces de Sobolev au cas où l'exposant est entier.

Considérons à présent $(B_0, B_1) \in \mathcal{C}$ et soit N un sous-espace

(2) C'est la "méthode d'interpolation complexe", habituellement notée $(A_0, A_1) \rightsquigarrow [A_0, A_1]_\theta = [A_0, A_1; \delta(\theta)]$ avec $1-\theta = \ell/m$.

vectoriel fermé de $B_0 \cap B_1$; les inclusions suivantes montrent que

$$(B_0/N, B_1/N) \in \mathcal{C} :$$

$$(B_0 \cap B_1)/N \subset B_i/N \subset (B_0 + B_1)/N \quad i=0,1 .$$

Soit Π l'application canonique de B_0+B_1 dans $(B_0+B_1)/N$, il est évident que

$$\Pi \in \text{Hom}((B_0, B_1), (B_0/N, B_1/N))$$

et par conséquent $\Pi \in \text{Hom}(\phi(B_0, B_1), \phi(B_0/N, B_1/N))$.

Comme Π applique $\phi(B_0, B_1)$ sur $\phi(B_0, B_1)/N$, on en déduit l'inclusion

$$\phi(B_0, B_1)/N \subset \phi(B_0/N, B_1/N) .$$

On va donner une condition suffisante pour qu'il y ait identité :

Proposition 8.1 : Si $(B_0, B_1) \in \mathcal{C}$ et si N est un sous-espace vectoriel de dimension finie de $B_0 \cap B_1$, on a

$$\phi(B_0, B_1)/N = \phi(B_0/N, B_1/N) \quad (8.4)$$

démonstration : On construit un inverse R à droite de Π :

soit $z_1, \dots, z_n$ une base de N et $z'_1, \dots, z'_n$ des éléments de

$$(B_0+B_1)' \text{ tels que } \langle z_i, z'_j \rangle = \delta_{i,j} \quad i, j=1, 2, \dots, n$$

(le crochet désigne la dualité entre (B_0+B_1) et $(B_0+B_1)'$) .

Pour $b' \in (B_0+B_1)/N$ nous posons

$$R b' = b - \sum_{i=1}^n \langle b, z'_i \rangle z_i$$

où b est un élément quelconque de b' . Il est évident que $R b'$ ne dépend pas du choix particulier de $b \in b'$, on peut donc choisir b dépendant continûment (non linéairement) de b' , et alors

$$R \in \text{Hom}((B_0/N, B_1/N), (B_0, B_1))$$

d'où $R \in \text{Hom}(\phi(B_0/N, B_1/N), \phi(B_0, B_1))$; comme $\Pi \circ R = 1$, ceci montre que Π applique $\phi(B_0, B_1)$ sur $\phi(B_0/N, B_1/N)$.

C.Q.F.D.

Nous utiliserons également le

Corollaire 8.1 : Si $(B_0, B_1) \in \mathcal{C}$, et si N' est un sous-espace vectoriel de dimension finie de l'antidual de $B_0 + B_1$ on a

$$\phi(\{B_0, N'\}; \{B_1, N'\}) = \{\phi(B_0, B_1); N'\} \quad (8.5)$$

Ici (comme dans les exposés précédents), on a

$$\{B_i; N'\} = \{b \in B_i; (b, z') = 0 \text{ pour tout } z' \in N'\}$$

les parenthèses désignant l'antidualité entre $B_0 + B_1$ et son antidual.

2 - Application de l'interpolation (I) :

Les notations sont les mêmes que dans les trois exposés précédents.

Théorème 8.1 : A_p est un isomorphisme de $W_p^{2m+r}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m) / N$ ⁽¹⁾
sur $\{W_p^r(\Omega); N'\}$ pour tout r réel ≥ 0 .

Démonstration : Nous avons déjà obtenu ce résultat pour r entier.

Par interpolation nous en déduisons que pour $k < r < k+1$, A_p est un isomorphisme de X/N sur $\{W_p^r(\Omega); N'\}$ avec

$$X = \phi_{p,\sigma} (W_p^{2m+k+1}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m), W_p^{2m+k}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m))$$

et $\sigma = r-k$ (nous avons utilisé la proposition 8.1 et son corollaire et l'identité (8.2)).

Il nous faut interpréter l'espace X ; l'inclusion suivante est évidente :

$$X \subset W_p^{2m+r}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m)$$

Pour montrer l'inclusion réciproque, fixons $u \in W_p^{2m+r}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m)$, alors $A_p u = f \in \{W_p^r(\Omega); N'\}$, et par conséquent, il existe $u_0 \in X$, unique à un élément de N près, tel que

$$A_p u_0 = f. \text{ Il est évident que } u - u_0 \in W_p^{2m}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m) = D(A_p)$$

et que $A_p(u - u_0) = 0$, i.e. $u - u_0 \in N$; comme on a

$$N \subset W_p^{2m+k+1}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m) \subset X, \text{ on en déduit que } u \in X \text{ et donc}$$

$$W_p^{2m+r}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m) \subset X.$$

C.Q.F.D.

(1) de manière générale on pose $W_p^{2m+r}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m) = \{u \in W_p^{2m+r}(\Omega); B_j u = 0, j=1, 2, \dots, m\}, r \geq 0$.

Le théorème 8.1 résoud un problème aux limites homogènes pour le problème aux limites non homogènes on a le résultat suivant (de régularité) :

Théorème 8.2 : Le problème

$$u \in W_p^{2m}(\Omega)$$

$$Au = f \text{ dans } \Omega$$

$$B_j u = g_j \text{ sur } \Gamma, \quad j=1,2,\dots,m$$

possède une solution pour $f \in W_p^r(\Omega)$ et $g_j \in W_p^{2m+r-m_j-1/p}(\Gamma)$

$j=1,2,\dots,m$, si et seulement si

$$(f, v) + \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} g_j \overline{C'_j v} \, d\sigma = 0 \quad (8.6)$$

pour tout $v \in N'$ (r réel > 0 ; $r-1/p$ non entier pour $p \neq 2$)

La solution est unique à un élément de N près et est dans l'es-
pace $W_p^{2m+r}(\Omega)$.

La démonstration (qui utilise le théorème 1.1) est analogue à celle du théorème 7.5.

3- Transposition : L'analogie du théorème 8.1 a lieu pour A'_p :

c'est un isomorphisme de $W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B'_j\}_{j=1}^m) / N'$ sur $\{W_{p'}^r(\Omega); N\}$.

Posons

$$W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B'_j\}_{j=1}^m; A') = \{u \in W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B'_j\}_{j=1}^m); A'u \in \overset{\circ}{W}_p^r(\Omega)\}$$

Par restriction, il est évident que A_p^r est un isomorphisme de $W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^r\}_{j=1}^m; A')/N$ sur $\{W_{p'}^r(\Omega); N\}$.

Transposons cet isomorphisme : Si L est une forme antilinéaire continue sur $W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^r\}_{j=1}^m; A')/N$, il existe $u^* \in W_p^{-r}(\Omega)/N$ unique telle que

$$\langle u^*, \overline{A' v^*} \rangle = L(v^*) \quad (8.7)$$

pour toute $v^* \in W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^r\}_{j=1}^m; A')/N$.

Pour utiliser ce résultat, il nous faut choisir L sous une forme particulière - le choix arbitraire que nous allons faire n'est justifié que par le résultat que nous obtiendrons.

Soit K un espace (de Banach pour fixer les idées) normal de distributions dans Ω tel que

$$W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^r\}_{j=1}^m; A') \subset K \subset L_{p'}(\Omega) \quad (8.8)$$

et soit H l'antidual de K , on a

$$L_p(\Omega) \subset H \subset \mathcal{D}'(\Omega) \quad (8.8)'$$

et pour $f \in H$, $v \rightsquigarrow \langle f, \bar{v} \rangle$ est une forme antilinéaire continue sur $W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^r\}_{j=1}^m; A')$.

Fixons $f \in H$ et $g_j \in W_p^{-r-mj-1/p}(\Gamma)$, $j=1, 2, \dots, m$,

$$v \rightsquigarrow \langle f, \bar{v} \rangle + \sum_{j=1}^m \langle g_j, \overline{C_j^r v} \rangle$$

est une forme antilinéaire continue sur $W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^!\}_{j=1}^m; A')$

(car $C_j^!$ est d'ordre $2m-m_j-1$, $j=1,2,\dots,m$). Elle définira par pas-

sage au quotient une forme antilinéaire continue sur $W_{p'}^{2m+r}(\Omega;$

$\{B_j^!\}_{j=1}^m; A')/N'$, si elle est identiquement nulle sur N' , i.e. si

$$\langle f, \bar{v} \rangle + \sum_{j=1}^m \langle g_j, \overline{C_j^! v} \rangle = 0 \text{ pour tout } v \in N' \quad (8.9)$$

Supposant que (8.9) a lieu, nous poserons

$$L(v^*) = \langle f, \bar{v} \rangle + \sum_{j=1}^m \langle g_j, \overline{C_j^! v} \rangle \quad (8.10)$$

où v est une fonction quelconque de la classe v^* .

Nous avons donc obtenu ceci : il existe $u \in W_p^{-r}(\Omega)$ unique, à un élément de N près, telle que

$$\langle u, A'v \rangle = \langle f, \bar{v} \rangle + \sum_{j=1}^m \langle g_j, \overline{C_j^! v} \rangle \quad (8.11)$$

pour toute $v \in W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^!\}_{j=1}^m; A')$.

Cette dernière identité appliquée à $v \in C_0^\infty(\Omega)$, montre que

$$Au = f \quad (8.12)$$

Il nous faut aussi interpréter les conditions aux limites que u satisfait, et qui sont implicitement contenues dans l'identité (8.11). Posons la

Définition 8.1 : $D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$ est l'espace des $u \in W_p^{-r}(\Omega)$ telles que

$Au \in H^{(1)}$.

(1) C'est un espace de Banach pour la norme $u \rightsquigarrow \|u\|_{-r,p} + \|Au\|_H$

La solution u que nous avons trouvée est dans $D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$,
il faut étudier les traces des fonctions de $D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$. Supposons
que K soit réflexif alors nous avons le :

Lemme 8.1 : $C^\infty(\bar{\Omega})$ est dense dans $D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$

Démonstration : On va vérifier qu'une forme antilinéaire continue
sur $D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$, qui s'annule sur $C^\infty(\bar{\Omega})$ est $\equiv 0$. Une telle
forme $u \rightsquigarrow M(u)$ peut s'écrire

$$M(u) = \langle g, \bar{A}u \rangle + \langle h, \bar{u} \rangle$$

avec $g \in K$ et $h \in W_{p'}^{or}(\Omega)$ (nous avons utilisé ici la réflexi-
vité de K). Grâce à nos hypothèses sur A , il existe un ouvert
 $\mathcal{O}$ "très régulier" (exp. I) voisinage de $\bar{\Omega}$, tel qu'il existe un
prolongement $\mathcal{A}$ de A à $\bar{\mathcal{O}}$, qui soit encore elliptique d'ordre
 $2m$ à coefficients $C^\infty(\bar{\mathcal{O}})$. Soit $U \in C^\infty(\bar{\mathcal{O}})$, alors on a $u =$
 $= U/\bar{\Omega} \in C^\infty(\bar{\Omega})$ et $M(u) = 0$.

Si l'on désigne par $\tilde{g}$ (resp^t $\tilde{h}$) le prolongement de g
(resp^t h) par 0 dans $\mathcal{O} - \Omega$, on a $\tilde{g} \in L_p(\mathcal{O})$ et $\tilde{h} \in W_{p'}^{or}(\mathcal{O})$, et

$$M(u) = \langle \tilde{g}, \bar{\mathcal{A}}U \rangle_{\mathcal{O}} + \langle \tilde{h}, \bar{U} \rangle_{\mathcal{O}}$$

$$\text{d'où} \quad (\tilde{g}, \bar{\mathcal{A}}U)_{\mathcal{O}} + (\tilde{h}, \bar{U})_{\mathcal{O}} = 0 \quad (8.14)$$

pour toute $U \in C^\infty(\bar{\mathcal{O}})$.

L'application de (8.14) à $U \in C_0^\infty(\mathcal{O})$ montre que $\mathcal{A}'\tilde{g} = -\tilde{h}$ dans $\mathcal{O}$. Nous allons vérifier qu'il existe $w \in W_{p'}^{2m+r}(\mathcal{O}) \cap W_{p'}^m(\mathcal{O})$ telle que $\mathcal{A}'w = -\tilde{h}$; on cherche par exemple $w \in W_{p'}^{2m+r}(\mathcal{O}; \{\gamma_{j-1}\}_{j=1}^m)$ telle que $\mathcal{A}'w = -\tilde{h}$. Pour cela nous appliquons le théorème 8.1; une telle w existe si et seulement si $\tilde{h} \in \{W_{p'}^r(\mathcal{O}); \mathcal{U}\}$ où $\mathcal{U}$ désigne l'espace des fonctions $z \in C^\infty(\bar{\mathcal{O}})$ telles que $\mathcal{A}z = 0$ et $\gamma_{j-1}z = 0$, $j=1,2,\dots,m$; nous allons vérifier que cette condition est remplie: soit $\theta \in C_0^\infty(\mathcal{O})$, une fonction $\equiv 1$ sur $\bar{\Omega}$, on a pour $z \in \mathcal{U}(\tilde{h}, z)_\mathcal{O} = (\theta\tilde{h}, z)_\mathcal{O} = (\tilde{h}, \theta z)_\mathcal{O} = -(\mathcal{A}'\tilde{g}, \theta z)_\mathcal{O}$ et comme $\theta z \in C_0^\infty(\mathcal{O})$ on a

$$(\tilde{h}, z)_\mathcal{O} = -(\tilde{g}, \mathcal{A}(\theta z))_\mathcal{O} = 0$$

car $\mathcal{A}(\theta z) = \mathcal{A}z = 0$ dans $\bar{\Omega}$ qui est le support de $\tilde{g}$.

L'existence de w est donc prouvée.

Considérons $w - \tilde{g}$, nous avons

$$\begin{cases} w - \tilde{g} \in L_{p'}(\mathcal{O}) \\ \mathcal{A}'(w - \tilde{g}) = 0 \end{cases}$$

De l'hypoellipticité de $\mathcal{A}'$, il résulte que

$$w - \tilde{g} \in C^\infty(\mathcal{O})$$

et par conséquent, puisque $w \in W_{p'}^{2m+r}(\emptyset)$ et puisque $\tilde{g}$ est nulle

hors de $\bar{\Omega}$ nous avons $\tilde{g} \in W_{p'}^{2m+r}(\emptyset)$ d'où $g \in W_{p'}^{2m+r}(\Omega)^{(1)}$

$$A'g = -h \quad (8.15)$$

Nous allons calculer $\langle g, \bar{Au} \rangle_{\Omega}$ pour $u \in D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$: il

existe une suite $\{g_k\}_{k=1,2,\dots} \subset C_0^{\infty}(\Omega)$ telle que $g_k \rightarrow g$

dans $W_{p'}^{2m+r}(\Omega)$ pour $k \rightarrow +\infty$, on a donc $\langle g, \bar{Au} \rangle_{\Omega} =$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_k, \bar{Au} \rangle_{\Omega} = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle A'g_k, \bar{u} \rangle_{\Omega} = \langle A'g, \bar{u} \rangle_{\Omega} \text{ car } u \in W_p^{-r}(\Omega)$$

et $A'g_k \rightarrow A'g$ dans $W_{p'}^r(\Omega)$ pour $k \rightarrow \infty$.

On peut donc écrire

$$M(u) = \langle A'g, \bar{u} \rangle_{\Omega} + \langle h, \bar{u} \rangle_{\Omega} = 0$$

pour toute $u \in D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$, i.e. $M \equiv 0$. C.Q.F.D.

Lemme 8.2 : Pour $r \geq 0$ ($r+1/p$ non entier pour $p \neq 2$) il

existe une application linéaire continue:

$$\psi = \{\psi_j\}_{j=1}^m \rightsquigarrow v$$

de $\prod_{j=1}^m W_{p'}^{r+m_j+1/p}(\Gamma)$ dans $W_{p'}^{r+2m}(\Omega; \{B'_j\}_{j=1}^m; A')$, telle que

$$C'_j v = \psi_j, \quad j=1,2,\dots,m.$$

(1) Il est évident que $g \in W_{p'}^{2m+r}(\Omega)$; il faut encore vérifier que $\gamma_{j-1}g|_{\Gamma} = 0$ pour $j \leq [2m+r-1/p]$. (cf. Théorème 1.1) :

Soit $\tau_{\varepsilon} \tilde{g}$ la fonction obtenue en translatant $\tilde{g}$ suivant la normale à Γ en x ($x \in \Gamma$), dans un voisinage de x (ceci est possible, vu la régularité de Γ); il est facile de voir que $\gamma_j(\tau_{\varepsilon} \tilde{g})|_{\Gamma} = 0$, d'où le résultat.

Démonstration : Les conditions $A'v \in \overset{\circ}{W}_{p'}^r(\Omega)$ et $\gamma_k A'v = 0$

$k=0,1,\dots, [r-1/p']_-$ sont équivalentes. Le système d'opérateurs-

frontières $\{B'_j\}_{j=1}^m \cup \{C'_j\}_{j=1}^m \cup \{\gamma_k A'\}_{k=0}^{[r-1/p']_-}$ est un système

de Dirichlet d'ordre $2m+[r+1-1/p']_-$; le lemme 8.2 résulte du

théorème 4.1d).

Théorème 8.3 : Pour $r \geq 0$ (et $r+1/p$ non entier lorsque $p \neq 2$)

l'application $u \rightsquigarrow \{B_j u\}_{j=1}^m$ qui est définie pour $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$,

se prolonge en une application linéaire continue, encore notée

$u \rightsquigarrow \{B_j u\}_{j=1}^m$ de $D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$ dans $\prod_{j=1}^m W_p^{-r-mj-1/p}(\Gamma)$. De plus

pour $u \in D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$ et $v \in W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B'_j\}_{j=1}^m; A')$ on a la

"formule de Green"

$$\langle Au, \bar{v} \rangle_\Omega - \langle u, \overline{A'v} \rangle_\Omega = - \sum_{j=1}^m \langle B_j u, \overline{C'_j v} \rangle_\Gamma.$$

Démonstration : Soit $\psi \rightsquigarrow v$ l'application construite au lemme

8.2, on note

$$\chi(u, \psi) = \langle Au, \bar{v} \rangle_\Omega - \langle u, \overline{A'v} \rangle_\Omega$$

C'est une forme sesquilinéaire continue sur

$$D_{A,H}^{-r,p}(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_{p'}^{r+mj+1/p}(\Gamma)$$

car on a les majorations suivantes :

$$|\chi(u, \psi)| \leq \|Au\|_H \|v\|_K + \|u\|_{-r,p} \|A'v\|_{r,p},$$

$$\leq C \|u\|_{D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)} \times \|\psi\|_{\prod_{j=1}^m W_{p'}^{r+mj+1/p}(\Gamma)}$$

On en déduit l'existence d'une application linéaire continue

$$u \rightsquigarrow \{\phi_j\}_{j=1}^m \text{ de } D_{A,H}^{-r,p}(\Omega) \text{ dans } \prod_{j=1}^m W_p^{-r-mj-1/p}(\Gamma)$$

telle que $\chi(u, \psi) = \sum_{j=1}^m \langle \phi_j, \bar{\psi}_j \rangle_\Gamma$ pour tout ψ .

Lorsque $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$ on a

$$(Au, v)_\Omega - (u, A'v)_\Omega = - \sum_{j=1}^m \int_\Gamma B_j u \overline{C'_j v} \, d\sigma$$

pour $v \in W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B'_j\}_{j=1}^m; A')$ et par conséquent on a

$$\sum_{j=1}^m \langle \phi_j, \bar{\psi}_j \rangle_\Gamma = - \sum_{j=1}^m \langle B_j u, \bar{\psi}_j \rangle_\Gamma$$

d'où $\phi_j = B_j u$ pour $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$. Comme $C^\infty(\bar{\Omega})$ est dense dans

$D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$, et comme $u \rightsquigarrow \{\phi_j\}_{j=1}^m$ est continue de $D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$

dans $\prod_{j=1}^m W_p^{-r-mj-1/p}(\Gamma)$, la première partie du théorème est dé-

montrée. Pour démontrer la formule de Green il suffit d'effectuer

un prolongement par continuité.

A présent nous pouvons achever d'interpréter (8;11) :

Comme $u \in D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)$, nous avons :

$$\langle u, \overline{A'v} \rangle_\Omega - \langle f, \bar{v} \rangle_\Omega = \sum_{j=1}^m \langle g_j, \overline{C'_j v} \rangle_\Gamma = \sum_{j=1}^m \langle B_j u, \overline{C'_j v} \rangle_\Gamma$$

pour toute $v \in W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^!\}_{j=1}^m; A')$, donc (grâce au lemme 8.2, qui montre que $\{C_j^!v\}_{j=1}^m$ parcourt $\prod_{j=1}^m W_{p'}^{r+m_j+1/p}(\Gamma)$ lorsque v parcourt $W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^!\}_{j=1}^m; A')$) nous avons $B_j u = g_j$, $j=1, 2, \dots, m$.

Pour énoncer le résultat obtenu, nous désignons par N' le sous-espace (de dimension finie égale à celle de N') de l'antidual de $H \times (\mathcal{D}'(\Gamma))^m$, formé des formes linéaires $(f; \{g_j\}_{j=1}^m) \rightsquigarrow \langle f, \bar{v} \rangle_\Omega + \sum_{j=1}^m \langle g_j, \overline{C_j^!v} \rangle_\Gamma$ avec $v \in N'$.

Théorème 8.4 : Si K est un espace (de Banach) réflexif et normal de distributions dans Ω , tel que

$$W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j^!\}_{j=1}^m; A') \subset K \subset L_{p'}(\Omega)$$

et d'antidual noté H , pour $r > 0$ ($r+1/p$ non entier si $p \neq 2$)

$\{A; B_1, \dots, B_m\}$ est un isomorphisme de $D_{A,H}^{-r,p}(\Omega)/N$ sur $\{H \times \prod_{j=1}^m W_p^{-r-m_j-1/p}(\Gamma); N'\}$.

Remarque 8.3 : Comme Γ est compact, les distributions sur Γ sont toutes d'ordre fini et $\mathcal{D}'(\Gamma) = \bigcup_{s < 0} W_p^s(\Gamma)$ et le théorème 8.4 permet de résoudre le problème aux limites avec données aux limites g_j dans $\mathcal{D}'(\Gamma)$.

Dans la suite nous fixerons un choix explicite de l'espace K :

1°) En général on peut évidemment prendre $K = L_p(\Omega)$ d'où

$H = L_p(\Omega)$; nous posons par définition

$$D_A^{-r,p}(\Omega) = D_{A,H}^{-r,p}(\Omega) = \left\{ u \in W_p^{-r}(\Omega) ; Au \in L_p(\Omega) \right\}$$

2°) Dans le cas du problème de Dirichlet ($B_j = \gamma_{j-1}, j=1,2,\dots,m$)

on peut prendre $K = W_p^m(\Omega)$ car, on a

$$W_{p'}^{2m+r}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m) = W_{p'}^{2m+r}(\Omega) \cap W_p^m(\Omega) .$$

Nous posons par définition (puisque $H = W_p^{-m}(\Omega)$)

$$W_A^{-r,p}(\Omega) = D_{A,H}^{-r,p}(\Omega) = \left\{ u \in W_p^{-r}(\Omega) ; Au \in W_p^{-m}(\Omega) \right\}$$

Nous allons détailler les conséquences du théorème 8.4 dans ces deux cas.

Remarque 8.4 : Bien d'autres choix de K sont possibles, selon

les conditions aux limites considérées; dans le cas général on

peut prendre $K = W_{p'}^{1/p'}(\Omega)$ ou encore $L_q(\Omega)$, q étant choisi tel

que l'inclusion $W_{p'}^{2m+r}(\Omega) \subset L_q(\Omega)^{(1)}$; dans le cas particulier du

problème de Dirichlet on peut encore prendre $K = W_{p'}^{m+1/p'}(\Omega)$.

On ignore quel est le choix optimum (c.à.d. K le plus petit possible)

4 - Application de l'interpolation (II)

A présent, remarquant que $W_p^{2m}(\Omega) = D_A^{2m,p}(\Omega)$, nous savons

(1) L'exposant q est fourni par le théorème de Sobolev.

que $\{A; B_1, \dots, B_m\}$ est un isomorphisme de

$$D_A^{0,p}(\Omega)/N \text{ sur } \{L_p(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{-mj-1/p}(\Gamma); \mathcal{H}'\} \text{ et de}$$

$$D_A^{2m,p}(\Omega)/N \text{ sur } \{L_p(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{2m-mj-1/p}(\Gamma); \mathcal{H}'\} .$$

Par interpolation nous en déduisons des résultats intermédiaires :

$\{A; B_1, \dots, B_m\}$ est un isomorphisme de X/N sur

$$\{L_p(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{k-mj-1/p}(\Gamma); \mathcal{H}'\} \text{ avec } X = \Phi_{k,2m}(D_A^{2m,p}(\Omega), D_A^{0,p}(\Omega))$$

(k entier, $0 < k < 2m$) .

De l'inclusion évidente $X \subset D_A^{k,p}(\Omega)$ résulte le

Théorème 8.5 : Pour k entier, $0 \leq k < 2m$ et

$$(f; \{g_j\}_{j=1}^m) \in \{L_p(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{k-mj-1/p}(\Gamma); \mathcal{H}'\} \text{ il existe } u \in D_A^{k,p}(\Omega)$$

unique à un élément de N près, telle que $Au = f$, et $B_j u = g_j$,

$j=1, 2, \dots, m$.

Pour compléter ce résultat nous allons montrer que $X = D_A^{k,p}(\Omega)$.

a) supposons pour commencer que $k \geq m$. Pour $u \in D_A^{k,p}(\Omega)$ on a

$$Au = f \in L_p(\Omega) , h_j = \gamma_{j-1} u \in W_p^{k-j+1-1/p}(\Gamma) , j=1, 2, \dots, m \text{ et}$$

$$(f, v) + \sum_{j=1}^m \langle h_j, \overline{T_j v} \rangle = 0 \text{ pour toute } v \in \mathcal{U}' = \{v \in C^\infty(\overline{\Omega}) ;$$

$$A'v = 0 , \gamma_{j-1} v = 0 , j=1, 2, \dots, m\} .$$

Soit alors $u_0 \in X$, une solution du problème $Au_0 = f$,

$\gamma_{j-1} u_0 = h_j$, $j=1,2,\dots,m$ (voir ci-dessus); on a

$u - u_0 \in D_A^{k,p}(\Omega) \subset D_A^{0,p}(\Omega)$ et $A(u-u_0) = 0, \gamma_{j-1}(u-u_0) = 0$,

$j=1,2,\dots,m$, donc (théorème 8.4), on a

$u - u_0 \in \mathcal{U} = \{v \in C^\infty(\bar{\Omega}); Av = 0, \gamma_{j-1}v = 0, j=1,2,\dots,m\}$

en résumé nous avons $u = u_0 + (u-u_0) \in X + \mathcal{U} \subset X$ d'où

$D_A^{k,p}(\Omega) \subset X$.

b) Considérons à présent le cas où $k < m$. Pour $u \in D_A^{k,p}(\Omega)$

nous avons $\phi_j = \gamma_{j-1}u \in W_p^{k-j+1-1/p}(\Gamma)$, $j=1,2,\dots,k$. $\mathcal{U}$ et $\mathcal{U}'$

ayant la même signification qu'au point a), nous introduisons

une base $v_1, \dots, v_v$ de $\mathcal{U}'$ telle que $(v_i, v_j) = \delta_{i,j}$ et nous

posons

$$g = - \sum_{i=1}^v \left(\sum_{j=1}^k \int_{\Gamma} \phi_j \overline{T_j v_i} d\sigma \right) v_i$$

alors $g \in L_p(\Omega)$ et $(g, v) = - \sum_{j=1}^k \int_{\Gamma} \phi_j \overline{T_j v} d\sigma$ pour toute

$v \in \mathcal{U}'$. Posons $\phi_j = 0$ pour $j=k+1, \dots, m$, nous avons alors

$g \in L_p(\Omega)$, $\phi_j \in W_p^{k-j+1-1/p}(\Gamma)$, $j=1,2,\dots,m$ et

$$(g, v) + \sum_{j=1}^m \int_{\Gamma} \phi_j \overline{T_j v} d\sigma = 0$$

pour toute $v \in \mathcal{U}'$, et par conséquent il existe $u_0 \in X$ telle

que $Au_0 = g$ et $\gamma_{j-1}u_0 = \phi_j$, $j=1,2,\dots,m$.

Pour $v = u - u_0$ nous avons $v \in D_A^{k,p}(\Omega) \cap W_p^{0,k}(\Omega)$; posons

$\tau_j = \gamma_{j-1} v$, $j=k+1, \dots, m$; a priori nous savons seulement que

$\tau_j \in W_p^{-j+1-1/p}(\Gamma)$, $j=k+1, \dots, m$, et nous allons montrer que

$\tau_j \in W_p^{k-j+1-1/p}(\Gamma)$. Pour cela nous utiliserons un lemme de démonstration analogue à celle du lemme 8.2 :

Lemme 8.3 : Il existe une application linéaire continue

$$\Psi = \{\psi_j\}_{j=1}^m \rightsquigarrow w \text{ de } \prod_{j=k+1}^m W_{p'}^{-k+j-1/p'}(\Gamma) \text{ dans } W_p^{2m-k}(\Omega) \cap \cap W_p^m(\Omega), \text{ telle que } T_j w = \psi_j, j=k+1, \dots, m.$$

Posons alors $\chi(v, \Psi) = \langle Av, \bar{w} \rangle - \langle v, \bar{A}' w \rangle$; c'est une forme

sesquilinéaire continue sur

$$\{D_A^{k,p}(\Omega) \cap W_p^k(\Omega)\} \times \prod_{j=k+1}^m W_{p'}^{j-k-1/p'}(\Gamma)$$

qui peut donc s'écrire $\chi(v, \Psi) = \sum_{j=k+1}^m \langle \sigma_j, \bar{\psi}_j \rangle$

avec $\sigma_j \in W_p^{k-j+1-1/p}(\Gamma)$, $j=k+1, \dots, m$.

Il est facile de vérifier que $\chi(v, \Psi)$ ne dépend pas du choix particulier de l'application $\Psi \rightsquigarrow w$ dans le lemme 8.3 ; pour $\Psi \in (C^\infty(\Gamma))^{m-k}$, on peut supposer que $w \in C^\infty(\bar{\Omega})$, et par conséquent on a

$$\chi(v, \Psi) = - \sum_{j=k+1}^m \langle \gamma_{j-1} v, \bar{\psi}_j \rangle$$

$$\text{d'où } \sum_{j=k+1}^m \langle \sigma_j, \bar{\psi}_j \rangle = - \sum_{j=k+1}^m \langle \gamma_{j-1} v, \bar{\psi}_j \rangle$$

pour toute $\Psi \in (C^\infty(\Gamma))^{m-k}$, i.e. $\gamma_{j-1} v = -\sigma_j$. Nous avons donc

montré que $\gamma_{j-1} v \in W_p^{k-j+1-1/p}(\Gamma)$, $j=k+1, \dots, m$ et $\gamma_{j-1} u \in$

$$\in W_p^{k-j+1-1/p(\Gamma)}, j=1,2,\dots,m.$$

Il est évident que

$$(Au, v) + \sum_{j=1}^m \langle \gamma_{j-1} u, \overline{T_j v} \rangle = 0$$

pour toute $v \in \mathcal{U}'$, donc il existe $u_1 \in X$ telle que $Au_1 = Au$ et $\gamma_{j-1} u_1 = \gamma_{j-1} u$, $j=1,2,\dots,m$ et il est facile de voir comme au point a) que $u - u_1 \in \mathcal{U} \subset X$, d'où $u \in X$, ce qui prouve l'inclusion $D_A^{k,p}(\Omega) \subset X$ et le :

Théorème 8.5' : Pour k entier avec $0 \leq k \leq 2m$, $\{A; B_1, \dots, B_m\}$ est un isomorphisme de

$$D_A^{k,p}(\Omega)/_N \text{ sur } \{L_p(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{k-mj-1/p(\Gamma)}; \mathcal{N}'\}$$

Remarque 8.5 : Une nouvelle application de l'interpolation (utilisant cette fois le foncteur $\phi_{p,\sigma}$ pour interpoler entre $D_A^{k+1,p}(\Omega)$ et $D_A^{k,p}(\Omega)$) permettrait d'obtenir le résultat analogue pour $D_A^{s,p}(\Omega)$ avec s réel, $0 \leq s \leq 2m$ ($s-1/p$ non entier pour $p \neq 2$) : $\{A; B_1, \dots, B_m\}$ est un isomorphisme de

$$D_A^{s,p}(\Omega)/_N \text{ sur } \{L_p(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{s-mj-1/p(\Gamma)}; \mathcal{N}'\}.$$

5 - Résultats particuliers au problème de Dirichlet.

Dans toute la suite, le système d'opérateurs-frontières considéré est $\{\gamma_{j-1}\}_{j=1}^m$.

Théorème 8.6 : A est un isomorphisme de $\overset{o}{W}_p^m(\Omega)/N$ sur $\{W_p^{-m}(\Omega); N'\}$.

Remarque 8.6 : On peut observer que A considéré comme opérateur non borné dans $W_p^{-m}(\Omega)$ de domaine $\overset{o}{W}_p^m(\Omega)$, a pour indice $\dim N - \dim N' = 0$ grâce à la proposition 7.2.

Démonstration : Nous démontrons pour commencer la surjectivité :

Soit $f \in W_p^{-m}(\Omega)$, telle que $(f, v) = 0$ pour toute $v \in N'$, il faut trouver $u \in \overset{o}{W}_p^m(\Omega)$ telle que $Au = f$.

Considérons un ouvert Θ "très régulier", voisinage de $\bar{\Omega}$ tel qu'il existe un prolongement $\mathcal{A}$ de A à $\bar{\Theta}$, qui soit encore elliptique d'ordre $2m$, à coefficients $C^\infty(\bar{\Theta})$. Soit $F \in W_p^{-m}(\Theta)$ une distribution telle que $F|_\Omega = f^{(1)}$; posons $\mathcal{U}' = \{v \in C^\infty(\bar{\Theta}) ; \mathcal{A}'v = 0, \gamma_{j-1}v = 0, j=1, 2, \dots, m \text{ sur } \partial\Theta\}$ et soit $v_1, \dots, v_\nu$ une base de $\mathcal{U}'$ telle que $(v_i, v_j) = \delta_{i,j}$. F n'est pas orthogonale à $\mathcal{U}'$, on la remplace par

$$F + G = F - \sum_{i=1}^{\nu} (F, v_i) v_i$$

alors $G \in C^\infty(\bar{\Theta})$ et $F + G \in \{W_p^{-m}(\Theta); \mathcal{U}'\}$. Le théorème 8.4 appliqué avec $K = \overset{o}{W}_p^m(\Theta)$ montre qu'il existe $U \in W_{A, p}^{0, p}(\Theta)$ telle que

(1) On peut construire F en écrivant $f = \sum_{|\beta| < m} D^\beta f_\beta$ avec $f_\beta \in L_p(\Omega)$ et en posant $F = \sum_{|\beta| < m} D^\beta \tilde{f}_\beta$, $\tilde{f}_\beta$ désignant le prolongement de f_β par zéro dans $\Theta - \Omega$.

$$\begin{cases} A U = F + G & \text{dans } \Theta \\ \gamma_{j-1} U = 0 \quad j=1,2,\dots,m & \text{sur } \partial\Theta. \end{cases}$$

Nous admettrons provisoirement le (1)

Lemme 8.4 : Si $U \in L_p(\Theta)$ et $AU \in W_p^{-m}(\Theta)$ alors U est locale-
ment dans $W_p^m(\Theta)$ (2)

Posons $u_0 = U|_{\Omega}$, $g = G|_{\Omega}$, alors $u_0 \in W_p^m(\Omega)$, $g \in C^\infty(\bar{\Omega})$

et nous avons $Au_0 = f + g$ dans Ω . Si $\phi_j = \gamma_{j-1} u_0$, $j=1,2,\dots,m$,

il nous faut encore trouver $u_1 \in W_p^m(\Omega)$ solution de $Au_1 = -g$,

$\gamma_{j-1} u_1 = -\phi_j$, $j=1,2,\dots,m$. On vérifie aisément que

$$(-g, \{-\phi_j\}_{j=1}^m) \in \{C^\infty(\bar{\Omega}) \times \prod_{j=1}^m W_p^{m-j+1-1/p}(\Gamma); \mathcal{N}'\}$$

$$\begin{aligned} \text{car } \langle g, \bar{v} \rangle + \sum_{j=1}^m \langle \phi_j, \overline{T_j v} \rangle \\ = \langle f+g, \bar{v} \rangle + \sum_{j=1}^m \langle \phi_j, \overline{T_j v} \rangle \\ = \langle Au_0, \bar{v} \rangle + \sum_{j=1}^m \langle \gamma_{j-1} u_0, \overline{T_j v} \rangle = 0 \end{aligned}$$

pour tout $v \in N'$.

Nous utiliserons un résultat intermédiaire entre les deux théorèmes d'existence suivants que nous avons déjà établis :

$$\{A; \gamma_0, \dots, \gamma_{m-1}\} \text{ est un isomorphisme de } W_p^{2m}(\Omega)/N \text{ sur}$$

$$\{L_p(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{2m-j+1-1/p}(\Gamma); \mathcal{N}'\} \text{ et de}$$

(1) Ce lemme est un résultat de régularité à l'intérieur classique lorsque $p = 2$.

(2) i.e. $\theta U \in W_p^m(\Theta)$ pour toute $\theta \in C_0^\infty(\Theta)$.

$$W_A^{0,p}(\Omega)/N \quad \text{sur} \quad \{W_p^{-m}(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{-j+1-1/p}(\Gamma); \mathcal{N}'\}$$

donc aussi de X/N sur

$$\{\phi_{m,2m}(L_p(\Omega); W_p^{-m}(\Omega)) \times \prod_{j=1}^m W_p^{m-j+1-1/p}(\Gamma); \mathcal{N}'\}$$

avec

$$X = \phi_{m,2m}(W_p^{2m}(\Omega); W_A^{0,p}(\Omega)) \subset W_p^m(\Omega) .$$

On en déduit que u_1 existe; $u = u_0 + u_1$ est une solution du pro-

blème $u \in \overset{\circ}{W}_p^m(\Omega)$, $Au = f$.

Pour achever de démontrer le théorème, il faut montrer que le noyau

de A comme opérateur de $\overset{\circ}{W}_p^m(\Omega)$ dans $W_p^{-m}(\Omega)$ est N : en effet

pour $u \in \overset{\circ}{W}_p^m(\Omega)$, telle que $Au = 0$, on a $u \in W_A^{0,p}(\Omega)$, $Au = 0$,

$\gamma_{j-1}u = 0$, $j=1,2,\dots,m$ i.e. $u \in N$ (cf. Théorème 8.4 avec $K =$

$= \overset{\circ}{W}_p^m(\Omega)$).

C.Q.F.D.

Nous savons à présent que $\{A; \gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{m-1}\}$ est un isomorphisme de

$$W_p^m(\Omega)/N = W_A^{m,p}(\Omega)/N \quad \text{sur} \quad \{W_p^{-m}(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{m-j+1-1/p}(\Gamma); \mathcal{N}'\}$$

et de

$$W_A^{m,p}(\Omega)/N \quad \text{sur} \quad \{W_p^{-m}(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{m-j+1-1/p}(\Gamma); \mathcal{N}'\} .$$

Utilisant l'interpolation, on peut en déduire à l'aide de raisonnements analogues à ceux développés dans le § précédent, le résultat suivant :

Théorème 8.7. : Pour $-m \leq s \leq m$ ($s-1/p$ non entier lorsque $p \neq 2$),

$\{A; \gamma_0, \dots, \gamma_{m-1}\}$ est un isomorphisme de

$$W_A^{s,p}(\Omega)/N \quad \text{sur} \quad \{W_p^{-m}(\Omega) \times \prod_{j=1}^m W_p^{s-j+1-1/p}(\Gamma); \mathcal{N}'\}.$$

Pour terminer nous démontrons le lemme 8.4 :

Soit donc $U \in L_p(\Theta)$ telle que $\mathcal{A}U = F \in W_p^{-m}(\Theta)$.

On va montrer qu'il existe $V \in W_p^m(\Theta)$ telle que

$$\mathcal{A}(U-V) \in C^\infty(\bar{\Theta})$$

d'où $U-V \in C^\infty(\Theta)$ par l'hypoellipticité de $\mathcal{A}$, ce qui montrera

que U est localement dans $W_p^m(\Theta)$.

On peut écrire $F = \sum_{|\beta| \leq m} D^\beta f_\beta$ avec $f_\beta \in L_p(\Theta)$.

Soit $v_1, \dots, v_v$ la base orthonormée de $\mathcal{U}'$ introduite précédemment;

alors $g_\beta = f_\beta - \sum_{i=1}^v (f_\beta, v_i) v_i \in \{L_p(\Theta); \mathcal{U}'\}$

par conséquent (voir exposé VII) il existe $z_\beta \in W_p^{2m}(\Theta)$ (non uni-

que) telle que

$$\begin{cases} \mathcal{A}z_\beta = g_\beta & \text{dans } \Theta \\ \gamma_{j-1} z_\beta = 0 & \text{sur } \partial\Theta \quad j=1, \dots, m \end{cases}$$

Considérons la fonction $Z_0 = \sum_{|\beta| \leq m} D^\beta z_\beta \in W_p^m(\Theta)$. On a

évidemment :

$$\mathcal{A}U - \mathcal{A}Z_0 = F - \mathcal{A}Z_0 = \sum_{|\beta| \leq m} (D^\beta f_\beta - \mathcal{A}D^\beta z_\beta) =$$

$$= \sum_{|\beta| \leq m} (D^\beta \mathcal{A} z_\beta - \mathcal{A} D^\beta z_\beta) = F_1 \in W_p^{-m+1}(\theta)$$

car $z_\beta \in W_p^{2m}(\theta)$. Recommencant le raisonnement précédent avec F

remplacée par F_1 , on construit $Z_1 \in W_p^{m+1}(\theta)$ avec

$F_1 - \mathcal{A}Z_1 \in W_p^{-m+2}(\theta)$, i.e. $\mathcal{A}U - \mathcal{A}(Z_0 + Z_1) \in W_p^{-m+2}(\theta)$, et ainsi

de suite. On obtient à la fin $\mathcal{A}U - \mathcal{A}Z \in L_p(\theta)$ avec

$$Z = Z_0 + Z_1 + \dots Z_{m-1} \in W_p^m(\theta).$$

Considérons maintenant une solution Z_m du problème

$$\begin{cases} Z_m \in W_p^{2m}(\theta) \\ \mathcal{A}Z_m = \mathcal{A}(U-Z) + \sum_{i=1}^v (\mathcal{A}(U-Z), v_i) v_i \quad \text{dans } \theta \\ \gamma_{j-1} Z_m = 0 \quad j=1, 2, \dots, m \quad \text{sur } \partial\theta \end{cases}$$

alors $V = Z + Z_m \in W_p^m(\theta)$ et répond à la question.

IX - QUELQUES ELEMENTS DE THEORIE SPECTRALE

1 - Nous noterons $\rho(A_p)$ la résolvante de A_p , c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes λ , tels que

$$(-A_p + \lambda I)^{-1} = R(\lambda; A_p)$$

existe et soit linéaire continu dans $L_p(\Omega)$; $\sigma(A_p)$ désigne le spectre de A_p , c'est le complémentaire de $\rho(A_p)$.

Commençons par quelques remarques presque évidentes :

$\rho(A_p)$ est l'ensemble des nombres complexes λ tels que

$$N(-A_p + \lambda I) = \{0\}$$

et $R(-A_p + \lambda I) = L_p(\Omega)$ i.e.

$$N(-A'_p + \bar{\lambda} I) = \{0\}$$

$\rho(A_p)$ ne dépend donc pas de p , ce qui réduit son étude à celle de $\rho(A_2)$.

Supposons $\rho(A_2) \neq \emptyset$, alors pour $\lambda_0 \in \rho(A_2)$, $R(\lambda_0, A_2)$ est un opérateur linéaire continu de $L_2(\Omega)$ dans $D(A_2) \subset H^{2m}(\Omega)$ ⁽¹⁾; c'est donc un opérateur compact dans $L_2(\Omega)$ (même résultat dans $L_p(\Omega)$).

(1) Rappelons que sous nos hypothèses l'injection de $H^{2m}(\Omega)$ dans $L_2(\Omega)$ est compacte.

Proposons-nous de résoudre l'équation

$$\begin{cases} u \in D(A_2) \\ -A_2 u + \lambda u = f \end{cases}$$

avec $f \in L_2(\Omega)$ et $\lambda \neq \lambda_0$.

Il vient

$$-A_2 u + \lambda_0 u = f + (\lambda_0 - \lambda) u$$

d'où $u = R(\lambda_0, A_2) f + (\lambda_0 - \lambda) R(\lambda_0, A_2) u$

et
$$\frac{1}{\lambda_0 - \lambda} u - R(\lambda_0, A_2) u = \frac{1}{\lambda_0 - \lambda} R(\lambda_0, A_2) f$$

Si et seulement si $\frac{1}{\lambda_0 - \lambda} \in \rho(R(\lambda_0, A_2))$, alors l'équation possède la solution

$$u = R\left(\frac{1}{\lambda_0 - \lambda}; R(\lambda_0, A_2)\right) \frac{1}{\lambda_0 - \lambda} R(\lambda_0, A_2) f$$

Ceci montre que

$$\rho(A_2) = \left\{ \lambda \neq \lambda_0; \frac{1}{\lambda_0 - \lambda} \in \rho(R(\lambda_0, A_2)) \right\} \cup \{\lambda_0\}$$

et

$$R(\lambda, A_2) = R\left(\frac{1}{\lambda_0 - \lambda}; R(\lambda_0, A_2)\right) \frac{1}{\lambda_0 - \lambda} R(\lambda_0, A_2)$$

pour $\lambda \neq \lambda_0$.

Les résultats classiques sur la résolvante d'un opérateur compact sont applicables à $R(\lambda_0, A_2)$: le spectre de $R(\lambda_0, A_2)$ est discret, borné, et 0 est le seul point d'accumulation fini possible; en conséquence le spectre de A_2 est discret et n'a

aucun point d'accumulation fini. En résumé nous avons le :

Théorème 9.1 : Le spectre de A_p ne dépend pas de p ; c'est ou bien le plan complexe tout entier, ou bien un ensemble discret sans point d'accumulation fini.

Remarque 9.1 : On pourrait de même considérer $\sigma(A_{p,k})$ ($A_{p,k}$ défini p.24) et vérifier que cet ensemble ne dépend ni de p ni de k , donc que $\sigma(A_{p,k}) = \sigma(A_2)$ $1 < p < \infty$, $k=0,1,\dots$

Un problème important est donc celui de savoir quand $\rho(A_2) \neq \emptyset$. Pour donner une solution (partielle) à ce problème nous utiliserons le :

Théorème 9.2 : Les conditions suivantes sont suffisantes pour que l'inégalité

$$\|u\|_{0,p} \leq \frac{C}{|\lambda|} \|(-A_p + \lambda)u\|_{0,p} \quad (9.1)$$

ait lieu pour tout λ de module assez grand sur la demi-droite

$\arg \lambda = \theta$:

(i) $(-1)^m \frac{A^0(x;\xi)}{|A^0(x;\xi)|} \neq e^{i\theta}$ pour tout ξ réel $\neq 0$ et

$x \in \overline{\Omega}$. (1)

(ii) En tout point $x \in \Gamma$ soit n la normale à Γ intérieure

(1) A^0 désigne la partie homogène de degré $2m$ de A .

à Ω et $\xi \neq 0$ un vecteur tangent, et soient $\tau_k^+(\xi; \lambda)$, $k=1, 2, \dots, m$, les racines du polynôme en τ : $(-1)^m A^0(x; \xi + \tau n) - \lambda$, qui ont partie imaginaire positive, λ étant quelconque sur la demi-droite $\arg \lambda = \theta$; alors les polynômes en τ : $B_j^0(x; \xi + \tau n)$ sont linéairement indépendants modulo $\prod_{k=1}^m (\tau - \tau_k^+(\xi; \lambda))$. (2)

Démonstration : L'inégalité (9.1) résulte des inégalités a priori (exposé III) correspondant à un problème aux limites elliptique dans un domaine à $n+1$ dimensions.

Posons $G = \Omega \times]-\infty, +\infty[$

$$L(x; D_x, D_t) = A(x; D_x) - (-1)^m e^{i\theta} D_t^{2m}$$

La condition (i) assure l'ellipticité de L dans G ; la condition (ii) signifie que les "opérateurs-frontières" B_j , considérés comme "opérateurs-frontières" sur ∂G (indépendants de t), recouvrent l'opérateur L . Il existe donc une constante C telle que

$$\|v\|_{2m,p} \leq C (\|Lv\|_{0,p} + \|v\|_{0,p}) \quad (9.2)$$

pour toute fonction $v \in W_p^{2m}(G)$, à support dans $\bar{\Omega} \times [-1, +1]$, et telle que $B_j v = 0$ $j=1, 2, \dots, m$ (1)

L'application de (9.2) à des fonctions de type particulier,

(1) B_j est considéré comme "opérateur-frontière" sur $\partial G = B_j(x, t; D_x, D_t) = B_j(x; D_x)$ pour tout t .

(2) B_j^0 désigne la partie homogène de degré m_j de B_j .

fournit l'inégalité (9.1) : soit $\zeta = \zeta(t)$ une fonction de t seulement, indéfiniment dérivable, nulle hors de $[-1, +1]$ et $\equiv 1$ dans $[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$ et soit $u \in D(A_p)$, nous considérons v de la forme $v(x, t) = \zeta(t) e^{i\mu t} u(x)$ avec μ réel; nous avons alors :

$$\begin{aligned} L v(x, t) &= \zeta(t) e^{i\mu t} (A - \mu^{2m} e^{i\theta}) u \\ &- (-1)^m e^{i\theta} \left[\sum_{j=0}^{2m-1} \binom{2m}{2m-j-1} \zeta^{(j+1)}(t) (i\mu)^{2m-j-1} \right] e^{i\mu t} u \end{aligned}$$

d'où par application de (9.2) :

$$\| e^{i\mu t} u(x) \|_{W_p^{2m}(\Omega_x) \left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]} \leq \| \zeta e^{i\mu t} u(x) \|_{W_p^{2m}(\Omega_x) [-1, +1]} \quad (9.3)$$

$$\leq C_1 \left\{ \| (A - \mu^{2m} e^{i\theta}) u \|_{0,p}^{2m-1} + \sum_{j=0}^{2m-1} |\mu|^{2m-j-1} \| u \|_{0,p} \right\}$$

Calculons le premier membre de cette dernière inégalité :

$$\begin{aligned} & \| e^{i\mu t} u(x) \|_{W_p^{2m}(\Omega_x) \left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]}^p = \\ & \sum_{|\alpha| \leq 2m} \int_{-\frac{1}{2}}^{+\frac{1}{2}} \int_{\Omega} |D^\alpha (e^{i\mu t} u(x))|^p dx dt = \\ & \sum_{j=0}^{2m} \sum_{|\beta| \leq j} |\mu|^{(2m-j)p} \int_{\Omega} |D^\beta u(x)|^p dx = \\ & \sum_{j=0}^{2m} |\mu|^{(2m-j)p} \| u \|_{j,p}^p \end{aligned}$$

Il vient

$$|\mu|^{(2m-j)} \|u\|_{j,p} \leq \|e^{i\mu t} u(x)\|_{W_p^{2m}(\Omega x)} - \frac{1}{2}, + \frac{1}{2} [\quad]$$

pour $j=0,1,\dots,2m$, et

$$\sum_{j=0}^{2m} |\mu|^{2m-j} \|u\|_{j,p} \leq c_2 \left\{ \|(A-\mu^{2m} e^{i\theta})u\|_{0,p} + \sum_{j=0}^{2m-1} |\mu|^{2m-j-1} \|u\|_{j,p} \right\} \quad (9.4)$$

L'inégalité (9.4) est vraie pour tout μ , donc en particulier pour $|\mu|$ assez grand, et nous obtenons l'inégalité

$$\sum_{j=0}^{2m} |\mu|^{2m-j} \|u\|_{j,p} \leq c_3 \|(A-\mu^{2m} e^{i\theta})u\|_{0,p} \quad (9.5).$$

En remplaçant dans (9.5) $\mu^{2m} e^{i\theta}$ par λ nous obtenons (9.1),

et même l'inégalité un peu plus précise

$$\sum_{j=0}^{2m} |\lambda|^{1-\frac{j}{2m}} \|u\|_{j,p} \leq c_3 \|(A-\lambda)u\|_{0,p} \quad (9.1)'$$

pour $|\lambda|$ assez grand et $\arg \lambda = \theta$.

C.Q.F.D.

Théorème 9.2' : Sous les conditions (i) et (ii) du théorème 9.1,

$\rho(A_p)$ contient tous les nombres λ de module assez grand sur la

demi-droite $\arg \lambda = \theta$ et pour ces λ on a la majoration

$$\|R(\lambda; A_p)\| \leq \frac{C}{|\lambda|}$$

Démonstration : l'inégalité (9.1) montre que

$$N(-A_p + \lambda I) = \{0\}$$

pour λ de module assez grand sur la demi-droite $\arg \lambda = \theta$; il faut donc vérifier que

$$N(-A'_p + \bar{\lambda} I) = \{0\}$$

pour les mêmes λ , et pour cela il suffit que les conditions (i) et (ii) aient lieu avec A remplacé par A' , B_j par B'_j et θ par $-\theta$. Comme $A'^0 = \overline{A^0}$ la condition (i) a lieu. La condition (ii) signifie que les opérateurs B'_j recouvrent l'opérateur L' ce qui résulte du fait que $\{L; B_1, \dots, B_m\}$ et $\{L'; B'_1, \dots, B'_m\}$ sont formellement adjoints (cf. exposé IV).

La majoration de $R(\lambda; A_p)$ résulte immédiatement de l'inégalité (9.1).

Remarque 9.2 : Ces résultats donnent une nouvelle réponse aux questions (i) et (ii) de l'exposé VII.

Remarque 9.3 : Les conditions du théorème 9.2 sont vérifiées avec $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ dans le cas où l'opérateur est fortement elliptique et les conditions aux limites sont les conditions de Dirichlet. Elles sont également vérifiées avec $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ dans le cas du problème de Dirichlet pour un opérateur A "faiblement positif"

semi-défini" i.e. si

$$(-1)^m \operatorname{Re} A^0(x, \xi) \geq 0$$

pour tout $x \in \bar{\Omega}$ et ξ réel.

2 - Soit λ_0 tel que $N(-A_p + \lambda_0 I) \neq \{0\}$; $N(-A_p + \lambda_0 I)$ est le sous-espace propre de A_p correspondant à la valeur propre λ_0 , ce sous-espace qui est de dimension finie ne dépend pas de p et est formé de fonctions $C^\infty(\bar{\Omega})$. Lorsque $\rho(A_p) \neq \emptyset$, l'ensemble des valeurs propres est discret.

Un problème intéressant est le suivant : l'ensemble des fonctions propres de A_p , est-il total dans $L_p(\Omega)$ (et dans $D(A_p)$)?

Nous nous bornerons à considérer le cas du problème aux limites formellement autoadjoint; la réponse presque évidente, est donnée par le :

Théorème 9.3 : On suppose que le problème aux limites considéré

$\{A; B_1, \dots, B_m\}$ est formellement autoadjoint; alors l'ensemble des fonctions propres de A_p est total dans $L_p(\Omega)$.

Démonstration : Commençons par le cas $p = 2$: le problème étant

formellement autoadjoint, on a $A_2 = A_2'$ et par conséquent (exp. VI)

$A_2 = A_2^*$, et A_2 est autoadjoint dans $L_2(\Omega)$. Le spectre de A_2

est donc nécessairement réel, i.e. $\rho(A_2) \neq \emptyset$ et le spectre de l'opérateur autoadjoint A_2 est discret grâce au théorème 9.1, ce qui démontre le théorème pour $p = 2$.

Le cas général $p \neq 2$ en résulte grâce à la

Proposition 9.1 : Si pour un p_0 avec $1 < p_0 < \infty$, les fonctions propres de A_{p_0} sont totales dans $L_{p_0}(\Omega)$, alors elles sont totales dans tout $L_p(\Omega)$ avec $1 < p < \infty$.

Démonstration : Nous notons S l'espace engendré (algébriquement) par les fonctions propres de A_{p_0} ; S est un sous-espace de $C^\infty(\bar{\Omega})$ et S est dense dans $L_{p_0}(\Omega)$ par hypothèse.

On en déduit immédiatement que S est dense dans tout $L_p(\Omega)$ avec $1 < p \leq p_0$. Il reste à considérer le cas $p > p_0$; nous allons montrer que S est dense dans tout $L_p(\Omega)$ avec

$$p \geq p_0 \quad \text{si} \quad p_0 \geq \frac{n}{2m}$$

$$p_1 \geq p \geq p_0 \quad \text{si} \quad p_0 < \frac{n}{2m} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{p_1} = \frac{1}{p_0} - \frac{2m}{n}.$$

En effet, lorsque p remplit ces conditions, on a par application du théorème de Sobolev l'inclusion :

$$W_{p_0}^{2m}(\Omega) \subset L_p(\Omega)$$

d'où : $D(A_{p_0}) \subset L_p(\Omega)$

avec une topologie plus fine, $D(A_{p_0})$ étant dense dans $L_p(\Omega)$.

Il suffit donc de vérifier que S est dense dans $D(A_{p_0})$: soit

$u \in D(A_{p_0})$ et soit $\lambda_0 \in \rho(A_{p_0})$, nous posons

$$f = (-A_{p_0} + \lambda_0 I) u$$

Par hypothèse, il existe une suite $\{f_k\}_{k=0,1,\dots} \subset S$, telle

que $f_k \longrightarrow f$ dans $L_{p_0}(\Omega)$ pour $k \longrightarrow +\infty$, donc

$$u_k = R(\lambda_0, A_{p_0}) f_k \longrightarrow R(\lambda_0, A_{p_0}) f = u$$

dans $D(A_{p_0})$ pour $k \longrightarrow +\infty$. Comme S est invariant par A_{p_0} ,

on a $u_k \in S$ et par conséquent S est dense dans $D(A_{p_0})$.

On peut recommencer le raisonnement précédent avec p_0 remplacé par p_1 , puis un nombre fini de fois, ce qui démontrera la proposition pour tout $p \geq p_0$ (1).

Remarque 8.4 : Nous avons démontré que sous les conditions de la proposition 9.1, les fonctions propres forment un ensemble total dans $D(A_p)$ pour tout p avec $1 < p < \infty$.

Un autre problème intéressant, et que nous n'étudierons pas, est celui de la distribution des valeurs propres dans le plan complexe, lorsque le spectre est discret.

(1) L'emploi du théorème de Sobolev n'est pas indispensable; il suffit d'avoir une inclusion du type $W_{p_0}^{2m}(\Omega) \subset L_p(\Omega)$ pour un $p > p_0$.

3 - Pour terminer nous allons donner un exemple d'utilisation des théorèmes 9.2 et 9.2' dans l'étude de l'équation parabolique $\frac{\partial}{\partial t} - A(x, D_x)$, ce qui montrera l'intérêt que revêt l'étude du spectre de A .

Rappelons tout d'abord un Résultat de la théorie des semi-groupes : soit H un opérateur linéaire non borné de domaine $D(H)$ dans l'espace de Banach E ; on suppose que

- (i) H est fermé et à domaine dense.
- (ii) Il existe $\omega > \frac{\pi}{2}$ tel que l'ensemble $\{\lambda; |\arg \lambda| \leq \omega\}$ soit contenu en entier dans $\rho(H)$ (la résolvante de H) et il existe M tel que $\|(-H + \lambda)^{-1}\| \leq \frac{M}{|\lambda|}$ pour tout λ tel que $|\arg \lambda| \leq \omega$.

Dans ces conditions on sait que H est le générateur infinitésimal d'un semi-groupe $t \mapsto e^{tH}$ borné dans E et tel que $\frac{d}{dt} e^{tH} = H e^{tH} \in \mathcal{L}(E, E)$ pour tout $t > 0$; de plus pour $u_0 \in D(H)$ le problème

$$\begin{cases} u(t) \in C(0, T; D(H)) & (1) \\ u(0) = u_0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} = H u(t) & \text{pour } 0 < t < T \end{cases}$$

admet la solution unique $u(t) = e^{tH} u_0$.

(1) c'est-à-dire, u continue dans $[0, T]$ à valeurs dans $D(H)$.

Considérons alors un système d'opérateurs $\{A; B_1, \dots, B_m\}$ tel que les conditions (i) et (ii) du théorème 9.2 aient lieu pour tout $|\theta| \leq \omega$ ($\omega > \frac{\pi}{2}$) ; en remplaçant éventuellement A par $A + \xi$ (ξ réel positif suffisamment grand), les conditions pour que A_p soit le générateur infinitésimal d'un semi-groupe sont vérifiées et le problème

$$u(t) \text{ continue à valeurs dans } W_p^{2m}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m)$$

$$u(0) = u_0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - A(x; D_x) u = 0 \quad 0 < t < T, \quad x \in \Omega$$

admet une solution unique pour $u_0 \in W_p^{2m}(\Omega; \{B_j\}_{j=1}^m)$.

Ceci est un simple exemple; on peut également résoudre l'équation avec second membre non homogène. Nous ne détaillons pas plus cette étude.

Remarque 9.5 : Les conditions que nous avons données sont celles pour que H soit le générateur infinitésimal d'un semi-groupe holomorphe; ces conditions plus restrictives que celles du théorème de Hille-Yosida ont l'avantage de ne pas faire intervenir les puissances de $(-A+\lambda)^{-1}$.
