

SYSTÈMES DYNAMIQUES

Feuille d'exercices 3

Exercice 1. Ensemble ω -limite non minimal

Trouver un espace métrique X , une transformation continue $f : X \rightarrow X$ et un point $x \in X$ tels que $\omega(x)$ contienne deux parties fermées invariantes et non vides.

Exercice 2. Croissance des orbites périodiques et entropie des applications expansives

Soit (X, d) un espace métrique compact et $f : X \rightarrow X$ une application continue et expansive, c'est-à-dire qu'il existe $\delta > 0$ tel que pour tous $x, y \in X$,

$$\sup_{n \in \mathbf{N}} d(f^n(x), f^n(y)) \leq \delta \implies x = y.$$

Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on note

$$p_n(f) = \#\{x \in X, f^n(x) = x\}.$$

On définit aussi le taux de croissance exponentielle de la séquence $p_n(f)$,

$$p(f) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + p_n(f))}{n}.$$

1. Montrer que $p_n(f)$ est fini pour tout n et qu'on a

$$p(f) \leq h_{\text{top}}(f), \tag{1}$$

où $h_{\text{top}}(f)$ est l'entropie topologique de f .

2. Donner un exemple d'application f telle que (1) soit une égalité.
3. Montrer que pour toute matrice $A \in \text{GL}(m, \mathbb{Z})$ hyperbolique (i.e. dont les valeurs propres sont toutes de module différent de 1), on a

$$\sum_{\substack{\lambda \in \text{sp}(A) \\ |\lambda| > 1}} \log |\lambda| \leq h_{\text{top}}(f_A),$$

où $f_A : \mathbf{T}^m \rightarrow \mathbf{T}^m$ est l'automorphisme toral associé à A .

Exercice 3. Codage symbolique de l'application du Chat d'Arnold

On considère la matrice

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors L induit un automorphisme $f_L : \mathbf{T}^2 \rightarrow \mathbf{T}^2$ appelé application du Chat d'Arnold. Alors L a deux valeurs propres $\lambda = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ et λ^{-1} . Les vecteurs propres associés respectifs sont $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - \lambda^{-1} \end{pmatrix}$ et $w = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 - \lambda \end{pmatrix}$. On considère une partition de \mathbf{T}^2 en deux rectangles $R^{(1)}$ et $R^{(2)}$ dont les côtés sont parallèles à v ou w (voir Figure 1). Alors $f_L(R^{(1)})$ se décompose en trois rectangles Δ_0, Δ_1 et Δ_3 tandis que $f_L(R^{(2)})$ se décompose en deux rectangles Δ_2 et Δ_4 (voir Figure 1).

1. En utilisant la partition $\mathbf{T}^2 = \bigcup_{j=0}^4 \Delta_j$, montrer que f_L est un facteur d'une chaîne de Markov topologique dont on précisera la matrice de transition.
2. En déduire l'entropie topologique de f_L .




Figure 1: Partition de \mathbf{T}^2 en deux rectangles (à gauche) et image des relevés de ceux ci par $F : x \mapsto Lx$ (à droite)

Exercice 4. Fonctions zêta dynamiques

Soit (X, d) un espace métrique compact et $f : X \rightarrow X$ une transformation continue et expansive de X . On définit la fonction zêta dynamique de f par

$$\zeta_f(z) = \exp \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n(f)}{n} z^n, \quad z \in \mathbf{C}, \quad |z| < \exp(-p(f)),$$

où $p_n(f)$ et $p(f)$ sont définis dans l'exercice 2.

1. Montrer que ζ_f est bien définie.
2. Montrer, dans les cas suivants, que ζ_f est une fonction rationnelle admettant un pôle simple au point $z = \exp(-h_{\text{top}}(f))$, et que

$$p_n(f) \sim \exp(nh_{\text{top}}(f)) \quad (n \rightarrow \infty).$$

- (a) $X = \mathbf{T}$ et $f : x \mapsto mx$ où $m \in \mathbf{N}_{\geq 2}$.
- (b) $X = \mathbf{T}^2$ et $f = f_L$ est l'application du Chat d'Arnold.
- (c) $X = \Sigma_A$ où A est une matrice $n \times n$ à coefficients dans $\{0, 1\}$ irréductible¹,

$$\Sigma_A = \{(x_j)_{j \in \mathbf{Z}} \in \{1, \dots, n\}^{\mathbf{Z}} \mid \forall j \in \mathbf{Z}, A_{x_j, x_{j+1}} = 1\},$$

et $f = \sigma_A$ est le décalage sur Σ_A .

3. Montrer que

$$\zeta_f(z) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - z^{|p|})^{-1},$$

où \mathcal{P} est l'ensemble des orbites périodiques de f , et $|p|$ désigne la période de l'orbite $p \in \mathcal{P}$.

Exercice 5. Toute transformation continue surjective est facteur d'un homéomorphisme

On se donne $f : X \rightarrow X$ une transformation continue et surjective d'un espace topologique. Montrer qu'il existe un espace topologique \tilde{X} , un homéomorphisme $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ et une surjection continue $h : \tilde{X} \rightarrow X$ tels que $f \circ h = h \circ \tilde{f}$.

¹En particulier, par le théorème de Perron-Frobenius, il existe une valeur propre $\lambda > 0$ telle que $\lambda = \rho(A)$ et $\text{sp}(A) \cap \{|z| \in \mathbf{C}, |z| = \lambda\} = \{\lambda, \lambda\omega, \dots, \lambda\omega^{p-1}\}$ où $p \in \mathbf{N}$ et $\omega = \exp(2i\pi/p)$.