Corrigé du partiel de Mathématiques Master 1 Mécanique

Durée 2h.

Le Lundi 26 Octobre 2009.

Exercice 1.

1) Les formules connues pour les coordonnées sphériques donnent le paramétrage :

$$[0, \pi] \times [0, 2\pi] \ni (\varphi, \theta) \mapsto x(\varphi, \theta) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi) \in S.$$

2) Le vecteur normal unitaire extérieur au point $x(\varphi, \theta)$ est évidemment :

$$\vec{\nu}(\varphi, \theta) = \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

3) Au point $x = x(\varphi, \theta) \in S$ on a :

$$\vec{\nu}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{F}(x) \cdot \vec{\nu}(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3 = 1 - x_3^2 + x_3 = 1 - \cos^2 \varphi + \cos \varphi,$$

en utilisant que $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ comme $x \in S$. D'autre part l'élément d'aire d^2S sur la sphère unité s'écrit en coordonnées sphériques $d^2S = \sin \varphi d\varphi d\theta$. L'intégrale donnant le flux est donc :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi (1 - \cos^2 \varphi + \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^\pi \sin \varphi - \sin \varphi \cos^2 \varphi + \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \\ &= 2\pi \left[-\cos \varphi + \frac{1}{3} \cos^3 \varphi - \frac{1}{2} \cos^2 \varphi \right]_0^\pi \\ &= 2\pi \times \frac{4}{3} = \frac{8\pi}{3}. \end{aligned}$$

Exercice 2.

1) Le domaine D est l'intérieur du demi cône positif.

2) Pour la première identité, on intègre d'abord en t pour x fixé, l'intégrale en t porte sur l'intervalle $[|x|, +\infty[$, l'intégrale en x porte sur $\mathbb{R}$. Pour le deuxième on intègre d'abord en x pour t fixé, l'intégrale en x porte sur l'intervalle $[-t, t]$, l'intégrale en t porte sur $[0, +\infty[$.

3) On utilise la première formule pour calculer $\iint_D \partial_t v(t, x) dt dx$. On obtient

$$\begin{aligned} \iint_D \partial_t v(t, x) dt dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{|x|}^{+\infty} \partial_t v(t, x) dt \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} v(|x|, x) dx \\ &= - \int_0^{+\infty} v(s, s) ds - \int_{-\infty}^0 v(-s, s) ds. \end{aligned}$$

On utilise la deuxième formule pour calculer $\iint_D -\partial_x v(t, x) dt dx$. On obtient :

$$\begin{aligned} \iint_D -\partial_x v(t, x) dt dx &= \int_0^{+\infty} dt \int_{-t}^t -\partial_x v(t, x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} v(t, -t) - v(t, t) dt \\ &= \int_0^{+\infty} v(s, -s) ds - \int_0^{+\infty} v(s, s) ds. \end{aligned}$$

Par changement de variable $s \rightarrow -s$ on voit que :

$$\int_0^{+\infty} v(s, -s) ds = \int_{-\infty}^0 v(-s, s) ds.$$

En ajoutant les deux termes on obtient le résultat.

4) On calcule

$$\begin{aligned} &(\partial_t - \partial_x)(\partial_t \varphi + \partial_x \varphi) \\ &= \partial_t^2 \varphi - \partial_x^2 \varphi + \partial_t \partial_x \varphi - \partial_x \partial_t \varphi \\ &= \partial_t^2 \varphi - \partial_x^2 \varphi, \end{aligned}$$

à cause de la relation de Schwarz.

5) On applique la formule précédente à $v(t, x) = \partial_t \phi(t, x) + \partial_x \varphi(t, x)$. On obtient que :

$$\iint_D \partial_t^2 \varphi(t, x) - \partial_x^2 \varphi(t, x) dt dx = -2 \int_0^{+\infty} \partial_t \varphi(s, s) + \partial_x \varphi(s, s) ds.$$

On remarque que si $f(s) = \varphi(s, s)$ alors $f'(s) = \partial_t \varphi(s, s) + \partial_x \varphi(s, s)$. On obtient donc

$$-2 \int_0^{+\infty} f'(s) ds = 2f(0) = 2u(0, 0),$$

comme $f(+\infty) = 0$.

Exercice 3.

1) On pose $x = (x_1, x_2)$. L'équation des courbes caractéristiques est :

$$\begin{cases} \frac{dt}{ds}(s) = 1, \\ \frac{dx_1}{ds}(s) = x_2(s), \\ \frac{dx_2}{ds}(s) = -x_1(s), \end{cases}$$

avec les conditions initiales $t(0) = t^0$, $x(0) = x^0$. On trouve comme d'habitude $t(s) = t^0 + s$ et on a $x_1''(s) = x_2'(s) = -x_1(s)$. On obtient donc la solution :

$$x_1(s) = x_1^0 \cos s + x_2^0 \sin s, \quad x_2(s) = -x_1^0 \sin s + x_2^0 \cos s.$$

En notant $x(s) = X(s, t^0, x^0)$ on sait d'après le cours que la solution est donnée par :

$$u(t, x) = g(X(-t, t, x)).$$

On trouve donc :

$$u(t, x) = g(x_1 \cos t - x_2 \sin t, x_1 \sin t + x_2 \cos t).$$

2) Il est évident sur la formule que $u(t + 2\pi, x) = u(t, x)$, c'est à dire que u est 2π périodique en t .