

---

## Fonctions d'une variable réelle et dérivées : Exercices

---

### Fonctions convexes

**Exercice 1. La ligne droite est le plus court chemin** [Rouvière, ex. 41 p. 117]

1. Soient  $I$  un intervalle et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Montrez que, si  $f$  est convexe, alors la fonction

$$g : y \mapsto \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

est croissante sur  $I \setminus \{x\}$ . Déduez-en que si  $f$  est convexe et dérivable, alors  $f(y) - f(x) \geq f'(x)(y - x)$  pour tous  $x, y \in I$ . Interprétez géométriquement ce résultat.

2. Soient  $a, b, \alpha, \beta$  des réels tels que  $a < b$ . On note  $F$  l'ensemble des fonctions  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telles que  $f(a) = \alpha$  et  $f(b) = \beta$ . En utilisant la convexité de la fonction  $g : u \mapsto \sqrt{1 + u^2}$ , montrez que le minimum

$$\min_{f \in F} \int_a^b \sqrt{1 + f'(u)^2} \, du$$

est atteint par une unique fonction affine. Interprétez géométriquement ce résultat.

3. Soient  $I$  un intervalle et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fois dérivable. Montrez que, si  $f''$  est positive, alors  $f$  est convexe. On pourra étudier la fonction  $g : t \mapsto (1 - t)f(b) + tf(a) - f((1 - t)b + ta)$  définie sur  $[0, 1]$ .

**Exercice 2. Inégalités de Hölder-Minkowski** [Moi, Exercice 5 p. 135]

1. Démontrez l'**inégalité de Young** : pour tous réels  $a, b$  de réels positifs, pour tous  $p, q > 1$  tels que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}. \quad (1)$$

2. Déduez de l'inégalité de Young l'**inégalité de Hölder** : pour tous  $n$ -uplets de nombres complexes  $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$  et  $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$ ,

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq \left( \sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left( \sum_{k=1}^n |b_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (2)$$

3. Déduez de ce qui précède l'**inégalité de Minkowski** : pour tous  $n$ -uplets de nombres complexes  $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$  et  $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$ , pour tout  $p > 1$ ,

$$\left( \sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{k=1}^n |b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (3)$$

4. Pour tout  $a := (a_k)_{1 \leq k \leq n} \in \mathbb{C}^n$  et  $p > 1$ , on note  $|a|_p := \left( \sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ . Montrez que  $|\cdot|_p$  est une norme sur  $\mathbb{C}^n$ .

5. Que valent  $|a|_1 := \lim_{p \rightarrow 1} |a|_p$  et  $|a|_\infty := \lim_{p \rightarrow +\infty} |a|_p$ ? Ces deux fonctionnelles sont-elles des normes ?

**Exercice 3. Suites de fonctions convexes** [Moisan, Suites et série de fonctions, ex. C4 p. 20; FGN, Analyse, ex. 33, p. 161]

1. Soit  $I$  un intervalle ouvert et  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions convexes de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  qui converge simplement vers  $f$  sur  $I$ . Montrez que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $f$  sur tout segment  $[a, b] \subset I$ . Dédisez-en que  $f$  est convexe.
2. Application : Montrez que la fonction  $\exp$ , définie sur  $\mathbb{R}$  comme limite simple de  $(1 + \frac{x}{n})^n$ , est de classe  $\mathcal{C}^1$ , et que  $\exp' = \exp$ .

**Exercice 4. Asymptotes des fonctions convexes** [Moisan, ex. 3 p. 142]

Soit  $f$  une application deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ , positive ainsi que ses deux dérivées.

1. Montrez que les limites  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$  et  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t}$  existent et sont positives (éventuellement infinies). Dans quels cas la première est-elle finie ?
2. Montrez que si  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t} =: \alpha \in \mathbb{R}$ , alors  $f(t) - \alpha t$  a une limite dans  $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  quant  $t$  tend vers  $+\infty$ .
3. Que peut on dire en  $-\infty$  ?
4. (Optionnel) Reprenez cette exercice en supposant seulement que  $f$  est positive, croissante et convexe sur  $\mathbb{R}$ .

### Dérivées successives

**Exercice 5. Fonctions lisses à support compact** [Gou, Exercice 3 p. 79]

1. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrez que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

2. Construisez une fonction  $\varphi$ , de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , à valeurs dans  $[0, 1]$ , et telle que  $\varphi(x) = 1$  si  $|x| \leq 1$ ,  $\varphi(x) = 0$  si  $|x| \geq 2$ .

### Inégalités et formules de Taylor. Applications.

**Exercice 6.** [Gou, Exercice 1 p. 77]

Montrez les inégalités suivantes :

1.

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^* ;$$

2.

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+ ;$$

3.

$$1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

**Exercice 7. Majoration de dérivées** [Gou, ex. 8 p. 84; Moi, Exercice 6 p. 139; FGN·Ana1, Exercice 4.43, Ska, Exercice 7.33]

Le but de cet exercice est de montrer que si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  est si  $f$  et  $f^{(n)}$  sont bornées, alors  $f^{(k)}$  est bornée pour tout  $1 \leq k \leq n-1$ .

Soit  $H_{n-1}$  la matrice de taille  $(n-1) \times (n-1)$  de coefficients  $(H_n)_{ij} = i^j$ . On pose, pour tout  $x$  réel,

$$\begin{pmatrix} F_1(x) \\ \vdots \\ F_{n-1}(x) \end{pmatrix} := H_{n-1} \begin{pmatrix} \frac{f'(x)}{1!} \\ \vdots \\ \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} \end{pmatrix}.$$

1. Montrez que  $H_{n-1}$  est inversible.
2. À l'aide d'une des formules de Taylor, montrez que, pour tout réel  $x$ ,

$$|F_k(x)| \leq 2 \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| + \frac{(n-1)^{(n-1)}}{(n-1)!} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(n)}(x)|.$$

3. Concluez.

## Interpolation

### Exercice 8.

Soient  $c < a < b < d$  quatre réels et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  (respectivement, de classe  $\mathcal{C}^n$ ). Existe-t-il une fonction  $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  (respectivement, de classe  $\mathcal{C}^n$ ) qui prolonge  $f$  ?

### Exercice 9. Polynômes d'interpolation de Lagrange [Caby Auliac, p. 275]

Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $(q+1)$  réels distincts  $x_0, x_1, \dots, x_q$ . Le **polynôme d'interpolation** de  $f$  en ces points est, par définition, le polynôme de plus bas degré qui coïncide avec  $f$  en ces points.

1. Construction.
  - (a) Quelle est la dimension de l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à  $q$  ?
  - (b) On définit les polynômes  $W_0, \dots, W_q$  par

$$W_i := \prod_{\substack{0 \leq j \leq q \\ j \neq i}} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}.$$

Calculez  $W_i(x_j)$  pour  $0 \leq i, j \leq q$ . Montrez que la famille  $(W_i)_{0 \leq i \leq q}$  est libre.

- (c) Déduisez-en qu'il existe un unique polynôme  $P$  de degré inférieur ou égal à  $q$  prenant en  $x_i$  la valeur  $f(x_i)$ , pour tout  $0 \leq i \leq q$ . Exprimez  $P$  en fonction des polynômes  $W_i$ .
- 2(a) On suppose que la fonction  $f$  est  $(q+1)$  fois dérivable sur un intervalle  $I$  contenant les réels  $(x_i)_{0 \leq i \leq q}$ . Étant donné un point  $x \in I$ , montrez qu'il existe  $\xi \in I$  tel que

$$f(x) - P(x) = \frac{1}{(q+1)!} f^{(q+1)}(\xi) \prod_{i=0}^q (x - x_i).$$

Dans le cas où  $x$  n'est pas un des  $x_i$ , on appliquera le théorème de Rolle de manière répétée à une fonction bien choisie.

- (b) Donnez un exemple de fonction  $f$  non polynomiale, définie sur un segment, telle que toute suite de polynômes d'interpolation obtenue en augmentant le nombre  $(q+1)$  de points d'interpolation converge uniformément vers  $f$ .

## Références

[FGN·Ana1] : *Oraux X-ENS. Algèbre 1*. S. Francinou, H. Gianella, S. Nicolas.

[Gou] : *Les maths en tête, Analyse*. X. Gourdon.

[Moi] : *Mathématiques supérieures, Analyse*. J. Moisan, F. Chanet, F. Delmas, N. Tosel.

[Ska] : *Analyse*. G. Skandalis.