

Applications de l'Analyse à la Géométrie et Introduction à l'Algèbre Linéaire

Cours 5 Déterminants

- Le cas de la dimension deux

On se donne une matrice d'ordre 2 notée $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Nous avons vu (leçon 2) que la matrice A est inversible, ce qui signifie que le système linéaire $AX = B$ a une solution unique $X \in \mathbb{R}^2$ quel que soit le second membre $B \in \mathbb{R}^2$, si et seulement si le déterminant de A défini par $\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \equiv ad - bc$ est différent de zéro.

- Règles de calcul d'un déterminant

Le déterminant d'une matrice carrée A d'ordre n est un nombre noté $\det A$ qui satisfait aux conditions suivantes :

- (i) Si $n = 1$, $\det A = A$.
- (ii) Invariance par transposition : $\det A^t = \det A$.
- (iii) Réduction de l'ordre. Si α est un nombre, B une matrice carrée d'ordre $(n - 1)$ et

$$A = \left(\begin{array}{c|ccc} \alpha & 0 & \cdots & 0 \\ \star & & & \\ \vdots & & & \\ \star & & & \end{array} \right) \text{ ou } A = \left(\begin{array}{c|ccc} \alpha & \star & \cdots & \star \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \right) \text{ , alors } \det A = \alpha \det B.$$

- (iv) Si on échange deux lignes [respectivement deux colonnes] de la matrice, on change le signe du déterminant.
- (v) Si on multiplie tous les éléments d'une ligne [respectivement d'une colonne] par un même scalaire λ , on multiplie le déterminant par λ .
- (vi) On peut retrancher à une ligne [respectivement une colonne] donnée toute combinaison linéaire des autres lignes [respectivement des autres colonnes] sans changer la valeur du déterminant.

- Cohérence des règles générales avec le cas $n = 2$.

Avec les règles ci-dessus, on établit [exercice !] que $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

Si on échange deux lignes d'un déterminant d'ordre deux, on change bien son signe :

$$\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = cb - ad = -(ad - bc) = - \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

On a la même propriété avec les colonnes [exercice !].

Si on multiplie une colonne d'un déterminant d'ordre 2 par le nombre λ , le déterminant est multiplié par λ : $\begin{vmatrix} \lambda a & b \\ \lambda c & d \end{vmatrix} = \lambda ad - (\lambda c)d = \lambda(ad - bc) = \lambda \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$. Il en est de même avec les lignes [exercice !].

On remplace la première ligne d'un déterminant deux par deux $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ par cette même ligne plus une constante fois la troisième ligne ; la valeur du déterminant n'est pas modifiée :

$$\begin{vmatrix} a + \lambda c & b + \lambda d \\ c & d \end{vmatrix} = (a + \lambda c)d - c(b + \lambda d) = ad - bc = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

- Règle de Sarrus pour le calcul d'un déterminant d'ordre trois

A l'aide des règles de calcul d'un déterminant proposées ci-dessus, on établit, après un calcul qui ne demande que du soin, une relation générale pour le calcul d'un déterminant d'ordre 3 :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + dhc + gbf - dbi - ahf - gec.$$

- Théorème fondamental

Soit A une matrice carrée d'ordre n . La matrice A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

- Déterminant d'un produit de matrices

Si A et B sont deux matrices carrées d'ordre n , le déterminant du produit est égal au produit des déterminants : $\det(AB) = (\det A)(\det B)$.

On en déduit que quelle que soit la dimension, le déterminant de la matrice identité I est égal à un : $\det I = 1$.

De plus, si la matrice P est inversible, on a $\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det P}$.

- Invariance du déterminant par changement de base

Le déterminant d'un endomorphisme u d'un espace vectoriel E dans lui-même ne dépend pas de la base choisie. En effet, supposons que u admet pour matrice A par rapport à une base donnée. Dans un changement de base associé à une matrice de passage P , la nouvelle matrice \tilde{A} de u par rapport à la nouvelle base satisfait à la relation $\tilde{A} = P^{-1}AP$. Donc $\det \tilde{A} = \det A$ compte tenu de ce qui vient d'être établi.

- Complément sur les bases

On considère un espace vectoriel E de dimension n . On se donne une famille libre $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ de E dont le nombre de vecteurs est exactement égal à la dimension de E . Alors $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ est une base de E .

- Deux vecteurs colinéaires en dimension trois.

On considère deux vecteurs u et v d'un espace vectoriel E_3 de dimension trois. On développe ces deux vecteurs dans une base (e_1, e_2, e_3) de E_3 : $u = \sum_{j=1}^3 u_j e_j$ et $v = \sum_{j=1}^3 v_j e_j$. La famille (u, v) est liée si et seulement si les trois déterminants suivants sont nuls :

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_3 & v_3 \\ u_1 & v_1 \end{vmatrix} = 0.$$

- Intersection de deux plans vectoriels en dimension trois

On se donne un espace vectoriel E_3 de dimension trois et deux plans vectoriels P_1 et P_2 : ce sont des sous-espaces vectoriels de E_3 de dimension deux. Alors ou bien $P_1 = P_2$ et leur intersection $P_1 \cap P_2$ est le plan vectoriel $P_1 = P_2$, ou bien $P_1 \neq P_2$ et l'intersection $P_1 \cap P_2$ est une droite vectorielle D , c'est à dire un sous-espace vectoriel de E_3 de dimension un.

Exercices

- Un déterminant d'ordre quatre

Montrer que
$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ a & a^2 & a^3 & 1 \\ a^2 & a^3 & 1 & a \\ a^3 & 1 & a & a^2 \end{vmatrix} = (a^4 - 1)^3.$$

- Bases de \mathbb{R}^3

a) À quelle condition sur les nombres réels a et b la famille de vecteurs

$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}$ et $u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b \end{pmatrix}$ est-elle une base de \mathbb{R}^3 ?

b) Même question avec les trois vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ b \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Un autre déterminant d'ordre quatre

Montrer que
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 8 & 10 & -11 & 2 \end{vmatrix} = -24.$$

- Un déterminant d'ordre trois

Montrer que
$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = abc(a-b)(b-c)(c-a).$$