Feuille d'exercices 3 : Connexité et connexité par arcs

Exercice 1 Les lettres T et D (munies de la topologie induite par $\mathbb{R}^2$) sont-elles homéomorphes ?

Exercice 2 Composantes connexes.

(1) Soit $X = \bigsqcup_{i\in I} A_i$ un espace topologique qui s'écrit comme réunion disjointes d'ouverts connexes non vides A_i. Décrire les composantes connexes de X.

(2) Soit $X = \prod_{i\in\mathbb{N}} \{0,1\}$, muni de la topologie produit (où $\{0,1\}$ est muni de la topologie discrète). Quelles sont les composantes connexes de X ?

Exercice 3 Le passage des douanes.

Soit A une partie d'un espace topologique X. Montrer que si B est une partie connexe de X qui rencontre à la fois $\mathring{A}$ et $X \setminus \overline{A}$, alors B rencontre la frontière de A. On rappelle que la frontière de A est $\partial A = \overline{A} \setminus \mathring{A}$.

Exercice 4 Adhérence et réunion.

Soient A et B deux parties d'un espace topologique X.

(1) Montrer que si A et B sont connexes et $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$, alors $A \cup B$ est connexe.

(2) Montrer que si A et B sont connexes par arcs et $A \cap B \neq \emptyset$, alors $A \cup B$ est connexe par arcs.

(3) Qu'en est-il de l'intersection ?

Exercice 5 Connexité par lignes polygonales.

Le plan $\mathbb{R}^2$ est muni de sa distance euclidienne naturelle. Une *ligne polygonale* de $\mathbb{R}^2$ est un chemin continu $\gamma : [t, t'] \to \mathbb{R}^2$ tel qu'il existe une subdivision $t = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t'$ pour laquelle la restriction de γ à chaque intervalle $[t_i, t_{i+1}]$ est affine, donc de la forme

$$\gamma(t) = A_i + \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} \overrightarrow{A_i A_{i+1}}.$$

Soit U un ouvert connexe non vide de $\mathbb{R}^2$. Montrer que pour deux points $A, B \in U$ quelconques, il existe une ligne polygonale $\gamma : [0,1] \to U$ telle que $\gamma(0) = A$ et $\gamma(1) = B$.

Indication : on pourra fixer un point p_0 dans U et étudier l'ensemble

$O(p_0) = \{q \in U$, il existe une ligne polygonale $\gamma : [0,1] \to U$ telle que $\gamma(0) = p_0$ et $\gamma(1) = q\}$.

Exercice 6 Dans $\mathbb{R}^2$, que l'on munit de sa structure usuelle d'espace métrique produit, on considère :

$$\Gamma = \{(t, \sin(1/t) \mid t > 0\}.$$

(1) Montrer que Γ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

(2) Déterminer $\overline{\Gamma}$.

(3) Prouver que $\overline{\Gamma}$ est connexe, mais que $\overline{\Gamma}$ n'est pas connexe par arcs.

Exercice 7 Peigne.

On considère les parties suivantes de $\mathbb{R}^2$:

$$P_+ = (\mathbb{R} \times \{1\}) \cup \left(\bigcup_{x \in \mathbb{Q}} \{x\} \times [0,1] \right) \text{ et } P_- = (\mathbb{R} \times \{-1\}) \cup \left(\bigcup_{x \in \mathbb{Q}} \{x + \sqrt{2}\} \times [-1,0] \right).$$

(1) Montrer que P_+ et P_- sont connexes par arc.

(2) En déduire que $P_+ \cup P_-$ est connexe.

(3) On veut maintenant montrer que $P_+ \cup P_-$ n'est pas connexe par arcs. Supposons par l'absurde qu'il existe un chemin continu $\gamma : [0,1] \to P_+ \cup P_-$ tel que $\gamma(0) = (0,1)$ et $\gamma(1) = (0,-1)$ et posons $\gamma(t) = (x(t), y(t))$.

(a) Soit $s = \sup\{t \in [0,1], \gamma(t) \in P_+\}$. Montrer que $y(s) = 0$.

(b) En déduire qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $x([s-\alpha, s+\alpha])$ est réduit à un point.

(c) Conclure.

Exercice 8 Connexité dans les espaces de matrices. On munit $M_n(\mathbb{R})$ de la topologie usuelle.

(1) Est-ce que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est connexe ?

(2) Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, et $1 \leqslant i, j \leqslant n$ avec $i \neq j$, on note $E_{i,j}$ la matrice élémentaire de coefficients 1 en position (i,j) et 0 ailleurs, et on note $T_{i,j}(\lambda)$ la matrice de transvection $I_n + \lambda E_{i,j}$. On note également

$$\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) > 0\}.$$

(a) Montrer qu'il existe un chemin continu de I_n à $T_{i,j}(\lambda)$ dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

(b) Montrer que toute matrice de $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ s'écrit comme produit de matrices de transvections et d'une matrice diagonale à coefficients positifs.

(c) En déduire que $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est connexe.

Exercice 9 Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$. On souhaite démontrer à l'aide de la connexité le résultat classique suivant : si f est continue et injective, alors f est strictement monotone. Pour cela, on pose

$$C = \{(x,y) \in I \times I \mid x > y\}$$

et $F(x,y) = f(x) - f(y)$, pour $(x,y) \in C$.

(1) Démontrer que $F(C)$ est un intervalle.

(2) Conclure.

Exercice 10 Théorème de Darboux.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable. On pose

$$A = \{(x,y) \in I \times I \mid x < y\}.$$

(1) Démontrer que A est une partie connexe de $\mathbb{R}$.

(2) On pose $g(x,y) = \dfrac{f(y) - f(x)}{y - x}$. Montrer que $g(A) \subset f'(I) \subset \overline{g(A)}$.

(3) En déduire que $f'(I)$ est un intervalle.

Exercice 11 Applications localement constantes.

Soit X et Y deux espaces topologiques et $f : X \to Y$ une application. On dit que f est localement constante si pour tout $x \in X$, il existe un voisinage V de x sur lequel f est constante.

(1) Montrer que f est localement constante si et seulement si la préimage de tout singleton est ouverte.

(2) On suppose que X est connexe, montrer que toute application localement constante est constante.