Correction TD 11 - Exercices 4, 5 et 6

Florian Livet

1. Correction exercice 4

Figure 1: Figure Geogebra de l'exercice 4

- a) On a $PQ = |z_Q - z_P| = |q - p| = |(1+i) - (1-i)| = |2i| = 2$.
 De même, on montre que $QR = RS = SP = 2$.
 Donc tous les côtés sont égaux (ce qui ne suffit pas pour conclure, il faut aussi montrer que les angles sont égaux).
 On a $(\vec{PQ}, \vec{PS}) = \arg\left(\frac{s-p}{q-p}\right) = \arg\left(\frac{(-1-i)-(1-i)}{(1+i)-(1-i)}\right) = \arg\left(\frac{-2}{2i}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$.
 De même, on montre que $(\vec{QR}, \vec{QP}) = (\vec{RS}, \vec{RQ}) = (\vec{SP}, \vec{SR}) = \frac{\pi}{2}$.
 Donc $PQRS$ est un carré et son centre est le milieu d'une des diagonales qui a pour affixe : $\frac{z_R+z_P}{2} = \frac{r+p}{2} = \frac{(-1+i)+(1-i)}{2} = 0$. Ainsi, son centre est l'origine du repère O .
- b) L'image de $PQRS$ par l'homothétie de centre R et de rapport $-\frac{1}{2}$ est tracée sur la Figure 1.
- c) Soit r une rotation qui conserve $PQRS$. On connaît l'écriture complexe d'une rotation : $r(z) = az + b$ avec $|a| = 1$.
 Comme r est une isométrie qui conserve $PQRS$ alors r conserve l'isobarycentre de $PQRS$ (c'est-à-dire le centre du carré) : $r(O) = O$. Donc le point O est le centre de cette rotation. On en déduit que $r(0) = 0 \iff b = 0$.
 Maintenant,
- L'image du point P est P : $r(z) = z$.
 - L'image du point P est Q : $r(z) = e^{i\frac{\pi}{2}}z$.
 - L'image du point P est R : $r(z) = -z$.
 - L'image du point P est S : $r(z) = e^{-i\frac{\pi}{2}}z$.
- d) Soit s une réflexion qui conserve $PQRS$. On connaît l'écriture complexe d'une réflexion : $s(z) = a\bar{z} + b$ avec $|a| = 1$.
 Comme s est une isométrie qui conserve $PQRS$ alors s conserve l'isobarycentre de $PQRS$ (c'est-à-dire le

centre du carré) : $s(O) = O$. Donc l'axe de réflexion de s passe par O .
Maintenant,

- L'image du point P est $P' : r(z) = -i\bar{z}$.
- L'image du point P est $Q : r(z) = \bar{z}$.
- L'image du point P est $R : r(z) = i\bar{z}$.
- L'image du point P est $S : r(z) = -\bar{z}$.

e) On cherche $a, b \in (\mathbb{C})$ tels que $s_1(z) = az + b$ avec $s_1(O) = O$ et $s_1(A) = P$. On résout donc le système :

$$\begin{cases} a \times 0 + b = 0 \\ a \times \frac{p+q}{2} + b = p \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 - i \\ b = 0 \end{cases}$$

Donc $s_1(z) = (1 - i)z$ et on a :

- $s_1(A) = P$.
- $s_1(B) = (1 - i)\frac{q+r}{2} = (1 - i)i = 1 + i = Q$.
- $s_1(C) = (1 - i)\frac{r+s}{2} = (1 - i)(-1) = -1 + i = R$.
- $s_1(D) = (1 - i)\frac{s+p}{2} = (1 - i)\frac{-2i}{2} = -1 - i = S$.

f) s_2 est la similitude de centre Q de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$ donc son écriture complexe est : $s_2(z) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z - z_Q) + z_Q = \frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2})(z - 1 - i) + 1 + i = \frac{1+i}{2}z + 1$ et on a :

- $s_2(P) = \frac{1+i}{2}p + 1 = \frac{1+i}{2}(1 - i) + 1 = 1 + 1 = 2$.
- $s_2(Q) = Q$.
- $s_2(R) = \frac{1+i}{2}r + 1 = \frac{1+i}{2}(-1 + i) + 1 = -1 + 1 = O$.
- $s_2(S) = \frac{1+i}{2}s + 1 = \frac{1+i}{2}(-1 - i) + 1 = -i + 1 = P$.

g) On a $s_2 \circ s_1(z) = s_2((1 - i)z) = \frac{(1+i)(1-i)}{2}z + 1 = z + 1$.
Donc $s_2 \circ s_1$ est une translation de vecteur d'affixe 1.

2. Correction exercice 5

a) $\Phi(z) = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})\bar{z} + 2(1 + i\sqrt{3})$

Calculons le module de a : $|\frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})| = 1$. Donc c'est une isométrie et au vu de l'écriture complexe de Φ , c'est soit une réflexion, soit une symétrie glissée.

Pour savoir dans quel cas on est, on calcule $a\bar{b} + b$: $\frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})2(1 - i\sqrt{3}) + 2(1 + i\sqrt{3}) = 1 - 2i\sqrt{3} - 3 + 2 + 2i\sqrt{3} = 0$. Donc c'est une réflexion.

Pour trouver l'axe d'une réflexion, on peut chercher l'ensemble des points fixes (c'est une droite) en résolvant $\Phi(z) = z$:

$$\iff \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})\bar{z} + 2(1 + i\sqrt{3}) = z$$

On écrit $z = x + iy$:

$$\iff \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})(x - iy) + 2(1 + i\sqrt{3}) = x + iy$$

On regroupe les termes en partie réelle / partie imaginaire :

$$\iff \left[\frac{1}{2}(x - \sqrt{3}y) + 2\right] + i\left[\frac{1}{2}(-y - \sqrt{3}x) + 2\sqrt{3}\right] = [x] + i[y]$$

On identifie de chaque côté de l'égalité et on obtient le système :

$$\iff \begin{cases} x = \frac{1}{2}(x - \sqrt{3}y) + 2 \\ y = \frac{1}{2}(-y - \sqrt{3}x) + 2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \frac{1}{2}(x - \sqrt{3}y) + 2 \\ y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 4\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = x \\ y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 4\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Le fait d'obtenir $x = x$ dans la première ligne n'est pas étonnant car on sait qu'il existe une infinité de points fixes car Φ est une réflexion.

Donc la droite de réflexion est caractérisée par l'équation $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 4\frac{\sqrt{3}}{3}$.

b) $\Psi(z) = i\sqrt{2}\bar{z} - 1 + i\sqrt{2}$

Calculons le module de a : $|i\sqrt{2}| = \sqrt{2} \neq 1$. Donc Ψ est la composée d'une homothétie h de rapport $\sqrt{2}$ et de centre I (déterminé ci-dessous) avec une réflexion s .

Dans un premier temps, cherchons son centre : $\Psi(z) = z$

$$\iff i\sqrt{2}\bar{z} - 1 + i\sqrt{2} = z$$

Comme au-dessus, on écrit $z = x + iy$:

$$\iff i\sqrt{2}(x - iy) - 1 + i\sqrt{2} = x + iy$$

On regroupe les termes en partie réelle / partie imaginaire :

$$\iff [\sqrt{2}y - 1] + i[\sqrt{2}x + \sqrt{2}] = [x] + i[y]$$

On identifie de chaque côté de l'égalité et on obtient le système :

$$\iff \begin{cases} x = \sqrt{2}y - 1 \\ y = \sqrt{2}x + \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Donc son centre est I d'affixe -1 et on a l'équation complexe de $h(z) = \sqrt{2}(z + 1) - 1$.

On sait que Ψ est la composée de l'homothétie h avec la réflexion s : $\Psi = h \circ s$, on en déduit donc $s = h^{-1} \circ \Psi$.

Or l'inverse d'une homothétie est une homothétie de même centre et de rapport l'inverse du rapport de l'homothétie initiale, donc $h^{-1}(z) = \frac{1}{\sqrt{2}}(z + 1) - 1$.

$$\text{Donc } s(z) = h^{-1} \circ \Psi(z) = h^{-1}(i\sqrt{2}\bar{z} - 1 + i\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(i\sqrt{2}\bar{z} - 1 + i\sqrt{2} + 1) - 1 = i\bar{z} + i - 1.$$

C'est bien l'équation d'une réflexion car $a\bar{b} + b = 0$. On cherche l'équation de la droite de réflexion en résolvant à nouveau $s(z) = z$.

On applique exactement ce qui a été fait en a) et on trouve la droite d'équation : $y = x + 1$.

Pour résumer, Ψ est la **composée d'une homothétie** de rapport $\sqrt{2}$ et de centre -1 **avec une réflexion** dont la droite a pour équation $y = x + 1$.

3. Correction exercice 6

On peut faire cet exercice de plusieurs manières, je vous renvoie au TD9 où nous avons traité un exercice similaire. J'utilise ici les nombres complexes pour résoudre cet exercice.

- a) (i) Dans le repère proposé par l'énoncé, on a : $z_O = 0$ et $z_A = 1$.
Comme $ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O , on sait que l'angle au centre entre deux sommets consécutifs vaut $\frac{\pi}{3}$, donc $(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{3}$ et on en déduit $z_B = e^{i\frac{\pi}{3}} z_A = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
Donc $OA = OB = 1$ et comme $(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{3}$ alors OAB est équilatéral.
- (ii) De même, on a $z_F = e^{-i\frac{\pi}{3}} z_A = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
On constate alors immédiatement que B et F ont même partie réelle et que le milieu de BF a pour affixe $\frac{1}{2}$.
Or le milieu de OA est aussi le point d'affixe $\frac{1}{2}$.
Donc BF coupe perpendiculairement OA en son milieu, c'est bien la médiatrice.
- (iii) A' est le point d'intersection des droites (AC) et (BF) .
On vient de le voir, la droite (BF) a pour équation $x = \frac{1}{2}$.
Maintenant, la droite (AC) a pour équation $y = ax + b$ et passe par A et C donc on trouve $a = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ et $b = y_C - ax_C = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
Donc le point A' a pour affixe $z_{A'} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}$.
Finalement, A' est le centre de OAB si et seulement si $z_{A'} = \frac{z_O + z_A + z_B}{3}$.
Or $\frac{z_O + z_A + z_B}{3} = \frac{0 + 1 + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{6} = z_{A'}$.
- (iv) On a $OA = |z_A - z_O| = 1$ et $OA' = |z_{A'} - z_O| = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
Donc $\sqrt{3}OA' = OA$.
- b) s est la similitude directe de centre O qui envoie A sur A' . s est donc la composée d'une homothétie de centre O et de rapport $\frac{OA'}{OA} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ avec une rotation de centre O et d'angle $(\vec{OA}, \vec{OA'}) = \frac{\pi}{6}$ car A' est le centre de OAB . L'écriture complexe de s est donc $s(z) = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{i\frac{\pi}{6}} z$.
Il est clair que l'image de B par s est B' ... Donc l'image de l'hexagone $ABCDEF$ est bien $A'B'C'D'E'F'$.
- c) L'image du cercle de centre O et passant par A' par l'homothétie de centre O et de rapport 3 est un cercle de centre O et de rayon $3OA'$.
- d) Les points A'', B'', C'', D'', E'' et F'' sont tous sur le cercle de centre O et de rayon $3OA'$ donc les points sont cocycliques. Montrons simplement que les angles au centre de deux sommets consécutifs valent $\frac{\pi}{3}$.
On a vu que $(\vec{OA}, \vec{OA'}) = \frac{\pi}{6}$ et de même on a $(\vec{OF'}, \vec{OA'}) = \frac{\pi}{6}$.
Or les points O, A' et A'' sont alignés et les points O, F' et F'' sont alignés, donc $(\vec{OA}, \vec{OA''}) = \frac{\pi}{6}$ et $(\vec{OF''}, \vec{OA''}) = \frac{\pi}{6}$.
Or $(\vec{OF''}, \vec{OA''}) = (\vec{OF''}, \vec{OA'}) + (\vec{OA'}, \vec{OA''}) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.
On conclut par symétries que tous les angles au centre sont égaux à $\frac{\pi}{3}$ et donc $A''B''C''D''E''F''$ est régulier.
- e) (i) s' est la similitude directe de centre O qui envoie A sur A'' . s' est donc la composée d'une homothétie de centre O et de rapport $\frac{OA''}{OA} = \frac{OA''}{OA'} \frac{OA'}{OA} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ avec une rotation de centre O et d'angle $(\vec{OA}, \vec{OA''}) = (\vec{OA}, \vec{OA'}) = \frac{\pi}{6}$. L'écriture complexe de s' est donc $s'(z) = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}} z$.
- (ii) L'image du cercle de centre O et de rayon OA par la similitude s' est un cercle de centre O et de rayon $\sqrt{3}OA$. C'est donc le même cercle qu'en question c).
- (iii) $s'(z_{A'}) = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}} z_{A'} = \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{6} \right) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = z_B$ donc $s'(A') = B$.
De même, $s'(B') = C$.
- (iv) On a, par construction, les points A, A', B' et C alignés.
On a également leur image : $s'(A') = B, s'(B') = C, s'(A) = A''$ et $s'(C) = C''$.
Or une similitude conserve l'alignement donc A'', B, C et C'' sont alignés.